



## AMBROISIES : C'EST L'ETE, DECHAUMEZ !!

Les graines d'ambrosie restent aptes à germer pendant de longues années, l'enfouissement par le labour, même occasionnel, n'a donc aucun effet sur la maîtrise de cette adventice.


Une fois la culture d'hiver récoltée, l'ambrosie prend le dessus. Il faut donc la gérer en interculture dans les chaumes.

**Déchaumer pour détruire les ambrosies avant qu'elles ne fleurissent et faire lever de nouvelles plantules pour réduire le stock semencier.**

### En pratique :

- ✓ Intervenir tôt après la récolte pour profiter de la fraîcheur du sol (meilleure pénétration des outils) ;
- ✓ Pour éviter que les ambrosies ne repartent, travailler le sol suffisamment profond (à partir de 5 cm) ;
- ✓ Si possible, équiper l'outil d'un rouleau pour favoriser les nouvelles levées (qui seront détruites mécaniquement ou chimiquement) ;
- ✓ Les passages doivent se faire avant la floraison des ambrosies (allergies) ;
- ✓ Si les ambrosies sont très développées, des passages croisés sont envisageables.

### En interculture longue :



Directeur de publication :

Denis CARRETIER  
Président de la Chambre  
Régionale d'Agriculture  
d'Occitanie  
BP 22107  
31321 CASTANET  
TOLOSAN Cx  
Tel 05.61.75.26.00

Dépôt légal : à parution

Comité de validation :  
Arterris, Arvalis Institut du  
Végétal, Chambres  
d'Agriculture de Hte-  
Garonne et du Tarn,  
Chambre régionale  
d'Agriculture d'Occitanie,  
DRAAF Occitanie, Qualisol,  
RAGT, Terres Inovia, Val  
de Gascogne, Vivadour,



**ÉCOPHYTO**  
RÉDUIRE ET AMÉLIORER  
L'UTILISATION DES PHYTOS

Action du plan Ecophyto pilotée par les ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche, avec l'appui technique et financier de l'Office français de la Biodiversité



*Infestation d'ambroisie dans des chaumes – Photo DRAAF*

Cette technique de déchaumage est efficace sur amброisie à feuilles d'armoise, amброisie trifide, xanthium (lampourde à gros fruits) et datura.

### **C'est l'été : les ambroisies vont fleurir !**

Pensez à surveiller et entretenir les bords de champs régulièrement avant leur floraison.

Attention au pollen allergène et à la grenaison qui pourrait entretenir l'infestation.



*Ambroisie proche de la floraison – Photo INRAe UMR Agroécologie*

#### **REPRODUCTION DU BULLETIN AUTORISEE SEULEMENT DANS SON INTEGRALITE (REPRODUCTION PARTIELLE INTERDITE)**

Ces bulletins sont produits à partir d'observations ponctuelles. S'ils donnent une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La CRA d'Occitanie dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base des observations qu'ils auront réalisées et en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.