



Oléiculture

N°8

12 juin 2026



AGRICULTURES
& TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE
OCCITANIE



AGRICULTURES
& TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

Référents filière & rédacteurs

Justine CHAZALVIEL

France Olive Production

j.chazalviel@ctolivier.org

Julien BALAJAS

France Olive Production

j.balajas@ctolivier.org

Directeur de publication

Georgia Lambertin

Présidente de la chambre régionale

d'Agriculture Provence Alpes-Côte d'Azur

Maison des agriculteurs

22 Avenue Henri Pontier

13626 Aix en Provence cedex 1

contact@paca.chambagri.fr

Supervision

DRAAF

Service régional de l'Alimentation

PACA

132 boulevard de Paris

13000 Marseille

Financé dans le cadre
de la stratégie **écophyto**


GOUVERNEMENT
Liberté
Égalité
Fraternité



La stratégie
écophyto 2030
Réduire et améliorer
l'utilisation des phytos

ARC – MÉDITERRANÉEN

AU SOMMAIRE DE CE NUMERO

Stades phénologiques

La floraison est terminée. Les petits fruits sont en cours de grossissement.

Mouche de l'olive

Les olives sont attractives (0,8 mm de long) sur des secteurs précoces comme le sillon audois, les plaines héraultaises, le littoral varois, certaines zones corses, la basse vallée du Rhône.

Le piégeage reste faible pour le moment.

C'est le moment de surveiller les vols de mouche ! Vous pouvez installer vos pièges chromatiques (plaque engluée jaune et phéromone) pour suivre les dynamiques de population. **Sur les secteurs les plus précoces, il peut être nécessaire de protéger vos olives** (stade olive attractive + mouches dans les pièges) au moyen de barrières minérales.

Cochenilles diaspines

Le réseau d'observations des larves mobiles montre que l'essaimage se poursuit. De jeunes stades fixés sont désormais observés sur les fruits.

Sur ces zones en cas de forte pression, c'est le moment propice pour positionner vos traitements ! Lisez attentivement les différentes recommandations dans ce BSV, l'Inf'Olive et sur le site internet de France Olive.



APPEL A VIGILANCE



Bien que cette cochenille ne soit pas réglementée, elle est considérée comme un ravageur émergent important dans la filière oléicole. **Afin de connaître l'étendue de sa dissémination, il est primordial de faire remonter toute observation ou suspicion de sa présence auprès de France Olive (contact@franceolive.fr).**



Vous abonner



Devenir
observateur
& contact



Tous les BSV
PACA

Maladies du feuillage

Les conditions météorologiques annoncées ne seront pas favorables aux nouvelles contaminations d'œil de paon et de cercosporiose. Le risque est **faible**.

ENQUETE LECTORAT BSV

Vous lisez le BSV ? Votre avis compte !

Dans le cadre d'une étude sur le BSV 2.0, le [CST Ecophyto](#), comité indépendant de gouvernance de la stratégie Ecophyto, mène une **enquête auprès des lecteurs du BSV** pour mieux comprendre leurs usages, la valeur qu'ils lui accordent et leurs attentes. Les résultats alimenteront l'élaboration de recommandations sur le dispositif.



La réponse à ce questionnaire vous demandera environ **15 minutes** : <https://sondages.inrae.fr/index.php/375212?lang=fr>.

L'enquête sera ouverte du 26 mai au 26 juin. Les réponses sont **anonymes** mais si vous souhaitez **recevoir une synthèse** des résultats et le rapport final, vous pouvez laisser votre adresse e-mail en fin de questionnaire.

Ce retour sera précieux pour cette étude, et **l'équipe du CST Ecophyto vous remercie** par avance du temps que vous y consacrerez.

Notes biodiversité



Conditions météorologiques



Prévisions du 12 au 17 juin 2026 (source : Météo France)

Les prochains jours seront chauds et secs avec potentiellement de petits épisodes pluvieux localisés.


Département / Jour	Ven	Sam	Dim	Lun	Mar	Mer
Alpes-de-Haute-Provence						
Alpes-Maritimes						
Var						
Bouches-du-Rhône						
Vaucluse						
Drôme						
Ardèche						
Gard						
Hérault						
Aude						
Pyrénées-Orientales						
Corse						

Stades phénologiques

La floraison est terminée sur tous les secteurs. Les petits fruits grossissent.

Etat des lieux des stades phénologiques majoritaires sur l'ensemble des variétés selon les secteurs

(Source photos : France Olive, Civam Bio 66, CA11)




Mouche de l'olive



Éléments de biologie


La mouche de l'olive, *Bactrocera oleae*, est un des ravageurs les plus importants des olives et le principal ravageur d'importance économique des oliveraies.

Les adultes mesurent 4 à 5 mm de long. Leur thorax est foncé et strié de bandes grises et de barres blanches sur les côtés. Le **scutellum** (partie inférieure du thorax, jonction avec les ailes) est **blanc** (pouvant tirer vers le jaune pâle). L'abdomen est brun-orangé avec des zones latérales plus sombres. Les **ailes** sont transparentes avec **un point noir** sur leurs extrémités.



*Photos de mouche de l'olive
(mâle à droite, femelle à gauche)*

Les mouches passent l'hiver en grande majorité sous la forme de pupes dans les premiers centimètres du sol. Si les olives sont encore dans les arbres, les mouches peuvent rester dans les fruits sous forme de larve puis de puce. Dès février-mars, les adultes émergent des pupes.



*Ponte de mouche
Source : Fanny Vernier*

Les premières pontes des mouches peuvent avoir lieu dès que les olives atteignent 8 mm de longueur (stade olive attractive).

Les **piqûres de ponte** se caractérisent par une **tâche brune d'un demi-millimètre de diamètre en forme de triangle ou d'ovale**. Les femelles peuvent pondre 200 à plus 500 œufs en quelques jours : une même femelle ne pond qu'un œuf par olive.



*Piqûre de ponte
Source : France Olive*

Les femelles pondent un œuf sous la peau de l'olive et l'asticot se développe à l'intérieur de la pulpe de l'olive en creusant une galerie. A la fin de son développement, la larve mange la pulpe juste sous l'épiderme et prépare son trou de sortie (environ 2 mm de diamètre). Puis elle recule dans le fruit pour se nymphoser, avant de sortir du fruit **sous forme adulte**. Une génération de mouche se développe alors en un mois environ. Plusieurs générations de mouches peuvent se succéder de juin à octobre en fonction des conditions climatiques.

Les larves, en se nourrissant de la pulpe des olives, provoquent la détérioration des fruits (qualité) et une chute prématurée due à des effets directs (dommages mécaniques) et indirects (agents pathogènes opportunistes). En effet, les mouches en piquant les fruits favorisent **l'apparition de la dalmaticose**, une maladie fongique pouvant causer des pertes de récoltes importantes.


Pour plus d'informations sur la biologie et la gestion de la mouche de l'olive, vous pouvez consulter la page web [Mouche de l'olive - FRANCE OLIVE - AFIDOL](#) et [l'infolive n°8](#).

Observations

Le stade olive attractive (longueur de 0,8 mm) est atteint sur les secteurs précoces varois, audois, corses et de la basse vallée du Rhône (zones littorales et/ou variétés précoces). Ce stade devrait aussi être atteint très rapidement (quelques jours à peine) sur les secteurs précoces gardois et héraultais mais aussi dans les Pyrénées orientales.

Les secteurs intermédiaires où le grossissement des fruits a débuté devraient atteindre le stade olive attractive très rapidement.

Sur les pièges déjà installés, les captures de mouches sont actuellement faibles sur l'ensemble du territoire (comme le montre la carte de piégeage ci-dessous). Les niveaux de piégeage à la même période l'an dernier étaient similaires.



Carte de piégeage de la mouche de l'olive (moyenne des captures par zones sur les 7 derniers jours)

Source : Extrait de l'application Oléiculteur

Évaluation du risque

Les olives sont réceptives à la ponte de la mouche dès qu'elles atteignent 0.8 cm de longueur. La dynamique de vol de la mouche de l'olive et la présence des premières piqures peuvent vous servir à évaluer le risque.

Sur les secteurs les plus précoces (littoraux et/ou variétés précoces), les olives sont ou vont être attractives à la mouche (longueur > à 0.8 cm) très rapidement.

- Si vos olives ne sont **pas encore attractives**, alors le risque évalué est **faible**.
- Si vos olives sont **attractives** mais que vous n'avez **pas de capture** de mouches de l'olive, alors le risque est **modéré**.
- Si vos olives sont **attractives** et que vous avez des **captures** de mouches, alors le risque est **fort**.



Vous pouvez consulter les cartes de captures de mouches autour de vous sur l'application **Oléiculteur** disponible sur le site de France Olive et sur ce lien : <https://oleiculteur.franceolive.fr/connexion>. Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez le créer gratuitement, « créer votre exploitation » et lancer une recherche autour de vous dans un rayon donné.

Gestion du risque

- Le suivi de piégeage (hebdomadaire) contre la mouche de l'olivier est la meilleure stratégie pour détecter et évaluer la pression mouche avant d'observer des conséquences sur la production. **La mise en place des pièges chromatiques à phéromone est fortement recommandée.** Ces pièges sont à positionner dès maintenant. Les pièges doivent être relevés une fois par semaine.

Soyez vigilants à cette première génération de mouche sur fruits attractifs : ce sont les premières piqûres qui sont à l'origine des dégâts de dalmaticose !

COMMENT INSTALLER SON PIÈGE ?



Photo 1

ÉTAPE 1

Équipez-vous d'une capsule de phéromone, d'une plaque jaune engluée et de liens pour fixer le piège.

Capsule de phéromone



Photo 2

ÉTAPE 2

Positionnez le piège comme sur la photo 2.

Manuel du piégeage de la mouche d'olive - Mars 2022

- Les barrières minérales protègent les olives des piqûres et des pontes. **Les barrières minérales sont les seules protections permettant de lutter contre la dalmaticose en protégeant les fruits des piqûres !** Soyez vigilants et pensez à les appliquer si c'est nécessaire. [Vous trouverez la liste des argiles autorisés en biocontrôle sur ce lien, sous la dénomination Silicate d'aluminium.](#)



- **Les pièges alimentaires**, comme les pièges bouteilles servent à piéger massivement la mouche. Vous pouvez les mettre en place dès à présent **uniquement si les fruits ont atteint 0,8 cm de long OU si votre parcelle est isolée**, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'autre parcelle d'oliviers à proximité. Ainsi vous pourrez réduire la population initiale de mouche. **Dans le cas contraire vous risquez d'attirer les mouches dans vos parcelles. Attendez le développement des fruits avant de mettre en place le piégeage massif car les mouches seront moins mobiles.**

Vous pouvez consulter des ressources sur la fabrication d'un piège alimentaire en suivant le lien suivant : <https://afidol.org/oleiculteur/piegeage-massif-de-la-mouche-de-lolive/>.



Chaque dernier mercredi du mois à 18h, le pôle agronomie de France Olive anime une courte visioconférence : les 30 minutes agro ! Ce rendez-vous mensuel vous permet de venir échanger avec l'équipe de ce pôle et de poser vos questions techniques. **Le prochain rendez-vous a lieu le 24 juin 2026 où la thématique de la mouche de l'olive sera abordée.** [Le lien de connexion est accessible sur le site de France Olive.](#)

Sommaire

Cochenilles diaspines

Eléments de biologie

La cochenille diaspine en question a récemment été identifiée par l'ANSES comme *Acutaspis paulista* (première détection en France). En plus d'être présente sur l'olivier, elle est également détectée sur diverses espèces végétales ornementales ou sauvages, comme le fusain (*Euonymus spp.*), le troène (*Ligustrum spp.*), le lierre commun (*Hedera helix*) ou l'acacia (*Robinia pseudoacacia*).

Pour plus d'éléments sur son cycle biologique, vous pouvez consulter le [BSV n°6](#).



Cochenille diaspine *Acutaspis paulista*

Source : Fanny Vernier (CA83)

Cette cochenille ne sécrète pas de miellat (cochenille à bouclier). Elle ne favorise donc pas le développement de la fumagine (complexe de moisissures saprophytes noirâtres). En revanche, **ses piqûres d'alimentation sur les tissus végétaux** (feuilles, pousses, fruits) peuvent entraîner, notamment en cas de pullulation, **des dégâts importants** : jaunissement du feuillage, défoliation, dessèchement de rameaux et de branches, perte de récolte, parfois dépérissement total de la plante hôte.

Observations

Les foyers d'*Acutaspis paulista* mentionnés dans les bulletins précédents sont toujours présents sur le littoral varois et les Pyrénées-Orientales.

Le suivi du réseau d'observations des larves mobiles sur des parcelles atteintes dans le Var se poursuit : les parcelles suivies sont situées à Hyères, Carqueiranne, La Cadière-d'Azur, La Ciotat, Sauvebonne, La Londe-les-Maures, Sanary-sur-mer.

Les observations de ce réseau de parcelle tendent à montrer que le plus gros du pic d'essaimage est passé. En revanche, l'essaimage n'est pas terminé puisque de jeunes stades larvaires se fixent progressivement sur les petits fruits. Sont également observées des femelles avec des pontes et/ou de jeunes larves sous les boucliers.

Analyse du risque

Le risque évalué est **fort à très fort** si des foyers de **cochenilles Diaspines** sont présents sur la parcelle. Le risque est **faible** si vous n'observez pas de foyers. Les risques annoncés correspondent aux risques potentiels connus des rédacteurs et ne tient pas compte des spécificités de votre exploitation.



APPEL A VIGILANCE



Bien que cette cochenille ne soit pas réglementée, elle est considérée comme un ravageur émergent important dans la filière oléicole. **Afin de connaître l'étendue de sa dissémination, il est primordial de faire remonter toute observation ou suspicion de sa présence auprès de France Olive** (contact@franceolive.fr).

Gestion du risque

- **Favoriser la biodiversité** : les cochenilles sont régulées par de nombreux prédateurs généralistes (coccinelles comme *Exochomus quadripustulatus*, chrysopes) et par des parasitoïdes spécifiques (à identifier).

- **D'après les observations sur le réseau de parcelles, le pic d'essaimage semble être passé sur certains sites. Il n'est pas terminé pour autant et de jeunes stades larvaires se fixent peu à peu sur les petits fruits.**

Si vous observez une forte pression de cochenille diaspine *Acutaspis paulista* sur olivier, deux solutions de biocontrôle à base d'huile essentielle d'orange sous dérogation sont utilisables :

- **Essen'ciel jusqu'au 30/07/2026, pour utilisateurs ayant le certiphyto**
[*\(plus d'infos sur les conditions d'emploi ici\)*](#)
- **Limocide J jusqu'au 11/08/2026, pour utilisateurs avec ou sans certiphyto**
[*\(plus d'infos sur les conditions d'emploi ici\)*](#)

Ces solutions doivent être positionnées :

- **au plus proche du pic d'essaimage des jeunes larves** (stade mobile durant lequel les larves sortent de sous les bouliers des mères) → **c'est une bonne période pour réaliser un traitement car des essaimages sont toujours en cours, surtout si vous n'avez pas encore traité.**
- **en dehors des fortes chaleurs ou en fin de journée** (températures inférieures à 30°C dans les 6 heures suivant l'application) → **avec les températures actuelles en journée, nous vous recommandons de traiter la nuit !**
- **dans des conditions d'utilisation strictes** (respect des consignes de protection de l'utilisateur, respect des zones non traitées, respect de recommandations d'emploi, ...);
- **avec un mouillage suffisant.**



Attention ! Nous n'avons pas de recul sur l'utilisation de ces produits dans ces conditions sur oliviers : nous ne connaissons pas l'effet sur les petits fruits.



Assurez l'irrigation nécessaire à vos arbres pour les soutenir dans cette période critique phénologiquement où ces traitements peuvent être source de stress supplémentaire.



Ne soyez pas étonné de voir encore des cochenilles après le passage d'un traitement. En effet, ces protections sont efficaces sur les larves mobiles et les tous jeunes stades fixés. Il n'aura pas d'incidence sur les femelles avec des œufs et des larves sous les bouliers mais permettra de limiter l'essaimage et diminuer tout de même la population.

Afin de maximiser l'efficacité de votre protection tout en respectant les conditions d'emploi, nous vous recommandons fortement de consulter [l'infolive n°8](#) ainsi que [le site de France Olive](#).

Éléments de Biologie

L'œil de paon et la cercosporiose sont deux maladies fongiques problématiques sur l'olivier. Elles provoquent des dégâts importants (défoliation) qui peuvent impacter la production.



Symptômes d'œil de paon

Source : France Olive



Symptômes de cercosporiose

Source : France Olive

Pour avoir plus d'informations sur les symptômes et les dégâts ainsi que sur les cycles biologiques de ces maladies, consultez le [BSV n°1](#) ou [le webinaire sur les maladies du feuillage](#).

Observations

Les symptômes de cercosporiose sont de plus en plus visibles, et plus visibles que les symptômes d'œil de paon dans les secteurs alpins méridionaux, dans le Nyonsais et les Baronnies, dans les plaines gardoises.

Ailleurs :

- sur les secteurs varois et la basse vallée du Rhône, des symptômes d'œil de paon et de cercosporiose sont observés ;
- peu de cercosporiose est observée dans les zones de la basse vallée de la Durance, du Luberon et des piémonts du Ventoux ;
- en Haute-Provence, il y a eu de symptômes de maladies du feuillage.

Des feuilles jaunes, laissant présager d'une défoliation, apparaissent dans les plaines gardoises, dans les Pyrénées orientales et dans les secteurs entre la basse vallée de la Durance, le Luberon et les piémonts du Ventoux.

La présence et l'intensité des symptômes observés sont très variables et dépendent fortement de la conduite culturale (positionnement de protections, renouvellement des protections, environnement de la parcelle, qualité de pulvérisation).

Analyse du risque

L'absence d'épisodes humides combinée à des températures estivales **rendent les conditions défavorables aux contaminations** par les maladies du feuillage (œil de paon et cercosporiose)



Pour vous aider également à évaluer le risque sur vos parcelle d'oliviers vous disposez maintenant d'un outil d'aide à la décision gratuit et ouvert à tous, disponible sur smartphone et internet à savoir [l'application « Oléiculteurs »](#).

Cet outil intègre un modèle de décision « œil de paon » qui permet de déterminer un niveau de risque en croisant des données météorologique de proximité (weenat), vos observations et vos interventions.

- Œil de paon

Vu les prévisions météorologiques annoncées, le risque est faible.

Le risque évalué est valable à court terme. Il est basé principalement sur les observations récentes des techniciens partenaires du réseau d'observation piloté par France Olive, et des conditions météorologiques prévisionnelles. Ce risque est à pondérer avec d'autres paramètres comme l'inoculum présent dans vos parcelles, la défoliation ou la sensibilité variétale, et ne prend pas en compte le niveau de protection des parcelles.

- Cercosporiose

Vu les prévisions météorologiques annoncées, le risque est faible.

Ce risque est à pondérer avec d'autres paramètres comme l'inoculum présent dans vos parcelles, la défoliation ou la sensibilité variétale (Cailletier, par exemple est très sensible à cette maladie), et ne prend pas en compte le niveau de protection des parcelles.

Gestion du risque

Pour limiter l'intensité et l'occurrence du risque des maladies du feuillage il est important de mettre en œuvre sur vos vergers des mesures **prophylactiques** comme :

- **L'entretien de vos parcelles :** toutes les mesures permettant de limiter le maintien d'une atmosphère humide à l'intérieur de votre verger doivent être mises en œuvre ;
- **La fertilisation et l'irrigation de vos arbres :** Une bonne alimentation hydrominérale de vos arbres va permettre un renouvellement plus rapide du feuillage (pousse plus importante) et certainement améliorer la résistance de vos arbres (attention aux excès notamment d'azote qui pourraient au contraire augmenter la sensibilité de vos arbres à certains bio-agresseurs).

APPEL A VIGILANCE

Datura stramoine

Le datura stramoine, bien qu'absent à notre connaissance des parcelles oléicoles, peut être difficile à gérer. A titre informatif, vous trouverez la note nationale concernant cette espèce [ici](#).

Avertissement

Le BSV est un outil d'aide à la décision, les informations données correspondent à des observations réalisées sur un échantillon de parcelles régionales. Le risque annoncé correspond au risque potentiel connu des rédacteurs et ne tient pas compte des spécificités de votre exploitation.

Par conséquent, les informations renseignées dans ce bulletin doivent être complétées par vos propres observations avant toute prise de décision.

Comité de rédaction

France Olive Production – Justine CHAZALVIEL

Relecture

DRAAF - SRAL PACA

Chambres régionales d'agriculture Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur

Observation

Christine Agogué – CA 11

Anaïs Bascoul – CivamBio 66

Corinne Barge – CIVAM oléicole 13

Elian Escande – CivamBio 11

Alix Gleize – CA 30

Elise Rouanet – AOP Haute Provence

Sébastien Leverge – Consultant en oléiculture

Cécile Despin – Groupement des Oléiculteurs de Vaucluse

Bastien Signoret / Joshua Berthomeu - Coopérative du Nyonsais

Benoît Chauvin-Buthaud – CA 26

Célia Gratraud – Consultante en oléiculture

Maud Damiens – CA 06

Sébastien Le Verge – Conseiller indépendant 13/83

Nathalie Serra-Tosio – SIOVB (Baux de Provence)

Alex Siciliano – GOHPL (Haute Provence et Luberon)

Fanny Vernier – CA 83

Francois Vevrier – CETA d'Aubagne



Vous abonner



Devenir
observateur
& contact



Tous les BSV
PACA