



AMBROISIES : IL EST ENCORE TEMPS (MAIS PLUS TROP !) DE LES ELIMINER AVANT GRENAISON

Directeur de publication :

Denis CARRETIER
Président de la Chambre
Régionale d'Agriculture
d'Occitanie
BP 22107
31321 CASTANET
TOLOSAN Cx
Tel 05.61.75.26.00

Dépôt légal : à parution

Les graines les plus précocement formées arrivent à maturité avant mi-septembre. En revanche, les travaux ou fauches intermédiaires permettent de retarder le mûrissement des graines.

Attention, pensez à vous protéger des pollens, en mettant des EPI comme lors de traitements chimiques.

Hors Zone Vulnérable, attention aux parcelles couvertes d'ambrosies, si vous avez déclaré ces dernières comme couvert obligatoire pendant 6 semaines durant la période entre le 1er septembre et le 30 novembre ; en cas de doute, veuillez-vous rapprocher de votre technicien de secteur. La question peut se poser pour des parcelles de céréales en chaume qui n'auraient pas été encore détruites (ou l'auraient été) mais qui présentent des repousses d'ambrosies.

En Zone Vulnérable, le programme d'action régional (Directive Nitrates) ayant évolué (Arrêté préfectoral adopté le 15 juillet 2024) avec une mise en application le 01 septembre 2024, rapprochez-vous aussi de vos techniciens de secteur ou de vos conseillers territoriaux de Chambre d'agriculture.

- **Ambrosie à feuille d'armoïse** (*Ambrosia artemisiifolia* L.), **Ambrosie trifide** (*Ambrosia trifida*)

Attention : Si la destruction par déchaumage ou désherbage chimique n'a pas pu être effectuée avant floraison, **toute intervention réalisée à partir de début septembre sera source de propagation des graines**. Broyer (ou éventuellement faucher) une première fois fin juillet aura permis de retarder la grenaison et d'intervenir en septembre avec moins de risque de dissémination. Si ces opérations n'ont pas pu être effectuées, il faut maintenant agir avant début de grenaison, **tout en se protégeant des pollens**.

En interculture :

La gestion des ambrosies en période estivale est une étape clé pour limiter leur prolifération. Une ou plusieurs opérations sont nécessaires, avec comme impératif de détruire les ambrosies avant leur grenaison (idéalement avant leur floraison). Il est important de repasser voir l'effet des travaux sur le couvert et de surveiller l'état physiologique des ambrosies et leur reprise éventuelle.

Attention, les déchaumages ne sont pas toujours complètement efficaces si le travail est trop profond, ne laissant pas les ambrosies arrachées en surface dessécher, ou si l'écartement entre les dents est trop important, ne couvrant pas toute la surface.

Si le travail du sol n'est pas possible, vous pouvez encore retarder le cycle en passant un broyeur ou en fauchant. Il sera nécessaire de renouveler l'opération au bout de 4 à 5 semaines, les ambrosies coupées au-dessus du collet ayant une grande capacité à recéper.



Reprise d Ambrosies trifide dans chaumes, 20/08/26, Isaut de l'Hotel, 22/07/26 Haute Garonne. Source : FREDON Occitanie

Levée d'ambrosies à feuilles d'armoise dans chaumes, La Cassaigne, Aude . Source : Fredon Occitanie

Attention, si la gestion est faite en chimique sur des stades trop avancés (plus de 8 feuilles) : le risque d'échec et d'induction de résistances est très élevé.

En bordure de parcelle :

Les bordures de parcelles, de même que les zones où la culture est clairsemée, sont des lieux de pleine lumière, favorables au développement rapide des ambrosies.

Pour ne pas les laisser grainer et contaminer vos parcelles, il devient urgent de détruire la végétation d'ambrosie.



Pied d'ambroisie à feuilles d'armoise en bordure de parcelle de tournesol, La Cassaigne, Aude , 27/07/26

En infestation sur vos cultures de printemps :

En cas d'infestation, les récoltes des cultures sont concomitantes à la grenaison des ambroisies. Il convient alors de gérer les chantiers^(a) afin d'éviter au maximum la propagation des graines, de même que de risquer un [taux élevé d'impuretés dans la récolte](#).

Il est recommandé de surveiller vos entrées de bordures de parcelles, et de les tenir propres pour que ce ne soit pas une zone de recontamination.

En dernier recours, le broyage des parties les plus infestées avant grenaison est recommandé (concurrence végétale ayant entraîné une forte baisse de rendement locale + fort risque de récolte de graines d'ambroisies).

Attention, l'**écimage**^(b) de l'ambroisie en soja, lentilles, pois-chiches... est très délicat à positionner en raison de sa capacité à refaire des rameaux florifères et autant de graines, même au mois de septembre et parfois même dans la canopée de la culture.

(b) [Doc synthèse 2 essais écimage de l'ambroisie en soja Terres Inovia VDiff \(002\).pdf](#)



Ambroisies trifide dans tournesol , 20/08/26 Encausse les Thermes, Haute Garonne ; Source : Fredon Occitanie

(a) Une plaquette CUMA France/FREDON France recommande une **organisation du chantier afin d'éviter la propagation** :

- Repérer les différentes zones sur le chantier
- Commencer par la zone la moins infestée pour ne pas favoriser la dissémination des graines et la progression de l'ambrosie
- Terminer par la zone la plus infestée-
- Procéder à un nettoyage sur place de votre machine avant de passer à tout autre chantier (cf. www.arvalis-infos.fr). Dans la mesure du possible, utiliser un souffleur de feuilles à moteur thermique autonome en passant sur les parties de la machine susceptibles d'abriter des graines. L'efficacité de nettoyage du souffleur sur l'ensemble des éléments est bien meilleure que le balayage. À défaut, utiliser le souffleur de la moissonneuse-batteuse pour nettoyer les parties sensibles

Quelques ressources pour plus d'informations :

- [Présentation de l'ambrosie en milieu agricole](#)
- La brochure « [Les ambrosies : un problème agricole et de santé publique qui ne fait que commencer](#) » réalisée par la CRA Occitanie, Terres Inovia, l'ACTA, la Fredon Occitanie
- Le site de FREDON Occitanie : <https://www.fredonoccitanie.com/ambrosies/ressources-ambrosie/>
- Tout savoir sur les ambrosies : [site de l'Observatoire des ambrosies](#)



Vous pouvez signaler la présence d'ambrosies via la plateforme nationale signalement-ambrosie, afin de mieux connaître la répartition des ambrosies sur le territoire et améliorer la lutte collective.



Vous rencontrez des difficultés avec la plateforme ? Mél : contact@signalement-ambrosie.fr ; Tél : 0 972 376 888

REPRODUCTION DU BULLETIN AUTORISÉE SEULEMENT DANS SON INTÉGRALITÉ (REPRODUCTION PARTIELLE INTERDITE)

Ce bulletin de santé du végétal a été préparé par la FREDON Occitanie.

Ces bulletins sont produits à partir d'observations ponctuelles. S'ils donnent une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La CRA d'Occitanie dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base des observations qu'ils auront réalisées et en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.

Avec le soutien financier de



Financé dans le cadre
de la stratégie **écophyto**

