

Abonnez-vous
gratuitement
aux BSV de la région
Occitanie



A retenir

POMMIER

Pucerons : pas d'éclosions de fondatrices observées

POIRIER

Psylle : Période de ponte en cours depuis le 21 janvier

Anthonome du poirier : Larves observées dans les bourgeons

PRUNIER- ABRICOTIER

ECA : Vol incertain. Les conditions météorologiques sont favorables au vol. Pas de battage pour le moment qui pourrait confirmer le début du vol. Arracher les arbres malades. La feuillaison précoce est repérable en ce moment

PÊCHER

Cloque : Risque moyen en cours. Quelques précipitations sont prévues en fin de semaine et semaine prochaines. Le risque est présent sur les variétés au stade pointe verte

ESPECES A NOYAUX

Bactériose : Risque en cours sur variétés et espèces ayant atteint le stade sensible (pruniers américano-japonais, abricotier et sur une majorité de pêcher) qui est le stade B avec l'ouverture des écailles (porte d'entrée de la maladie). Des précipitations sont prévues qui pourraient amener des contaminations



Directeur de publication :

Denis CARRETIER
Président de la Chambre
Régionale d'Agriculture
d'Occitanie
BP 22107
31321 CASTANET
TOLOSAN Cx
Tel 05.61.75.26.00

Dépôt légal : à parution

Comité de validation :
CEFEL, Chambre
d'agriculture du Tarn-et-
Garonne, Chambre
régionale d'Agriculture
d'Occitanie, DRAAF
Occitanie, QUALISOL

écophyto
Réduire et améliorer l'utilisation des phytos

Action pilotée par le Ministère
chargé de l'agriculture et le
ministère chargé de l'écologie,
avec l'appui financier de
l'Agence Française pour la
Biodiversité, par les crédits
issus de la redevance pour
pollutions diffuses attribués au
financement du plan Ecophyto.

POMMIER

• Stades phénologiques

Stade A partout.

• Pucerons (*Dysaphis plantaginea* et *Rhopalosiphum insertum*)

Nous avons observé les toutes premières éclosions le 02 Février (inférieures à 6 % des œufs suivis). En 2025, nous avons observé les premières éclosions le 14 Février.

Evaluation du risque : La période de risque démarre avec le début des éclosions des fondatrices et la présence de pointes vertes. Il n'y a donc pas de risque car aucune pointe verte observée à l'heure actuelle. Il faut savoir que l'observation des œufs d'hiver de puceron cendré et des premières fondatrices est assez difficile.

Seuils de nuisibilité :

Puceron vert migrant : 60% de bouquets occupés

Puceron cendré : dès présence

POIRIER

- **Stades phénologiques**

Stades A.

- **Psylle du poirier (*Cacopsylla pyri*)**

Le psylle hiverne au stade adulte. Les femelles hivernantes pondent à partir de mi-janvier (quand températures >10°C pendant 2 jours de suite) à la base des bourgeons à fleur. Les œufs jaune clair au départ se colorent en jaune orangé puis, peu avant leur éclosion, on peut distinguer les yeux de la larve sous la forme de 2 points rouges. La 1ère génération éclot généralement pendant la période de floraison du poirier.

Nous avons observé les toutes premières pontes le 16 Janvier.

Évaluation du risque : Début du risque. La période de ponte devrait s'intensifier.

Mesures prophylactiques et/ou techniques alternatives :

Des applications d'argile ou de BNA dès le début des pontes et pendant toute la durée de la période de ponte ont un effet de barrière physique intéressant et permettent de réduire très significativement les niveaux de populations au printemps.




Poirier, Ponte de psylle (16/01/26),
Photo Philippe Prieur

PRUNIER – ABRICOTIER - PECHER

• Stades phénologiques

Prunes Japonaises	<u>Variétés très précoces :</u> <i>African Rose, Tasty Sweet, 09111</i>	Stade C (C2) avec boutons verts séparés et tout début stade D sur quelques parcelles précoces
	<u>Variétés précoces :</u> <i>Fortune, Grenadine, Flavor Suprem, September Yummy</i>	Début Stades C
	<u>Variétés Tardives :</u> <i>TC SUN, Ruby Crunch, October Sun</i>	Stade B à C
Abricotier	<u>Variétés très précoces (3-4 variétés) :</u> <i>Wondercot, Perlocot, Prica</i>	Stade début B à B (Wondercot)
	<u>Autres variétés :</u>	Stade A
Pêcher	<u>Autres variétés :</u> <i>Garaco, Najiris, Carene, May Pearl, Najireine, Najero, Nablara, Crimson Lady Ivory Star</i>	Stade A majoritaire. Stade B observé sur une partie des variétés. Stade pointe verte observée sur une partie des parcelles.



Prune Japonaises, variété Fortune, Stade C
Photo Henry Azzopardi 2025



Pêcher, variété Wondercot, Stade B avancé,
Photo Anne Pennavayre 2026

• Enroulement chlorotique de l'abricotier (ECA)

Des symptômes d'ECA sont observés en ce moment avec moins d'intensité et de fréquence qu'en 2025 où ils étaient observés dès le mois de Novembre et en grand nombre.

La semaine dernière, aucun psylle n'avait été capturé lors des battages. Cette semaine, il n'y a pas eu de battage pour le moment.

Si l'on prend les 10 dernières années à cette date, le vol avait démarré dans 30 % des cas.

Les symptômes de l'ECA sont très flagrants à cette époque et depuis plusieurs mois : les arbres malades présentent une feuillaison précoce qui aide à les repérer rapidement et facilement. Elle aide aussi le psylle du prunier, vecteur du phytoplasme, à repérer ses hôtes en les attirant préférentiellement vers les arbres malades qui sortent déjà des feuilles. Les psylles vont alors se charger de phytoplasme lors des piqûres d'alimentation.

L'expression des symptômes est plus modérée cette année.



Arbre malade à feuillaison précoce – Photo CA82

Évaluation du risque : Pas de capture mais vol possible. Il n'y a pas eu de capture la semaine dernière et les conditions météo sont moyennement favorables au vol. Cependant, il est aussi possible que le vol ait démarré cette semaine.

C'est un bon moment pour appliquer les barrières physiques qui sont un complément à la lutte contre le psylle.

Le psylle s'alimente sur le bois. Le risque est donc présent quel que soit le stade de développement de l'arbre. L'arrachage des arbres malades et l'application de barrières physiques doivent être réalisés avant le début du vol.

Mesures prophylactiques : Il convient de repérer et éliminer (arracher et brûler) au plus vite les arbres qui présentent un débourrement anormalement précoce (feuillaison avant la floraison) et qui serviront de réservoir de phytoplasme.

Techniques alternatives : L'application de barrières physique (argile, Hydroxyde de Calcium...) présente un intérêt en complément de l'arrachage des arbres malades. Elle est à réaliser avant le début du vol du psylle.

PECHER

• Stades Phénologiques

Stades A majoritaire et stade B observé à plusieurs encroits. Pointes vertes observées sur plusieurs secteurs.

• Cloque (*Taphrina deformans*)

Le stade sensible pour les contaminations de cloque est le stade pointe verte, lorsque les bourgeons à bois s'entrouvrent et permettent la pénétration des spores transportées par l'eau. Une fois le stade sensible atteint, les contaminations ne sont possibles qu'en cas de pluies et de températures supérieures à 7°C.

Évaluation du risque : Risque fort en cours sur les variétés ayant atteint le stade sensible (pointe verte), ce qui est observé au verger sur une partie des parcelles. La période de risque cloque débute sur ces secteurs et variétés. Les températures devraient dépasser les 7°C ce qui permet des contaminations en cas de précipitations. Des précipitations sont prévues ce qui pourrait entraîner des contaminations.



Pêcher, variété Garaco, Stade B,
Photo Philippe Prieur 2026

CERISIER

• Stades Phénologiques

Stades A.

ESPECES A NOYAUX

• Bactérioses (*Xanthomonas*, *Pseudomonas*...)

Les dégâts de bactérioses peuvent être importants sur les espèces à noyaux, en prunier japonais et en abricotier surtout, mais aussi en pêcher. Selon les espèces et les types de bactéries, ces bactérioses se traduisent par des criblures du feuillage, des taches sur fruits, des mortalités de branches, des mortalités de bourgeons à fleur et des méplats avec parfois écoulement de gomme.

Le débourrement actuel en prunier japonais, en abricotier et en pêcher avec l'ouverture des bourgeons est une période propice aux contaminations.

Évaluation du risque : Risque fort en cours sur variétés et secteurs précoces (variétés ayant atteint le stade B). La période à risque débute avec l'ouverture des bourgeons et le risque est renforcé si les conditions climatiques sont humides (ce qui devrait être le cas cette semaine).

Mesures prophylactiques :

- A la taille, il convient de supprimer les rameaux présentant des dessèchements bactériens ou des chancres sur bois ;
- Sur les espèces très sensibles comme l'abricotier, il convient d'éviter autant que possible de tailler (et donc de créer des portes d'entrée aux bactéries) tant que le temps est froid et humide. Il est préférable d'attendre que le temps soit plus sec, quitte à tailler proche de la floraison.

Annexe – Notes nationales Biodiversité – BSV (cliquer sur les images)



Produits de Biocontrôle



Résistances aux pesticides

REPRODUCTION DU BULLETIN AUTORISÉE SEULEMENT DANS SON INTÉGRALITÉ (REPRODUCTION PARTIELLE INTERDITE)

Ce bulletin de santé du végétal a été préparé par l'animateur filière arboriculture de la Chambre d'agriculture du Tarn-et-Garonne et élaboré sur la base des observations réalisées par le CEFEL, la Chambre d'agriculture du Tarn-et-Garonne et QUALISOL.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La CRA d'Occitanie dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base des observations qu'ils auront réalisées et en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.

Avec le soutien financier de



Financé dans le cadre
de la stratégie **ecophyto**

