



A retenir

MILDIU



Le risque est modéré. Quelques rares symptômes sont visibles. Restez vigilants à l'approche de la floraison.

BLACK-ROT



Des symptômes sont visibles sur feuilles. Restez vigilants.

OIDIUM



Les symptômes sont en progression sur un témoin non traité à fort historique.

FLAVESCENCE DOREE

Traitements obligatoires : T1 du 14 juin au 23 juin

Annexes : [Liste des mesures alternatives et prophylactiques en viticulture](#)
[La note technique commune vigne 2025](#)

METEO

• Météo de ces derniers jours

Le début de la semaine a été calme et sec. Le pic de chaleur annoncé pour la fin de la semaine dernière a bien eu lieu. Les températures ont pu monter jusqu'à plus de 30°C dans notre région. A partir de dimanche, la dégradation annoncée nous a apporté quelques précipitations.

• Précipitations de ces derniers jours (Source Météo France)

Station	lundi 26 mai 2025	mardi 27 mai 2025	mercredi 28 mai 2025	jeudi 29 mai 2025	vendredi 30 mai 2025	samedi 31 mai 2025	dimanche 1 juin 2025	Cumul hebdomadaire	Cumul depuis maturité moyenne de la masse des œufs en Midi Pyrénées (26/04/25)
Balsac (radar)	0	0	0	0	0	0	3,3	3,3	79,7
Compeyre (radar)	0	0	0	0	0	0	14,7	14,7	113,6
Marcillac (radar)	0	0	0	0	0,1	0	3,2	3,3	80

Directeur de publication :

Denis CARRETIER
Président de la Chambre
Régionale d'Agriculture
d'Occitanie
BP 22107
31321 CASTANET
TOLOSAN Cx
Tel 05.61.75.26.00

Dépôt légal : à parution
Comité de validation :
Chambre d'agriculture de
l'Aveyron, Chambre
régionale d'agriculture
d'Occitanie, DRAAF
Occitanie, Unico cave de
Valady

• **Prévisions du 3 juin au 9 juin (Source Météo France)**

Date	mar 03/06	mer 04/06	jeu 05/06	ven 06/06	sam 07/06	dim 08/06	lun 09/06
Température (°C)	14-28	13-24	12-27	13-30	15-29	12-28	11-32
Pluie (mm)	4-12	9-27	0-2	2-14	0-11	0-2	0-1
							

La perturbation de ce début de semaine devrait se prolonger jusqu'à samedi, avec des cumuls de précipitations significatifs. Les températures devraient rester assez hautes, proche des 30°C en journée.

STADES PHENOLOGIQUES

			
Stades BBCH	55	57	63
Descriptif des stades	Grappes séparées – boutons floraux encore agglomérés	Boutons floraux séparés	5% des fleurs sont ouvertes
Marcillac Précoces			
Marcillac Tardives			
Entraygues			
Millau			
Estaing			

Code couleur		Stade majoritaire
		Stade minoritaire

BLACK ROT (GUIGNARDIA BIDWELLII)

- **Éléments de biologie**

[ephytia.inra - Biologie-epidemiologie du Black Rot](http://ephytia.inra.fr/Biologie-epidemiologie-du-Black-Rot)

- **Situation au vignoble**

De nouvelles taches sont visibles sur feuilles ; notamment sur le secteur de Marcillac. Des contaminations ont pu avoir lieu lors des dernières précipitations.

Évaluation du risque : Le risque est modéré. Soyez attentifs aux périodes d'humectations prolongées.



Symptôme de Black Rot sur feuille

Photo Syndicat du Chasselas

MILDIOU (PLASMOPARA VITICOLA)

- **Éléments de biologie**

Pour plus d'informations, suivre ce lien : [Mildiou – Ephytia \(Biologie, Epidémiologie\)](#)

- **Modélisation (Potentiel système)**

Situation au 1^{er} juin :

Le risque est modélisé faible sur tous les secteurs. Aucune contamination épidémique modélisée la semaine passée. Les extériorisations des contaminations de mi-mai étaient modélisées ces derniers jours.

Simulation au 8 juin :

Le risque reste faible à J+7. Le cumul nécessaire pour entraîner des contaminations épidémiques augmente beaucoup, il est de 60mm cumulés sur tous les secteurs. Les extériorisations des contaminations ayant pu avoir lieu autour du 20 mai sont modélisées dans les jours qui viennent. Le temps d'incubation modélisé est d'environ 14 jours pour ces contaminations.


- **Situation au vignoble**

Encore de nouvelles taches observées sur pampres. Les symptômes restent rares.

Évaluation du risque : A l'approche de la floraison, et des conditions météo instables, il faut rester vigilant.



Techniques alternatives : L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle [en cliquant ICI](#).



OÏDIUM (*Erysiphe necator*)

• Éléments de biologie

Suivre ce lien : [ephytia.inrae.fr-Biologie-epidemiologie de l'oïdium](https://ephytia.inrae.fr/Biologie-epidemiologie-de-l'oïdium)

Même pour les cépages peu sensible la période de sensibilité démarre au stade boutons floraux séparés.

Ce champignon ne nécessite pas d'eau liquide pour germer et se développer, il peut même être lessivé par des pluies abondantes. Cependant les humidités relatives élevées lui sont favorables ; son développement requiert une hygrométrie élevée et une faible luminosité. C'est pourquoi, il affectionne les vignes vigoureuses dans lesquelles la lumière pénètre moins bien.



Oïdium sur feuilles
Crédit photo : Euphytia-INRAE

• Situation au vignoble

Légère progression des symptômes d'oïdium autour des foyers à drapeaux observés en début de saison.

Évaluation du risque : Le stade phénologique actuel est très sensible à l'oïdium. Les conditions sont relativement favorables à ce champignon. Portez une **attention particulière** sur les **cépages sensibles** et dans les **zones à historique oïdium**.



Techniques alternatives : L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle [en cliquant ICI](#).

VERS DE LA GRAPPE (*LOBESIA BOTRANA*)

- **Éléments de biologie**

Suivre ce lien : [Vers de la grappe – Ephytia \(Biologie, Epidémiologie\)](#)

- **Modélisation (EVA)**

Selon le modèle, nous serions au stade L2 majoritaire.

- **Situation au vignoble**

Pas de capture. Nous sommes en attente des premières larves.

Évaluation du risque : Dès l'apparition des glomérules, il est important de définir un niveau de pression de la deuxième génération, afin d'anticiper la pression de cette dernière.

Seuil indicatif de risque : 10 glomérules pour 100 grappes.



Figure 1 : Vers de la grappe - Crédit photo : Val de Gascogne

CICADELLE DE LA FLAVESCENCE DORÉE

(*Scaphoidus Titanus*)

- **Protocole de surveillance**

Un dispositif de suivi des éclosions des oeufs est mis en place à l'IFV. Ce dispositif permet à la

DRAAF de définir les dates réglementaires d'intervention (1 mois après les premières éclosions). Ces résultats sont aussi validés par un suivi des larves sur le terrain. Une fois les dates définies, elles vous seront communiquées par les services de la DRAAF via le BSV.



Larve (L3) de *Scaphoideus titanus* -Crédit
photo www1.pms-lj.si - Database of
Invertebrate Pictures

• Element de biologie

Le T1 est généralement fixé 1 mois après les 1ères éclosions. Ce laps de temps permet aux larves d'éclore en plus grand nombre mais il correspond aussi au temps d'incubation du phytoplasme avant que la cicadelle ne devienne infectieuse.

Pour plus d'informations, suivre ce lien : [Cicadelle de la flavescence dorée – Ephytia](#)

• Situation dans les parcelles

Eclosion de larve en cage d'émergence dans le Tarn depuis le 5 mai. Sur le terrain les premières larves ont été observées le 7 mai. Observation des premières larves sur le secteur de Marcillac le 16 mai. Cette semaine de nouvelles larves L1/L2 observées.

Évaluation du risque : Les dates d'intervention ont été fixées par la DRAAF :

T1	du 14 juin au 23 juin	A venir
T2	en conventionnel : 15 jours après le T1 soit du 29 juin au 8 juillet en AB : 10 jours après le T1 soit du 24 juin au 2 juillet	Prochainement
L'arrêté préfectoral est publié sur le site de la DRAAF, retrouvez-le en cliquant ICI		

OBSERVATIONS



Cétoine



Cigarier



Photos : Gil BENAC-Cave du Vallon

Annexe – Notes nationales Biodiversité – BSV (cliquer sur les images)



Produits de Biocontrôle



Résistances aux pesticides

Prochain BSV, le 11 juin 2025

REPRODUCTION DU BULLETIN AUTORISÉE SEULEMENT DANS SON INTÉGRALITÉ (REPRODUCTION PARTIELLE INTERDITE)

Ce bulletin de santé du végétal a été préparé par l'animateur filière viticulture du Syndicat de défense du Chasselas de Moissac et élaboré sur la base des observations réalisées par la Chambre d'Agriculture de l'Aveyron, le Syndicat AOC Marcillac, la cave des vignerons du Vallon et les agriculteurs observateurs.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La CRA d'Occitanie dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base des observations qu'ils auront réalisées et en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.