



A retenir

MILDIOU		Restez vigilants à l'approche de la floraison.
BLACK-ROT		Des symptômes sont visibles sur feuilles. Restez vigilants.
OIDIUM		Les symptômes sont en légère progression sur un témoin non traité à fort historique.
FLAVESCENCE DOREE		Traitements obligatoires : T1 du 14 juin au 23 juin

Annexes : [Liste des mesures alternatives et prophylactiques en viticulture](#)
[La note technique commune vigne 2025](#)

METEO

• Météo de ces derniers jours

Météo calme et temps relativement sec ces jours derniers. Le ciel est resté longtemps couvert, avec des températures matinales assez fraîches. La rosée, était peu persistante dans la matinée.

• Précipitations de ces derniers jours (Source Météo France)

Station	lundi 2 juin 2025	mardi 3 juin 2025	mercredi 4 juin 2025	jeudi 5 juin 2025	vendredi 6 juin 2025	samedi 7 juin 2025	dimanche 8 juin 2025	lundi 9 juin 2025	Cumul hebdomadaire	Cumul depuis maturité moyenne de la masse des œufs en Midi Pyrénées (26/04/25)
Balsac (radar)	0,6	0,1	8,1	0	0	1,5	0	0	9,7	90,1
Compeyre (radar)	2,2	0,8	1,2	0	0	0	0	0	2	122,3
Marcillac (radar)	0,4	0,9	8,9	0	0	0,6	0,1	0	10,5	90,8

Directeur de publication :

Denis CARRETIER
Président de la Chambre
Régionale d'Agriculture
d'Occitanie
BP 22107
31321 CASTANET
TOLOSAN Cx
Tel 05.61.75.26.00

Dépôt légal : à parution
Comité de validation :
Chambre d'agriculture de
l'Aveyron, Chambre
régionale d'agriculture
d'Occitanie, DRAAF
Occitanie, Unico cave de
Valady

• Prévisions du 11 juin au 17 juin (Source Météo France)

Date	mer 11/06	jeu 12/06	ven 13/06	sam 14/06	dim 15/06	lun 16/06	mar 17/06
Température (°C)	14-38	18-33	17-33	16-34	17-30	14-32	13-33
Pluie (mm)	0-0	0-1	0-1	0-2	0-5	0-1	0-0
							

Le temps pourrait se dégrader légèrement cette fin de semaine ; il ne devrait pas y avoir de pluies significatives. Les températures devraient s'élever bien au-delà de 30°C.

STADES PHENOLOGIQUES

				
Stades BBCH	55	57	61	62
Descriptif des stades	Grappes séparées – boutons floraux encore agglomérés	Boutons floraux séparés	5% des fleurs sont ouvertes	20 % des fleurs sont ouvertes
Marcillac Précoces				
Marcillac Tardives				
Entraygues				
Millau				
Estaing				

Code couleur		Stade majoritaire
		Stade minoritaire

BLACK ROT (GUIGNARDIA BIDWELLII)

- **Éléments de biologie**

[ephytia.inra - Biologie-epidemiologie du Black Rot](http://ephytia.inra.fr/Biologie-epidemiologie-du-Black-Rot)

- **Situation au vignoble**

De rares nouvelles taches sont visibles sur feuilles, principalement sur le secteur de Marcillac et Bruejols. La situation est stable et contrôlée par ailleurs.

Évaluation du risque : Le risque est modéré. Soyez attentifs aux périodes d'humectations prolongées.



Symptôme de Black Rot sur feuille

Photo Syndicat du Chasselas

MILDIOU (PLASMOPARA VITICOLA)

- **Éléments de biologie**

Pour plus d'informations, suivre ce lien : [Mildiou – Ephytia \(Biologie, Epidémiologie\)](#)

- **Modélisation (Potentiel système)**

Situation au 9 juin :

Le risque continue à baisser sur tous les secteurs. Aucune contamination épidémique ni extériorisation de symptômes modélisés la semaine passée selon potentiel système.

Simulation au 16 juin :

Le risque restera faible à J+7. Le cumul nécessaire pour entraîner des contaminations épidémiques reste élevé, il est de 40 à 50mm cumulés sur tous les secteurs. Aucune extériorisation n'est attendue cette semaine selon le modèle.


- **Situation au vignoble**

Quelques nouvelles taches observées sur chenin. Ces symptômes sont probablement issus de contaminations ayant eu lieu lors des pluies du 19 mai. Les symptômes restent rares. La situation reste pour l'instant sous contrôle.

Évaluation du risque : Le stade floraison est un stade critique, particulièrement sensible pour les maladies cryptogamiques. Malgré un risque modélisé faible, restez vigilant.



Techniques alternatives : L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle [en cliquant ICI](#).



OÏDIUM (*Erysiphe necator*)

• Éléments de biologie

Suivre ce lien : [ephytia.inra-biologie-epidemiologie de l'oïdium](https://ephytia.inra-biologie-epidemiologie-de-l'oïdium)

Même pour les cépages peu sensible la période de sensibilité démarre au stade boutons floraux séparés.

Ce champignon ne nécessite pas d'eau liquide pour germer et se développer, il peut même être lessivé par des pluies abondantes. Cependant les humidités relatives élevées lui sont favorables ; son développement requiert une hygrométrie élevée et une faible luminosité. C'est pourquoi, il affectionne les vignes vigoureuses dans lesquelles la lumière pénètre moins bien.



Oïdium sur feuilles
Crédit photo : Euphytia-INRAE

• Situation au vignoble

Légère progression des symptômes d'oïdium sur témoin non traité à fort historique à Valady.

Évaluation du risque : Nous sommes actuellement dans la période critique vis-à-vis de cette maladie ; le stade phénologique actuel est très sensible à l'oïdium. De plus les conditions sont très favorables à ce champignon. Les matinées fraîches, un ciel couvert limitant la luminosité, une hygrométrie importante provenant des sols humides, sont autant de facteurs favorables pour une contamination. Dans cette éventualité, les symptômes seraient visibles fin juin/début juillet. Portez une attention particulière sur les **cépages sensibles** et dans les zones à **historique oïdium**.

Techniques alternatives : L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace.
Consultez la liste des produits de bio-contrôle [en cliquant ICI](#).

VERS DE LA GRAPPE (*LOBESIA BOTRANA*)

- **Éléments de biologie**

Suivre ce lien : [Vers de la grappe – Ephytia \(Biologie, Epidémiologie\)](#)

- **Modélisation (EVA)**

Selon le modèle, nous serions au stade L3/L4 majoritaire.

- **Situation au vignoble**

Observation des premiers glomérules sur le secteur de Marcillac.

Évaluation du risque : Dès l'apparition des glomérules, il est important de définir un niveau de pression de la deuxième génération, afin d'anticiper la pression de cette dernière.

Seuil indicatif de risque : 10 glomérules pour 100 grappes.



Figure 1 : Vers de la grappe - Crédit photo : Val de Gascogne

CICADELLE DE LA FLAVESCENCE DORÉE

(*Scaphoidus Titanus*)

- **Protocole de surveillance**

Un dispositif de suivi des éclosions des oeufs est mis en place à l'IFV. Ce dispositif permet à la

DRAAF de définir les dates réglementaires d'intervention (1 mois après les premières éclosions). Ces résultats sont aussi validés par un suivi des larves sur le terrain. Une fois les dates définies, elles vous seront communiquées par les services de la DRAAF via le BSV.



Larve (L3) de *Scaphoideus titanus* -Crédit
photo www1.pms-lj.si - Database of
Invertebrate Pictures

• Element de biologie

Le T1 est généralement fixé 1 mois après les 1ères éclosions. Ce laps de temps permet aux larves d'éclore en plus grand nombre mais il correspond aussi au temps d'incubation du phytoplasme avant que la cicadelle ne devienne infectieuse.

Pour plus d'informations, suivre ce lien : [Cicadelle de la flavescence dorée – Ephytia](#)

• Situation dans les parcelles

Eclosion de larve en cage d'émergence dans le Tarn depuis le 5 mai. Sur le terrain les premières larves ont été observées le 7 mai. Observation des premières larves sur le secteur de Marcillac le 16 mai. Cette semaine de nouvelles larves L1/L2 observées.

Évaluation du risque : Les dates d'intervention ont été fixées par la DRAAF :

T1	du 14 juin au 23 juin	A venir
T2	en conventionnel : 15 jours après le T1 soit du 29 juin au 8 juillet en AB : 10 jours après le T1 soit du 24 juin au 2 juillet	Prochainement
L'arrêté préfectoral est publié sur le site de la DRAAF, retrouvez-le en cliquant ICI		

OBSERVATIONS



Salsifi



Larve de coccinelle
avec une nymphe



Chrysalide du
papillon Gazé

Photos : Gil BENAC-Cave du Vallon

Annexe – Notes nationales Biodiversité – BSV (cliquer sur les images)



Prochain BSV, le 17 juin 2025

REPRODUCTION DU BULLETIN AUTORISÉE SEULEMENT DANS SON INTÉGRALITÉ (REPRODUCTION PARTIELLE INTERDITE)

Ce bulletin de santé du végétal a été préparé par l'animateur filière viticulture du Syndicat de défense du Chasselas de Moissac et élaboré sur la base des observations réalisées par la Chambre d'Agriculture de l'Aveyron, le Syndicat AOC Marcillac, la cave des vignerons du Vallon et les agriculteurs observateurs.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La CRA d'Occitanie dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base des observations qu'ils auront réalisées et en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.