



A retenir

MILDIU		Restez vigilants vis-à-vis des stades floraison/nouaison.
BLACK-ROT		Pas d'évolution constatée. Restez vigilants, le stade de sensibilité est maximal.
OIDIUM		De rares symptômes sur feuilles ont été observés.
FLAVESCENCE DOREE		Traitements obligatoires : T1 du 14 juin au 23 juin

Annexes : [Liste des mesures alternatives et prophylactiques en viticulture](#)
[La note technique commune vigne 2025](#)

METEO

• Météo de ces derniers jours

Cette semaine a été marquée par les hautes températures. Les orages localisés se sont installés à partir de vendredi, entraînant des précipitations faibles et une chute des températures.

Précipitations de ces derniers jours (Source Météo France)

Station	lundi 9 juin 2025	mardi 10 juin 2025	mercredi 11 juin 2025	jeudi 12 juin 2025	vendredi 13 juin 2025	samedi 14 juin 2025	dimanche 15 juin 2025	Cumul hebdomadaire	Cumul depuis maturité moyenne de la masse des œufs en Midi Pyrénées (26/04/25)
Balsac (radar)	0	0	0	0	0,2	1,2	1,5	2,9	93
Compeyre (radar)	0	0	0	0	0	0,5	1,6	2,1	124,4
Marcillac (radar)	0	0	0	0	1,1	0,5	1,3	2,9	93,7

Directeur de publication :

Denis CARRETIER
Président de la Chambre
Régionale d'Agriculture
d'Occitanie
BP 22107
31321 CASTANET
TOLOSAN Cx
Tel 05.61.75.26.00

Dépôt légal : à parution

Comité de validation :
Chambre d'agriculture de
l'Aveyron, Chambre
régionale d'agriculture
d'Occitanie, DRAAF
Occitanie, Unicor cave de
Valady

ÉCOPHYTO
RÉDUIRE ET AMÉLIORER
L'UTILISATION DES PHYTOS

Action pilotée par le Ministère
chargé de l'agriculture et le
ministère chargé de l'écologie,
avec l'appui financier de
l'Agence Française pour la
Biodiversité, par les crédits
issus de la redevance pour
pollutions diffuses attribués au
financement du plan Ecophyto.

• Prévisions du 17 juin au 23 juin (Source Météo France)

Date	mar 17/06	mer 18/06	jeu 19/06	ven 20/06	sam 21/06	dim 22/06	lun 23/06
Température (°C)	13-32	14-33	16-36	18-37	19-38	19-40	21-41
Pluie (mm)	0-0	0-0	0-0	0-0	0-1	0-1	0-2
							

Nous devrions avoir une semaine sous le soleil, avec des températures hautes. Une petite dégradation pourrait arriver en toute fin de semaine.

STADES PHENOLOGIQUES

				
Stades BBCH	57	62	65/67	71
Descriptif des stades	Boutons floraux séparés	20 % des fleurs sont ouvertes	De mi floraison à fin floraison	Nouaison
Marcillac Précoces				
Marcillac Tardives				
Entraygues				
Millau				

Code couleur		Stade majoritaire
		Stade minoritaire

OÏDIUM (*Erysiphe necator*)

• Éléments de biologie

Suivre ce lien : ephytia.inrae.fr/biologie-epidemiologie-de-loïdium

Même pour les cépages peu sensible la période de sensibilité démarre au stade boutons floraux séparés.

Ce champignon ne nécessite pas d'eau liquide pour germer et se développer, il peut même être lessivé par des pluies abondantes. Cependant les humidités relatives élevées lui sont favorables ; son développement requiert une hygrométrie élevée et une faible luminosité. C'est pourquoi, il affectionne les vignes vigoureuses dans lesquelles la lumière pénètre moins bien.



Oïdium sur feuilles
Crédit photo : Euphytia-INRAE

• Situation au vignoble

Légère progression des symptômes d'oïdium sur témoin non traité à fort historique à Valady. Premiers rares symptômes sur feuille à Bruéjols.

Évaluation du risque : Le risque est très élevé ! Le stade phénologique actuel est très sensible à l'oïdium et les conditions lui sont très favorables. Les matinées fraîches, un ciel couvert limitant la luminosité, une hygrométrie importante provenant des sols humides, sont autant de facteurs favorables pour une contamination. Portez une **attention particulière** sur les **cépages sensibles** et dans les **zones à historique oïdium**.



Techniques alternatives : L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle [en cliquant ICI](#).

BLACK ROT (*GUIGNARDIA BIDWELLII*)

• Éléments de biologie

ephytia.inrae.fr/biologie-epidemiologie-du-black-rot

• Situation au vignoble

La situation est stable ; il n'y a pas d'évolution.

Évaluation du risque : Cette semaine, en l'absence de pluies, le risque est faible. Soyez attentifs aux périodes d'humectations prolongées.



Symptôme de Black Rot sur feuille

Photo Syndicat du Chasselas

MILDIOU

(PLASMOPARA VITICOLA)

- **Éléments de biologie**

Pour plus d'informations, suivre ce lien : [Mildiou – Ephytia \(Biologie, Epidémiologie\)](#)

- **Modélisation (Potentiel système)**

Situation au 15 juin :

Le risque continue à baisser sur tous les secteurs. Les conditions climatiques sont selon le modèle défavorables au développement du mildiou. Aucune contamination épidémique ni extériorisation de symptômes modélisées la semaine passée selon potentiel système.

Simulation au 22 juin :

Le risque poursuit sa baisse, il sera faible à très faible à J+7. Le cumul nécessaire pour entraîner des contaminations épidémiques est très important (60mm). Aucune extériorisation n'est attendue cette semaine selon le modèle.


- **Situation au vignoble**

Quelques nouvelles taches observées sur le témoin non traité du secteur de Valady. Les symptômes restent rares. La situation est pour l'instant sous contrôle.

Évaluation du risque : Le stade floraison/nouaison est un stade critique, particulièrement sensible pour les maladies. Malgré un risque modélisé faible, restez vigilant et attentifs aux prévisions météo.



Techniques alternatives : L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace.
Consultez la liste des produits de bio-contrôle [en cliquant ICI](#).



VERS DE LA GRAPPE (LOBESIA BOTRANA)

- **Éléments de biologie**

Suivre ce lien : [Vers de la grappe – Ephytia \(Biologie, Epidémiologie\)](#)

- **Modélisation (EVA)**

Selon le modèle, nous serions au stade L4/L5 majoritaire.

- **Situation au vignoble**

Observation de quelques glomérules, mais le seuil d'intervention n'est pas atteint.

Évaluation du risque : Dès l'apparition des glomérules, il est important de définir un niveau de pression de la deuxième génération, afin d'anticiper la pression de cette dernière.

Seuil indicatif de risque : 10 glomérules pour 100 grappes.



Figure 1 : Vers de la grappe - Crédit photo : Val de Gascogne

CICADELLE DE LA FLAVESCECE DOREE

(*Scaphoidus Titanus*)

- **Protocole de surveillance**

Un dispositif de suivi des éclosions des oeufs est mis en place à l'IFV. Ce dispositif permet à la

DRAAF de définir les dates réglementaires d'intervention (1 mois après les premières éclosions). Ces résultats sont aussi validés par un suivi des larves sur le terrain. Une fois les dates définies, elles vous seront communiquées par les services de la DRAAF via le BSV.



Larve (L3) de *Scaphoideus titanus* -Crédit photo www1.pms-lj.si - Database of Invertebrate Pictures

- **Element de biologie**

Le T1 est généralement fixé 1 mois après les 1ères éclosions. Ce laps de temps permet aux larves d'éclore en plus grand nombre mais il correspond aussi au temps d'incubation du phytoplasme avant que la cicadelle ne devienne infectieuse.

Pour plus d'informations, suivre ce lien : [Cicadelle de la flavescence dorée – Ephytia](#)

- **Situation dans les parcelles**

Eclosion de larve en cage d'émergence dans le Tarn depuis le 5 mai. Sur le terrain les premières larves ont été observées le 7 mai. Observation des premières larves sur le secteur de Marcillac le 16 mai.


Évaluation du risque : Les dates d'intervention ont été fixées par la DRAAF :

T1 Pour les communes de Compregnac, Malleville, Marcillac et Montjaux	Du 14 juin au 23 juin	En cours
T2 Pour les communes de Compregnac, Malleville, Marcillac et Montjaux	En conventionnel : 15 jours après le T1 soit du 29 juin au 8 juillet En AB : 10 jours après le T1 soit du 24 juin au 2 juillet	Prochainement
T3 Pour les communes de Compregnac, Malleville, Marcillac et Montjaux	Le T3 n'est obligatoire que sur les parcelles de vigne-mère. Dans les autres cas, il est optionnel, selon l'analyse du risque. Il est conseillé dans les cas suivants : - présence de foyers dans l'environnement des parcelles - présence de friches de vigne dans l'environnement des parcelles - présence de pieds FD dans la parcelle	A définir. En AB, le T3 est à faire à T2+10 jours.
Pour connaître la liste des communes concernées, consultez l'arrêté préfectoral publié sur le site de la DRAAF : retrouvez-le en cliquant ICI		

RETROUVEZ LE COMMUNIQUE DE LA DRAAF RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES DE LUTTE CONTRE L'INSECTE VECTEUR DE LA FLAVESCENCE DOREE DE LA VIGNE : [ICI](#)

OBSERVATIONS





Photos : Gil BENAC-Cave du Vallon

Annexe – Notes nationales Biodiversité – BSV (cliquer sur les images)





Produits de Biocontrôle



Résistances aux pesticides

Prochain BSV, le 24 juin 2025

REPRODUCTION DU BULLETIN AUTORISÉE SEULEMENT DANS SON INTÉGRALITÉ (REPRODUCTION PARTIELLE INTERDITE)

Ce bulletin de santé du végétal a été préparé par l'animateur filière viticulture du Syndicat de défense du Chasselas de Moissac et élaboré sur la base des observations réalisées par la Chambre d'Agriculture de l'Aveyron, le Syndicat AOC Marcillac, la cave des vignerons du Vallon et les agriculteurs observateurs.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La CRA d'Occitanie dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base des observations qu'ils auront réalisées et en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.