



A retenir

OIDIUM		Peu d'évolution. Cependant les conditions sont encore favorables.
MILDIU		Peu d'évolution. Restez attentifs aux prévisions météo, notamment en présence de symptômes sur feuilles.
BLACK-ROT		Peu d'évolution. Restez attentifs aux prévisions météo, jusqu'à fermeture de la grappe.
VERS DE LA GRAPPE		Début de vol.

FLAVESCENCE DOREE

Traitements obligatoires : T2 Terminé
En AB : T3 10 jours après le T2

Annexes : [Liste des mesures alternatives et prophylactiques en viticulture](#)
[La note technique commune vigne 2025](#)

METEO

• Météo de ces derniers jours

Les températures sont redescendues à partir du mercredi 2 juillet. Le ciel est resté partiellement couvert, avec quelques précipitations, notamment dimanche.

Précipitations de ces derniers jours (Source Météo France)

Station	lundi 30 juin 2025	mardi 1 juillet 2025	mercredi 2 juillet 2025	jeudi 3 juillet 2025	vendredi 4 juillet 2025	samedi 5 juillet 2025	dimanche 6 juillet 2025	Cumul hebdomadaire	Cumul depuis maturité moyenne de la masse des œufs en Midi Pyrénées (26/04/25)
Balsac (radar)	0	0	0	0	0	0	7,2	7,2	100,3
Compeyre (radar)	0,2	1	1,6	0	0	0	1,1	3,9	127,6
Marcillac (radar)	0	0	0	0	0	0	8,9	8,9	104,2



Directeur de publication :

Denis CARRETIER
Président de la Chambre
Régionale d'Agriculture
d'Occitanie
BP 22107
31321 CASTANET
TOLOSAN Cx
Tel 05.61.75.26.00

Dépôt légal : à parution

Comité de validation :
Chambre d'agriculture de
l'Aveyron, Chambre
régionale d'agriculture
d'Occitanie, DRAAF
Occitanie, Univor cave de
Valady

• **Prévisions du 8 au 14 juillet (Source Météo France)**

Date	mar 08/07	mer 09/07	jeu 10/07	ven 11/07	sam 12/07	dim 13/07	lun 14/07
Température (°C)	12-25	10-30	15-34	16-35	18-37	18-36	16-38
Pluie (mm)	0-1	0-0	0-0	0-0	0-7	0-10	0-3
							

Après un début de semaine relativement frais, nous devrions avoir des températures estivales. Des précipitations orageuses pourraient survenir en fin de semaine.

STADES PHENOLOGIQUES

			
Stades BBCH	75	76	77
Descriptif des stades	Stade petit pois	Pré-fermeture de la grappe	Fermeture de la grappe
Marcillac Précoces			
Marcillac Tardives			
Millau			
Estaing			

Code couleur		Stade majoritaire
		Stade minoritaire

OÏDIUM *(Erysiphe necator)*

• Éléments de biologie


Suivre ce lien : ephytia.inrae.fr/biologie-epidemiologie-de-loïdium

Même pour les cépages peu sensible la période de sensibilité démarre au stade boutons floraux séparés.

Ce champignon ne nécessite pas d'eau liquide pour germer et se développer, il peut même être lessivé par des pluies abondantes. Cependant les humidités relatives élevées lui sont favorables ; son développement requiert une hygrométrie élevée et une faible luminosité. C'est pourquoi, il affectionne les vignes vigoureuses dans lesquelles la lumière pénètre moins bien.

• Situation au vignoble

Sur le témoin non traité de Valady et Bruéjoul, nous avons noté une progression sur feuilles et grappes. Hors TNT sur Marcillac et Millau, quelques nouveaux symptômes sur baies et sur feuilles.



Crédit photo : Gil BENAC – Cave du Vallon

Évaluation du risque : Le risque reste élevé tant que le stade fermeture de la grappe totale n'est pas atteint. Portez une **attention particulière** sur les **cépages sensibles**, les vignes poussantes et dans les **zones à historique oïdium**.



Techniques alternatives : L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle [en cliquant ICI](#).

MILDIOU *(PLASMOPARA VITICOLA)*

• Éléments de biologie

Pour plus d'informations, suivre ce lien : [Mildiou – Ephytia \(Biologie, Epidémiologie\)](#)

• Modélisation (Potentiel système)

Situation au 6 juillet :

Le risque continue à baisser sur tous les secteurs, il reste très faible comme la semaine passée. Aucune contamination épidémique ni extériorisation de symptômes modélisés cette semaine.

Simulation au 13 juillet :

Le risque modélisé reste très faible à J+7. Suite aux pluies de ce lundi 7 juillet, le cumul nécessaire pour entraîner des contaminations épidémiques est important (25 à 40mm). Aucune extériorisation n'est attendue cette semaine selon le modèle.


• Situation au vignoble


Pas d'évolution sur les TNT. Par ailleurs, pas d'évolution non plus, si ce n'est sur le secteur de Nauviale, où quelques nouvelles taches sont visibles. Elles sont probablement issues de repiquages à l'occasion de la pluie (8mm) du 25 juin.

Évaluation du risque : Le risque est modéré à faible à ce jour. Restez vigilant en cas de symptômes sur feuilles et en présence de rosée. Soyez attentifs aux prévisions météo.



Techniques alternatives : L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle [en cliquant ICI](#).





Mildiou sur grappe (rot brun) et sur feuille. Crédit Photo : Syndicat du Chasselas de Moissac

Photo Syndicat du Chasselas

BLACK ROT *(GUIGNARDIA BIDWELLII)*

- **Éléments de biologie**

[ephytia.inra - Biologie-epidemiologie du Black Rot](http://ephytia.inra.fr/Biologie-epidemiologie-du-Black-Rot)

- **Situation au vignoble**

Aucune évolution.

Évaluation du risque : Soyez attentifs aux orages annoncés. Le stade de sensibilité perdue jusqu'à la fermeture de la grappe.

VERS DE LA GRAPPE (*LOBESIA BOTRANA*)

- **Éléments de biologie**

Suivre ce lien : [Vers de la grappe – Ephytia \(Biologie, Epidémiologie\)](#)

- **Modélisation**

Selon le modèle le vol est en cours.

- **Situation au vignoble**

Pas de captures.



Évaluation du risque : C'est la quantité de glomérules qui permet de définir un niveau de pression de la deuxième génération, afin d'anticiper la pression de cette dernière.

Seuil indicatif de risque : 10 glomérules pour 100 grappes.

CICADELLE DE LA FLAVESCENCE DORÉE

(*Scaphoidus Titanus*)

- **Protocole de surveillance**

Un dispositif de suivi des éclosions des oeufs est mis en place à l'IFV. Ce dispositif permet à la

DRAAF de définir les dates réglementaires d'intervention (1 mois après les premières éclosions). Ces résultats sont aussi validés par un suivi des larves sur le terrain. Une fois les dates définies, elles vous seront communiquées par les services de la DRAAF via le BSV.



Larve (L3) de *Scaphoideus titanus* -Crédit photo www1.pms-lj.si - Database of Invertebrate Pictures

• Element de biologie

Le T1 est généralement fixé 1 mois après les 1ères éclosions. Ce laps de temps permet aux larves d'éclore en plus grand nombre mais il correspond aussi au temps d'incubation du phytoplasme avant que la cicadelle ne devienne infectieuse.

Pour plus d'informations, suivre ce lien : [Cicadelle de la flavescence dorée – Ephytia](#)



• Situation dans les parcelles

Eclosion de larve en cage d'émergence dans le Tarn depuis le 5 mai. Sur le terrain les premières larves ont été observées le 7 mai. Observation des premières larves sur le secteur de Marcillac le 16 mai.

Évaluation du risque : Les dates d'intervention ont été fixées par la DRAAF :

T1 Pour les communes de Comprenac, Maleville, Marcillac et Montjaux	Du 14 juin au 23 juin	Terminé
T2 Pour les communes de Comprenac, Maleville, Marcillac et Montjaux	En conventionnel : 15 jours après le T1 soit du 29 juin au 8 juillet En AB : 10 jours après le T1 soit du 24 juin au 2 juillet	Terminé
T3 Pour les communes de Comprenac, Maleville, Marcillac et Montjaux	Le T3 n'est obligatoire que sur les parcelles de vigne-mère. Dans les autres cas, il est optionnel, selon l'analyse du risque. Il est conseillé dans les cas suivants : - présence de foyers dans l'environnement des parcelles - présence de friches de vigne dans l'environnement des parcelles - présence de pieds FD dans la parcelle	A définir. En AB, le T3 est à faire à T2+10 jours.
Pour connaître la liste des communes concernées, consultez l'arrêté préfectoral publié sur le site de la DRAAF : retrouvez-le en cliquant ICI		

RETROUVEZ LE COMMUNIQUE DE LA DRAAF RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES DE LUTTE CONTRE L'INSECTE VECTEUR DE LA FLAVESCENCE DOREE DE LA VIGNE : [ICI](#)



Photos : Gil BENAC – Cave du Vallon

Annexe – Notes nationales Biodiversité – BSV (cliquer sur les images)



Produits de Biocontrôle



Résistances aux pesticides

Prochain BSV, le 16 juillet 2025

REPRODUCTION DU BULLETIN AUTORISÉE SEULEMENT DANS SON INTÉGRALITÉ (REPRODUCTION PARTIELLE INTERDITE)

Ce bulletin de santé du végétal a été préparé par l'animateur filière viticulture du Syndicat de défense du Chasselas de Moissac et élaboré sur la base des observations réalisées par la Chambre d'Agriculture de l'Aveyron, le Syndicat AOC Marcillac, la cave des vigneron du Vallon et les agriculteurs observateurs.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La CRA d'Occitanie dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base des observations qu'ils auront réalisées et en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.