



A retenir

OIDIUM		Peu d'évolution. Surveillez les parcelles à historique.
MILDIU		Peu d'évolution. Restez attentifs aux prévisions météo, notamment en présence de symptômes sur feuilles.
BLACK-ROT		Peu d'évolution. Le risque est en forte diminution. Restez attentifs aux prévisions météo.
VERS DE LA GRAPPE		Selon le modèle : Stade L1 Surveillez l'apparition des perforations.

FLAVESCENCE DOREE

En attente de la date pour le T3

Annexes : [Liste des mesures alternatives et prophylactiques en viticulture](#)
[La note technique commune vigne 2025](#)

METEO

• Météo de ces derniers jours

Après les orages du 6 et 7 juillet, le temps est resté sec. Les températures ont été conformes aux normales saisonnières.

• Prévisions du 16 au 22 juillet (Source Météo France)

Date	Mer 16/07	jeu 17/07	ven 18/07	sam 19/07	dim 20/07	lun 21/07
Température (°C)	13-31	13-34	14-34	18-26	15-31	16-26
						

Les températures devraient se maintenir, tandis que la pluie devrait faire son retour à partir de vendredi, et pour toute la fin de semaine.

Directeur de publication :

Denis CARRETIER
Président de la Chambre
Régionale d'Agriculture
d'Occitanie
BP 22107
31321 CASTANET
TOLOSAN Cx
Tel 05.61.75.26.00

Dépôt légal : à parution

Comité de validation :
Chambre d'agriculture de
l'Aveyron, Chambre
régionale d'agriculture
d'Occitanie, DRAAF
Occitanie, Unico cave de
Valady

STADES PHENOLOGIQUES

		
Stades BBCH	77	81
Descriptif des stades	Fermeture de la grappe	Tout début véraison
Marcillac Précoces		
Marcillac Tardives		
Millau		
Entraygues		

Code couleur		Stade majoritaire
		Stade minoritaire

OÏDIUM *(Erysiphe necator)*

• Éléments de biologie

Suivre ce lien : [ephytia.inra.fr-Biologie-epidemiologie de l'oïdium](https://ephytia.inra.fr/Biologie-epidemiologie-de-l'oïdium)

Même pour les cépages peu sensible la période de sensibilité démarre au stade boutons floraux séparés.

Ce champignon ne nécessite pas d'eau liquide pour germer et se développer, il peut même être lessivé par des pluies abondantes. Cependant les humidités relatives élevées lui sont favorables ; son développement requiert une hygrométrie élevée et une faible luminosité. C'est pourquoi, il affectionne les vignes vigoureuses dans lesquelles la lumière pénètre moins bien.

• Situation au vignoble


Pas d'évolution.

Évaluation du risque : Lorsque le stade fermeture de la grappe est totalement atteint :

- Sur parcelle saine, la protection peut être stoppée.
- Sur parcelle présentant des symptômes, ou bien sensibles, il faut rester vigilant jusqu'à la véraison afin de limiter la propagation du champignon.

Portez une attention particulière sur les cépages sensibles et dans les zones à historique oïdium.

Techniques alternatives : L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle [en cliquant ICI](#).



Crédit photo : Gil BENAC – Cave du Vallon

B

MILDIU *(PLASMOPARA VITICOLA)*

• Éléments de biologie

Pour plus d'informations, suivre ce lien : [Mildiou – Ephytia \(Biologie, Epidémiologie\)](#)

• Modélisation (Potentiel système)

Pas de modélisation disponible cette semaine.



• Situation au vignoble


Quelques nouveaux symptômes liés à des repiquages sur Entraygues. Par ailleurs, pas d'évolution.

Évaluation du risque : Le risque est modéré à faible à ce jour selon les secteurs (Cf. carte ci-dessous). Restez vigilant en cas de symptômes sur feuilles et en présence de rosée. Soyez attentifs aux prévisions météo.

Techniques alternatives : L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle [en cliquant ICI](#).

B





Mildiou sur grappe (rot brun) et sur feuille. Crédit Photo : Syndicat du Chasselas de Moissac

BLACK ROT (GUIGNARDIA BIDWELLII)

- **Éléments de biologie**

[ephytia.inra - Biologie-epidemiologie du Black Rot](http://ephytia.inra-biologie-epidemiologie-du-black-rot.fr)

- **Situation au vignoble**

Aucune évolution.

Évaluation du risque : Le stade de sensibilité est en forte diminution. Soyez attentifs aux orages annoncés.



Symptôme de Black Rot grappe

Photo Syndicat du Chasselas

VERS DE LA GRAPPE (*LOBESIA BOTRANA*)

- **Éléments de biologie**

Suivre ce lien : [Vers de la grappe – Ephytia \(Biologie, Epidémiologie\)](#)

- **Modélisation**

Selon le modèle le stade majoritaire est L1.

- **Situation au vignoble**

Une seule capture sur Marcillac.

Évaluation du risque : Soyez attentif aux perforations, afin d'estimer la pression de la G2.



Seuil indicatif de risque : 10 perforations pour 100 grappes en fin de G2.

5 perforations pour 100 grappes en fin de G2 pour les parcelles confusées.



Perforations de baies - Crédit photo : Syndicat du Chasselas de Moissac

CICADELLE DE LA FLAVESCENCE DORÉE

(*Scaphoidus Titanus*)

- **Protocole de surveillance**

Un dispositif de suivi des éclosions des oeufs est mis en place à l'IFV. Ce dispositif permet à la

DRAAF de définir les dates règlementaires d'intervention (1 mois après les premières éclosions). Ces résultats sont aussi validés par un suivi des larves sur le terrain. Une fois les dates définies, elles vous seront communiquées par les services de la DRAAF via le BSV.



Larve (L3) de *Scaphoideus titanus* -Crédit photo www1.pms-lj.si - Database of Invertebrate Pictures

• Element de biologie

Le T1 est généralement fixé 1 mois après les 1ères éclosions. Ce laps de temps permet aux larves d'éclore en plus grand nombre mais il correspond aussi au temps d'incubation du phytoplasme avant que la cicadelle ne devienne infectieuse.

Pour plus d'informations, suivre ce lien : [Cicadelle de la flavescence dorée – Ephytia](#)

• Situation dans les parcelles

Restez à l'apparition des symptômes.

Évaluation du risque : Les dates d'intervention ont

été fixées par la DRAAF :

T1 Pour les communes de Compagnac, Maleville, Marcillac et Montjaux	Du 14 juin au 23 juin	Terminé
T2 Pour les communes de Compagnac, Maleville, Marcillac et Montjaux	En conventionnel : 15 jours après le T1 soit du 29 juin au 8 juillet En AB : 10 jours après le T1 soit du 24 juin au 2 juillet	Terminé
T3 Pour les communes de Compagnac, Maleville, Marcillac et Montjaux	Le T3 n'est obligatoire que sur les parcelles de vigne-mère. Dans les autres cas, il est optionnel, selon l'analyse du risque. Il est conseillé dans les cas suivants : - présence de foyers dans l'environnement des parcelles - présence de friches de vigne dans l'environnement des parcelles - présence de pieds FD dans la parcelle	A définir. En AB, le T3 est à faire à T2+10 jours.
Pour connaître la liste des communes concernées, consultez l'arrêté préfectoral publié sur le site de la DRAAF : retrouvez-le en cliquant ICI		

RETROUVEZ LE COMMUNIQUE DE LA DRAAF RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES DE LUTTE CONTRE L'INSECTE VECTEUR DE LA FLAVESCEENCE DOREE DE LA VIGNE : [ICI](#)

Annexe – Notes nationales Biodiversité – BSV (cliquer sur les images)



Produits de Biocontrôle



Résistances aux pesticides

Prochain BSV, le 22 juillet 2025

REPRODUCTION DU BULLETIN AUTORISÉE SEULEMENT DANS SON INTÉGRALITÉ (REPRODUCTION PARTIELLE INTERDITE)

Ce bulletin de santé du végétal a été préparé par l'animateur filière viticulture du Syndicat de défense du Chasselas de Moissac et élaboré sur la base des observations réalisées par la Chambre d'Agriculture de l'Aveyron, le Syndicat AOC Marcillac, la cave des vigneron du Vallon et les agriculteurs observateurs.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La CRA d'Occitanie dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base des observations qu'ils auront réalisées et en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.