



A retenir

OIDIUM		Peu d'évolution. Surveillez les parcelles à historique.
MILDIU		Peu d'évolution. Restez attentifs aux prévisions météo, notamment en présence de symptômes sur feuilles.
BLACK-ROT		Peu d'évolution. Le risque est en forte diminution. Restez attentifs aux prévisions météo.
VERS DE LA GRAPPE		Selon le modèle : Stade L2 Surveillez l'apparition des perforations.

FLAVESCENCE DOREE

En attente de la date pour le T3

Annexes : [Liste des mesures alternatives et prophylactiques en viticulture](#)
[La note technique commune vigne 2025](#)

METEO

• Météo de ces derniers jours

Les précipitations ont été variables selon les secteurs (de quelques mm sur Marcillac, Estaing et Entraygues à 28 mm à Rivière sur Tarn). Les températures sont de saison avec des nuits et des matinées relativement fraîches.

• Prévisions du 22 juillet au 27 juillet (Source Météo France)

Date	Mar 22/07	Mer 23/07	Jeu 24/07	Vend 25/07	Sam 26/07	Dim 27/07
Température (°C)	13-26	11-23	13-22	13-25	14-28	14-29
						

Les températures devraient se maintenir, tandis que la pluie devrait faire son retour à partir de mercredi, et sur la fin de semaine.

Directeur de publication :

Denis CARRETIER
Président de la Chambre
Régionale d'Agriculture
d'Occitanie
BP 22107
31321 CASTANET
TOLOSAN Cx
Tel 05.61.75.26.00

Dépôt légal : à parution
Comité de validation :
Chambre d'agriculture de
l'Aveyron, Chambre
régionale d'agriculture
d'Occitanie, DRAAF
Occitanie, Unico cave de
Valady

ÉCOPHYTO
RÉDUIRE ET AMÉLIORER
L'UTILISATION DES PHYTOS

Action pilotée par le Ministère
chargé de l'agriculture et le
ministère chargé de l'écologie,
avec l'appui financier de
l'Agence Française pour la
Biodiversité, par les crédits
issus de la redevance pour
pollutions diffuses attribués au
financement du plan Ecophyto.

STADES PHENOLOGIQUES

		
Stades BBCH	77	81
Descriptif des stades	Fermeture de la grappe	Tout début véraison
Marcillac Précoces		
Marcillac Tardives		
Millau		
Entraygues		
Estaing		

Code couleur		Stade majoritaire
		Stade minoritaire

OÏDIUM *(Erysiphe necator)*

• Éléments de biologie


Suivre ce lien : [ephytia.inra.-Biologie-epidemiologie de l'oïdium](https://ephytia.inra-biologie-epidemiologie-de-l'oïdium)

Même pour les cépages peu sensible la période de sensibilité démarre au stade boutons floraux séparés.

Ce champignon ne nécessite pas d'eau liquide pour germer et se développer, il peut même être lessivé par des pluies abondantes. Cependant les humidités relatives élevées lui sont favorables ; son développement requiert une hygrométrie élevée et une faible luminosité. C'est pourquoi, il affectionne les vignes vigoureuses dans lesquelles la lumière pénètre moins bien.

• Situation au vignoble

Sur l'ensemble des témoins, progression plus ou moins significative sur feuilles et grappes (plus sur TNT Valady). Hors témoin, sur une parcelle à historique (vignoble Marcillac), nette progression de l'oïdium sur feuilles et grappes (une à deux baies atteintes sur environ 20% des grappes), ailleurs RAS.



Crédit photo : Gil BENAC – Cave du Vallon

Évaluation du risque : Lorsque le stade fermeture de la grappe est totalement atteint :

-Sur parcelle saine, la protection peut être stoppée.

-Sur parcelle présentant des symptômes, ou bien sensibles, il faut rester vigilant jusqu'à la véraison afin de limiter la propagation du champignon.

Portez une attention particulière sur les cépages sensibles et dans les zones à historique oïdium.



Techniques alternatives : L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle [en cliquant ICI](#).

MILDIOU *(PLASMOPARA VITICOLA)*

• Éléments de biologie

Pour plus d'informations, suivre ce lien : [Mildiou – Ephytia \(Biologie, Epidémiologie\)](#)

• Situation au vignoble

A Marcillac, sur témoin, quelques rares baies de rot brun. Par ailleurs sur le vignoble aveyronnais, pas d'évolution.

Évaluation du risque : Le risque est modéré à faible à ce jour selon les secteurs. Restez vigilant en cas de symptômes sur feuilles et en présence de rosée. Soyez attentifs aux prévisions météo.

*Techniques alternatives : L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace.
Consultez la liste des produits de bio-contrôle [en cliquant ICI](#).*

Chronologie des contamination épidémiques mildiou et de l'extériorisation des symptômes



Mildiou sur grappe (rot brun) et sur feuille. Crédit Photo : Syndicat du Chasselas de Moissac

ces symptômes.

BLACK ROT (GUIGNARDIA BIDWELLII)

- **Éléments de biologie**

[ephytia.inra.fr - Biologie-epidemiologie du Black Rot](http://ephytia.inra.fr/Biologie-epidemiologie-du-Black-Rot)

- **Situation au vignoble**

Aucune évolution.

Évaluation du risque : Le stade de sensibilité est en forte diminution. Soyez attentifs aux orages annoncés.



Symptômes sur baies, à différents stades.

Crédit photo : Syndicat du Chasselas de MOISSAC

VERS DE LA GRAPPE

(*LOBESIA BOTRANA*)

- **Éléments de biologie**

Suivre ce lien : [Vers de la grappe – Ephytia \(Biologie, Epidémiologie\)](#)

- **Modélisation**

Selon le modèle le stade majoritaire est L2.

- **Situation au vignoble**

Aucune capture sur Marcillac. Quelques perforations sur les zones non confusées.

Évaluation du risque : Afin d'évaluer le niveau de pression et évaluer la stratégie en G3, prévoyez un dénombrement des perforations ; elles doivent être visibles à ce jour. En l'absence de perforations, le risque est totalement nul pour la G3. Dans le cas contraire, se référer au seuil indicatif de risque.



Perforations de baies avec la chenille d'eudémis - Crédit photo : Gil BENAC- Cave du Vallon



Seuil indicatif de risque : 10 perforations pour 100 grappes en fin de G2.

5 perforations pour 100 grappes en fin de G2 pour les parcelles confusées.

CICADELLE DE LA FLAVESCENCE DOREE

(*Scaphoidus Titanus*)



- **Element de biologie**

L'insecte vecteur se contamine en piquant pour se nourrir dans les vaisseaux du phloème d'une plante malade : c'est l'acquisition. Mais l'insecte n'est pas immédiatement infectieux, c'est la période de latence qui dure environ 30 jours. Après cette période d' « incubation », l'insecte infectieux le reste toute sa vie mais ne transmettra pas le phytoplasme à sa descendance. **Il pourra disséminer le phytoplasme de la Flavescence dorée au cours de ses vols et contaminer des plantes saines.** L'organisme, injecté dans le phloème de la plante, s'y multiplie et se pérennisera durant toute la vie du cep.

Pour plus d'informations, suivre ce lien : [Cicadelle de la flavescence dorée – Ephytia](#)

- **Situation dans les parcelles**

Mue de cicadelle FD observée sur le vignoble de Marcillac (cf. photo) donc présence d'adulte. Restez attentifs à l'apparition des symptômes.

Évaluation du risque : Les dates d'intervention vont être fixées par la DRAAF :

T1 Pour les communes de Compregnac, Maleville, Marcillac et Montjaux	Du 14 juin au 23 juin	Terminé
T2 Pour les communes de Compregnac, Maleville, Marcillac et Montjaux	En conventionnel : 15 jours après le T1 soit du 29 juin au 8 juillet En AB : 10 jours après le T1 soit du 24 juin au 2 juillet	Terminé
T3 Pour les communes de Compregnac, Maleville, Marcillac et Montjaux	Le T3 n'est obligatoire que sur les parcelles de vigne-mère. Dans les autres cas, il est optionnel, selon l'analyse du risque. Il est conseillé dans les cas suivants : - présence de foyers dans l'environnement des parcelles - présence de friches de vigne dans l'environnement des parcelles - présence de pieds FD dans la parcelle	A définir. En AB, le T3 est à faire à T2+10 jours.
Pour connaître la liste des communes concernées, consultez l'arrêté préfectoral publié sur le site de la DRAAF : retrouvez-le en cliquant ICI		

RETROUVEZ LE COMMUNIQUE DE LA DRAAF RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES DE LUTTE CONTRE L'INSECTE VECTEUR DE LA FLAVESCENCE DOREE DE LA VIGNE : [ICI](#)

CICADELLE VERTE (EMPOASCA VITIS)

• Element de biologie

Eléments de biologie : suivre ce lien : [Cicadelle verte – Ephytia \(Biologie\)](#)

• Situation au vignoble

De rares larves observées sur le vignoble de Marcillac et des adultes à Millau. Attention, là l'évolution de la population, restez attentifs.

Évaluation du risque : Le risque est toujours bien présent. Il faut surveiller l'apparition des premiers symptômes et ne pas tarder à agir en cas de symptômes sur feuilles et lorsque le seuil indicatif de risque est dépassé. Compte tenu de la virulence de ce ravageur l'année passée, il faut rester vigilant.

NB : Ce ne sont pas les adultes mais les larves qui sont à l'origine des dégâts de grillure.



Larve de cicadelle des grillures- Crédit photo EUPHYTIA

Seuil indicatif de risque : 50 larves de cicadelle pour 100 feuilles

Techniques alternatives : Des solutions de biocontrôle existent. Elles sont à appliquer sur des larves jeunes ou de manière « préventive ». Par exemple, l'application d'argile comme barrière physique.

B

Annexe – Notes nationales Biodiversité – BSV (cliquer sur les images)



B

Produits de Biocontrôle

R

Résistances aux pesticides

Prochain BSV, le 29 juillet 2025

REPRODUCTION DU BULLETIN AUTORISÉE SEULEMENT DANS SON INTÉGRALITÉ (REPRODUCTION PARTIELLE INTERDITE)

Ce bulletin de santé du végétal a été préparé par l'animateur filière viticulture du Syndicat de défense du Chasselas de Moissac et élaboré sur la base des observations réalisées par la Chambre d'Agriculture de l'Aveyron, le Syndicat AOC Marcillac, la cave des vigneron du Vallon et les agriculteurs observateurs.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La CRA d'Occitanie dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base des observations qu'ils auront réalisées et en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.