



A retenir

OIDIUM		Peu d'évolution. Surveillez les parcelles à historique.
MILDIU		Peu d'évolution. Restez attentifs aux prévisions météo, notamment en présence de symptômes sur feuilles.
BLACK-ROT		Peu d'évolution. Le risque est en très forte diminution.
VERS DE LA GRAPPE		Selon le modèle : Stade L3 Surveillez le nombre de perforations.

FLAVESCENCE DOREE

En attente de la date pour le T3

Annexes : [Liste des mesures alternatives et prophylactiques en viticulture](#)
[La note technique commune vigne 2025](#)

METEO

• Météo de ces derniers jours

Une météo perturbée cette semaine, avec des précipitations de faible intensité, mais bien présentes depuis mercredi. En conséquence, les températures furent basses pour la saison.

Vignoble	Station								Cumul hebdomadaire	Cumul depuis maturité moyenne de la masse des œufs en Midi Pyrénées (26/04/25)
		lundi 21 juillet 2025	mardi 22 juillet 2025	mercredi 23 juillet 2025	jeudi 24 juillet 2025	vendredi 25 juillet 2025	samedi 26 juillet 2025	dimanche 27 juillet 2025		
Aveyron	Balsac (radar)	1	0	8,4	2,2	5,8	0	1,4	18,8	140,9
Aveyron	Compeyre (radar)	0,4	0	7,5	0	0,2	0	0	8,1	165,6
Aveyron	Marcillac (radar)	1,5	0	11,5	0,4	8,5	0	1,3	23,2	152,6

• Prévisions du 29 juillet au 4 août (Source Météo France)

Date	mar 29/07	mer 30/07	jeu 31/07	ven 01/08	sam 02/08	dim 03/08	lun 04/08
Température (°C)	12-27	13-29	14-30	14-32	15-31	15-31	15-34
Pluie (mm)	0-0	0-0	0-1	0-1	0-7	0-3	0-3
							

Météo mitigée prévue cette semaine. Le ciel couvert devrait porter peu de pluies et nous devrions assister à une hausse des températures

STADES PHENOLOGIQUES

		
Stades BBCH	77	81
Descriptif des stades	Fermeture de la grappe	Tout début véraison
Marcillac Précoces		
Marcillac Tardives		
Millau		
Entraygues		

Code couleur		Stade majoritaire
		Stade minoritaire

OÏDIUM *(Erysiphe necator)*

• Éléments de biologie

Suivre ce lien : [ephytia.inra-biologie-epidemiologie de l'oïdium](https://ephytia.inra-biologie-epidemiologie-de-l'oïdium)

Même pour les cépages peu sensible la période de sensibilité démarre au stade boutons floraux séparés.

Ce champignon ne nécessite pas d'eau liquide pour germer et se développer, il peut même être lessivé par des pluies abondantes. Cependant les humidités relatives élevées lui sont favorables ; son développement requiert une hygrométrie élevée et une faible luminosité. C'est pourquoi, il affectionne les vignes vigoureuses dans lesquelles la lumière pénètre moins bien.

• Situation au vignoble

Pas d'évolution, la situation est stable.


Évaluation du risque : Lorsque le stade fermeture de la grappe est totalement atteint :

- Sur parcelle saine, la protection peut être stoppée.

- Sur parcelle présentant des symptômes, ou bien sensibles, il faut rester vigilant jusqu'à la véraison afin de limiter la propagation du champignon.

Portez une attention particulière sur les cépages sensibles et dans les zones à historique oïdium.

Techniques alternatives : L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle [en cliquant ICI](#).



Crédit photo : Gil BENAC – Cave du Vallon



MILDIU *(PLASMOPARA VITICOLA)*

• Éléments de biologie

Pour plus d'informations, suivre ce lien : [Mildiou – Ephytia \(Biologie, Epidémiologie\)](#)

• Modélisation

Situation au 27 juillet :

Les dernières précipitations ont fait augmenter la pression selon le modèle, le risque est fort sur Balsac mais encore très faible sur Marcillac et Compeyre à ce jour. Des contaminations épidémiques ont été modélisées sur le secteur de Balsac cette semaine. Aucune sortie de symptôme n'était attendue.

Simulation au 3 août :

La pression continue d'augmenter mais le niveau de risque reste sensiblement le même à J+7. 5mm sont suffisants à Balsac pour entraîner des contaminations épidémiques (25mm pour Marcillac et 70mm pour Compeyre). Les extériorisations des contaminations de la semaine passées sont en cours de sortie selon le modèle (5j d'incubation).


• Situation au vignoble

Pas d'évolution par rapport à la semaine passée.

Évaluation du risque : Le risque est modéré à ce jour. Restez vigilant en cas de symptômes sur feuilles et en présence de rosée. Soyez attentifs aux prévisions météo.



Techniques alternatives : L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle [en cliquant ICI](#).





Mildiou sur grappe (rot brun) et sur feuille. Crédit Photo : Syndicat du Chasselas de Moissac

BLACK ROT (*GUIGNARDIA BIDWELLII*)

- **Éléments de biologie**

[ephytia.inra - Biologie-epidemiologie du Black Rot](http://ephytia.inra.fr/Biologie-epidemiologie-du-Black-Rot)

- **Situation au vignoble**

Aucune évolution.

Évaluation du risque : A l'amorce de la véraison, le stade de fin de sensibilité est quasiment atteint.



Symptômes sur baies, à différents stades.

Crédit photo : Syndicat du Chasselas de MOISSAC

VERS DE LA GRAPPE (LOBESIA BOTRANA)

- **Éléments de biologie**

Suivre ce lien : [Vers de la grappe – Ephytia \(Biologie, Epidémiologie\)](#)

- **Modélisation**

Selon le modèle le stade majoritaire est L3.

- **Situation au vignoble**

Aucune capture sur Marcillac. Quelques perforations sur les zones non confusées.

Évaluation du risque : Afin d'évaluer le niveau de pression et évaluer la stratégie en G3, prévoyez un dénombrement des perforations ; elles doivent être visibles à ce jour. En l'absence de perforations, le risque est totalement nul pour la G3. Dans le cas contraire, se référer au seuil indicatif de risque.



Perforations de baies avec la chenille d'eudémis - Crédit photo : Gil BENAC- Cave du Vallon



Seuil indicatif de risque : 10 perforations pour 100 grappes en fin de G2.

5 perforations pour 100 grappes en fin de G2 pour les parcelles confusées.

CICADELLE DE LA FLAVESCENCE DOREE

(Scaphoidus Titanus)



*mue de cicadelle de la
flavescence dorée*

-Crédit photo Gil BENAC – Cave du Vallon

• Element de biologie

L'insecte vecteur se contamine en piquant pour se nourrir dans les vaisseaux du phloème d'une plante malade : c'est l'acquisition. Mais l'insecte n'est pas immédiatement infectieux, c'est la période de latence qui dure environ 30 jours. Après cette période d' « incubation », l'insecte infectieux le reste toute sa vie mais ne transmettra pas le phytoplasme à sa descendance. **Il pourra disséminer le phytoplasme de la Flavescence dorée au cours de ses vols et contaminer des plantes saines.** L'organisme, injecté dans le phloème de la plante, s'y multiplie et se pérennise durant toute la vie du cep.

Pour plus d'informations, suivre ce lien : [Cicadelle de la flavescence dorée – Ephytia](#)

• Situation dans les parcelles

Restez attentifs à l'apparition des symptômes.

Évaluation du risque : Les dates d'intervention ont été fixées par la DRAAF :

T1 Pour les communes de Compagnac, Maleville, Marcillac et Montjaux	Du 14 juin au 23 juin	Terminé
T2 Pour les communes de Compagnac, Maleville, Marcillac et Montjaux	En conventionnel : 15 jours après le T1 soit du 29 juin au 8 juillet En AB : 10 jours après le T1 soit du 24 juin au 2 juillet	Terminé
T3 Pour les communes de Compagnac, Maleville, Marcillac et Montjaux	Le T3 n'est obligatoire que sur les parcelles de vigne-mère. Dans les autres cas, il est optionnel, selon l'analyse du risque. Il est conseillé dans les cas suivants : - présence de foyers dans l'environnement des parcelles - présence de friches de vigne dans l'environnement des parcelles - présence de pieds FD dans la parcelle	A définir. En AB, le T3 est à faire à T2+10 jours.
Pour connaître la liste des communes concernées, consultez l'arrêté préfectoral publié sur le site de la DRAAF : retrouvez-le en cliquant ICI		

RETROUVEZ LE COMMUNIQUE DE LA DRAAF RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES DE LUTTE CONTRE L'INSECTE VECTEUR DE LA FLAVESCENCE DOREE DE LA VIGNE : [ICI](#)

Une surveillance soignée doit être engagée sur tous les secteurs. La détection précoce des foyers permet une plus grande efficacité de la lutte. Quatre symptômes doivent vous alerter :

- La décoloration des feuilles : en jaune pour les cépages blancs et en rouge pour les cépages noirs.
- L'aoûtement partiel ou imparfait des bois provoquant un port retombant des rameaux.
- L'enroulement des feuilles.
- Lorsqu'elles sont présentes, les grappes peuvent être flétries.



Symptômes de Flavescence – Crédit photo M. Baudouin



Symptômes de Flavescence – Crédit phot FREDON BFC

CICADELLE VERTE (*EMPOASCA VITIS*)

- **Element de biologie**

Eléments de biologie : suivre ce lien : [Cicadelle verte – Ephytia \(Biologie\)](#)

• Situation au vignoble

Quelques larves sont toujours présentes. Quelques symptômes sur feuilles.

Évaluation du risque : Le risque est toujours bien présent sur les zones sensibles. Il faut surveiller l'apparition des premiers symptômes et ne pas tarder à agir en cas de symptômes sur feuilles et lorsque le seuil indicatif de risque est dépassé. Compte tenu de la virulence de ce ravageur l'année passée, il faut rester vigilant.

NB : Ce ne sont pas les adultes mais les larves qui sont à l'origine des dégâts de grillure.



Larve de cicadelle des grillures- Crédit photo EUPHYTIA

Seuil indicatif de risque : 50 larves de cicadelle pour 100 feuilles

Techniques alternatives : Des solutions de biocontrôle existent. Elles sont à appliquer sur des larves jeunes ou de manière « préventive ». Par exemple, l'application d'argile comme barrière physique.

B

Annexe – Notes nationales Biodiversité – BSV (cliquer sur les images)



B

Produits de Biocontrôle

R

Résistances aux pesticides

Prochain BSV, le 5 août 2025

REPRODUCTION DU BULLETIN AUTORISÉE SEULEMENT DANS SON INTÉGRALITÉ (REPRODUCTION PARTIELLE INTERDITE)

Ce bulletin de santé du végétal a été préparé par l'animateur filière viticulture du Syndicat de défense du Chasselas de Moissac et élaboré sur la base des observations réalisées par la Chambre d'Agriculture de l'Aveyron, le Syndicat AOC Marcillac, la cave des vignerons du Vallon et les agriculteurs observateurs.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La CRA d'Occitanie dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base des observations qu'ils auront réalisées et en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.