



A retenir

CICADELLES VECTRICES DE LA FLAVESCENCE DOREE

2^{ème} traitement jusqu'au 30 juin

MILDIU

Les symptômes restent fructifères

OÏDIUM

Les symptômes continuent de progresser sur grappes

EUDEMIS

Dépôt des pontes de 2^{ème} génération toujours en cours

PLUVIOMETRIE

Aucune pluie enregistrée entre le 16 et le 22 juin inclus.

STADES PHENOLOGIQUES

Dans les parcelles observées, les stades phénologiques varient de :

- « **baies à tailles de pois** » (stade 31 ou K ou BBCH 75) dans les **secteurs tardifs et/ou parcelles tardives**
- à « **fermeture de la grappe** » (stade 33 ou L ou BBCH 79) dans les **parcelles précoces en zone précoce**.



Stade baies à taille de pois et
fermeture de la grappe

Le stade « **début fermeture de la grappe** » (BBCH 77) est très largement observé.

CICADELLE VECTRICE


DE LA FLAVESCENCE DOREE (*Scaphoideus titanus*)

✕ Vignoble régional

De nombreuses larves sont encore visibles au vignoble. Les stades larvaires vont de L3 à L5.

Les 1^{ers} adultes ont été observés.

Évaluation du risque : dans le cadre de la lutte obligatoire contre le vecteur de la flavescence dorée, les dates des **traitements obligatoires** sont fixées :



Stade L4

Directeur de publication :

Denis CARRETIER
Président de la Chambre
Régionale d'Agriculture
d'Occitanie
BP 22107
31321 CASTANET
TOLOSAN Cx
Tel 05.61.75.26.00

Dépôt légal : à parution

Comité de validation :
Chambres d'agriculture de
l'Aude, du Gard, de
l'Hérault/ADVAH, des
Pyrénées-Orientales,
Chambre régionale
d'Agriculture d'Occitanie,
IFV, FREDON Occitanie,
DRAAF Occitanie

ÉCOPHYTO
RÉDUIRE ET AMÉLIORER
L'UTILISATION DES PHYTOS

Action du plan Ecophyto
pilotée par les ministères en
charge de l'agriculture, de
l'écologie, de la santé et de la
recherche, avec l'appui
technique et financier de
l'Office français de la
Biodiversité

T1	du 4 juin au 15 juin du 7 juin au 16 juin dans le bassin Ouest de l'Aude	Terminé
T2	en conventionnel : 15 jours après le T1 soit du 19 au 30 juin ou du 22 au 1 ^{er} juillet (bassin Ouest de l'Aude) en AB : 10 jours après le T1 soit du 14 juin au 25 juin ou du 17 au 26 juin (bassin Ouest de l'Aude).	En cours En cours

Cas particulier : certaines communes sont concernées par l'aménagement de la lutte insecticide.

L'arrêté préfectoral est publié. ([Arrêté préfectoral 2025 organisant la lutte contre la Flavescence dorée de la vigne en Occitanie](#)).

MILDIOU *(Plasmopara viticola)*

• Données de la modélisation


× **Potentiel Système** (modélisation arrêtée au 22 juin compris)

	Situation au 22 juin	Simulation au 30 juin
Risque modélisé Mildiou	Le Risque modélisé devient majoritairement faible sur la région. Quelques zones persistent néanmoins avec un risque encore élevé (limite Gard/Hérault, Ouest Audois).	Le Risque modélisé à 7 jours est toujours diminution pour apparaître très faible sur presque l'ensemble du territoire.
Contaminations modélisées mildiou	D'après les prévisions météorologiques, aucune contamination primaire n'a été enregistré sur la région.	D'après les prévisions météorologiques actuelles, aucune contamination n'est annoncée d'ici au 30 juin sur toute la région.
Sorties	Des sorties de tâches issues des contaminations du 14 juin sont détectées à partir du 19 juin.	Aucune sortie issue de contamination primaire n'est annoncée.

Bleu = démarrage de nouvelles contaminations

Vert = Rien à signaler

MILDIOU - Fréquence Théorique d'Attaque :
simulée par le modèle au 22/06/2025



fait le 23/06/2025
mini=0.0% - maxi=54.1%

Légende



Interprétation :

Le risque modélisé continue de diminuer sur la semaine à venir, ce qui entraîne une stagnation de la FTA (Fréquence Théorique d'Attaque) en général. Cependant, les FTA à ce jour varient de 0 à 54 % d'organes attaqués, ce qui montre une hétérogénéité très forte de la pression selon les secteurs. Sur les secteurs déjà très impactés, les seules hygrométries peuvent néanmoins maintenir un mildiou actif sporulant. Cependant, compte tenu des prévisions météorologiques annoncées, notamment avec les hausses de températures, la progression du mildiou devrait être limité.

✕ **Milstop** (modélisation arrêtée au 22 juin compris) :

	Semaine du 10 au 15 juin			Semaine du 16 au 22 juin		
	Contaminations	Niveau de risque	Sortie de tâche à partir du :	Contaminations	Niveau de risque	Sortie de tâche à partir du :
LEUCATE	-	-	-	-	-	-
ALAIGNE	13 et 15/6	R	19 et 24/6	16 et 17/06	R	26 et 27/06
LEZIGNAN	-	-	-	-	-	-
CARCASSONNE	14/6	R	22/6	-	-	-
NARBONNE	-	-	-	-	-	-
BAGNOLS SUR CEZE	9 et 15/6	R	19 et 24/6	-	-	-
TAVEL	9 et 10/6	R	18 et 19/6	-	-	-
GENERAC	-	-	-	-	-	-
VAUVERT	14/6	R	23/6	-	-	-
CARDET	14 et 15/6	R	22 et 24/6	-	-	-
SOMMIERES	-	-	-	-	-	-
BOURDIC	9 et 10/6	R	18 et 19/6	-	-	-
ST JEAN DE FOS	-	R	-	-	-	-
VALFLAUNES	14/6	R	23/6	-	-	-
MARSEILLAN	15/6	R	24/6	-	-	-
POUZOLLES	14 et 15/6	R	22 et 24/6	-	-	-
BEZIERS	13 et 15/6	R	22 et 24/6	-	-	-
ST CHRISTOL	14 et 15/6	R	23 et 24/6	16/6	R	25-juin
PRADES SUR VERNAZOBRE	13 et 15/6	R	21 et 24/6	16/6	R	28-juin
OLONZAC	13 et 15/6	R	21 et 24/6	-	-	-
VILLEMAGNE LARGENTIERE	13 et 15/6	R	21 et 24/6	-	-	-
FRONTIGNAN	15/6	R	24/6	-	-	-
PLAISSAN	13 et 15/6	R	22 et 24/6	-	-	-
LAURENS	13 et 15/6	R	22 et 24/6	16/6	R	27-juin
LAROQUE DES ALBERES	-	-	-	-	-	-
PERPIGNAN RIVESALTES	-	-	-	-	-	-
SAINT PAUL FENOUILLET	-	-	-	-	-	-

Gravité **théorique** des foyers primaires susceptibles de se former :

-	pas de contamination	3	risque Moyen
R	repiquages	4	risque Fort
1	risque Limite	5	risque Très Fort
2	risque Faible		

D'après la modélisation, les conditions météorologiques enregistrées du 16 au 22 juin génèrent des contaminations secondaires théoriques dans quelques stations de l'Aude et de l'Hérault.

Les symptômes sont attendus à partir du 25 juin.

✕ **Modèle DAC ADN** (résumé mildiou pour la période du 16 au 30 juin) :

	Station	FMI	Capture de spore	Risque global
Hérault	Sérignan Merlot	6 h de FMI du 16/06 au 22/06. 4 h de FMI du 23/06 au 30/06.	5032 sporanges capturés du 12/06 au 19/06.	Risque reste à 4 sur la période.
Hérault	Roujan Grenache B	0 h de FMI du 16/06 au 22/06. 5 h de FMI du 23/06 au 30/06.	6825 sporanges capturés du 12/06 au 19/06	Risque reste à 4 sur la période.
Gard	Beauvoisin Grenache N	6 h de FMI du 16/06 au 22/06. 7 h de FMI du 23/06 au 30/06.	59 sporanges capturés du 11/06 au 16/06.	Risque reste à 4 sur la période.
Gard	Lecques Grenache N	12 h de FMI du 16/06 au 22/06. 6 h de FMI du 23/06 au 30/06.	1001 sporanges capturés du 12/06 au 19/06.	Risque reste à 4 sur la période.
Aude	Prat de Cest Carignan	2 h de FMI du 16/06 au 22/06. 4 h de FMI du 23/06 au 30/06.	686 sporanges capturés du 12/06 au 19/06.	Risque reste à 4 sur la période.
Aude	Pezens Grenache N	1 h de FMI du 16/06 au 22/06. 4 h de FMI du 23/06 au 30/06.	241 sporanges capturés du 12/06 au 19/06.	Risque reste à 4 sur la période.

À l'échelle du réseau, les conditions météorologiques favorables aux repiquages sont encore réunies, bien que de manière moins fréquente : de nouvelles contaminations restent donc envisageables.

Les émissions de sporanges se poursuivent sur l'ensemble des parcelles du réseau BSV. Les plus fortes concentrations de spores dans l'air ont été relevées sur les 2 parcelles de l'Hérault.

Le niveau de risque reste maximal (4/4), indiquant une très forte probabilité d'apparition de nouveaux symptômes dans les semaines à venir.

• **Situation aux vignobles**

✕ **Aude**

Nouvelle sortie de taches cette semaine sur l'ensemble du département (la présence de sporulation n'est pas systématique notamment pour l'Est Audois) et symptômes sur grappes pour les secteurs de l'Ouest Audois et du Minervois.

Nous observons ponctuellement du mildiou mosaïque sur feuilles.

Nous commençons à observer cette semaine des symptômes sur grappes de forme « rot brun ».

✕ **Gard**

Depuis la semaine dernière, l'augmentation de la fréquence des symptômes continue, mais faiblement dans l'ensemble du département. Les taches à la face inférieure des feuilles sont souvent fructifiées. Ceci est à mettre en relation avec les dernières matinées très humides.

Dans l'immense majorité des parcelles on note quelques taches sur feuilles et plus rarement encore quelques grains atteints par le rot brun. Très peu de parcelles présentent plus de 10 taches par ceps : il s'agit en général de parcelles de Grenache vigoureuses et poussantes. Elles sont un peu plus fréquentes dans la partie Ouest et Nord-Ouest du département.

✕ **Hérault**

Quelques nouveaux symptômes sont encore observés au vignoble notamment sur jeunes feuilles. De façon générale, les symptômes restent fructifiés. A l'échelle du vignoble départemental, la maladie est présente dans 92 % des parcelles.

Peu de nouveaux symptômes sur grappes (rot brun) sont observés cette semaine. A l'approche du stade fermeture de la grappe, les nouveaux symptômes ne concernent plus que quelques baies.

Toutefois, dans certaines parcelles et, plus particulièrement dans le Minervois et la Moyenne Vallée de l'Hérault, les vieux symptômes de rot gris restent bien fructifiés.

✕ **Pyrénées-Orientales**

De nouveaux symptômes sur jeunes feuilles (taches d'huile et mosaïque) sporulées et non sporulées sont observés notamment dans les Aspres 1^{ers} Coteaux et de la Plaine Nord et Sud Tech. Les autres secteurs voient aussi des sorties de nouveaux symptômes mais dans une moindre mesure.



Symptômes de rot brun sur grappes

Le rot brun est facilement observé dans le vignoble, il peut concerner de 1 à 2 grains par grappes à l'intégralité de la grappe selon les parcelles et les secteurs.

Des pertes de récolte sont notées.

Évaluation du risque : la période de forte sensibilité est en cours. La vigne peut connaître des dégâts jusqu'à la fermeture de la grappe/début véraison.

Compte tenu des conditions météorologiques de la semaine passé et à venir, notamment avec les hausses de températures, le risque se stabilise cette semaine. Toutefois, dans la majorité des situations, les symptômes restent fructifères et les humidités matinales peuvent suffire à entretenir la maladie.

Dans les situations touchées par des épisodes pluvio-orageux, de nouvelles contaminations et sorties de symptômes sont à prévoir.

Techniques alternatives :

Il existe des produits de biocontrôle utilisable contre cette maladie. Pour connaître ces produits et leurs utilisations consulter la note biocontrôle du Guide des Vignobles [ICI](#).

Méthodes prophylactiques :

- maintenir le couvert végétal ras sous le rang, dans l'inter rang et limiter au maximum le travail du sol afin de restreindre la remontée d'humidité dans la souche,

Résistance : le mildiou présente des résistances vis-vis de certains produits phytosanitaires. Il est important de les connaître et d'adapter son calendrier de traitement en fonction de ce risque de résistance. Pour en savoir plus, consultez la note nationale en cliquant [ICI](#)

OIDIUM (*Erysiphe necator*)

• Données de modélisation :

× **Modèle DAC ADN** (résumé oidium pour la période du 16 au 30 juin) :

	Station	FMI	Capture de spore	Risque global
Hérault	Sérignan Merlot	FMI moyen de : 8 h/jour du 16/06 au 22/06 6 h/jour du 23/06 au 30/06.	Aucune spore du 09/06 au 12/06. 42 spores capturées du 12/06 au 19/06.	Risque 4 du 16/06 au 24/06 puis risque 3.
Hérault	Roujan Grenache B	FMI moyen de 5 h/jour du 16/06 au 30/06.	1553 spores capturées sur actif du 09/06 au 12/06. Aucune spore du 12/06 au 19/06.	Risque 4 du 16/06 au 18/06, risque 2 du 19/06 au 23/06 puis risque 3.
Gard	Beauvoisin Grenache N	FMI moyen de : 7 h/jour du 16/06 au 22/06 4 h/jour du 23/06 au 30/06.	1 spore capturée sur actif du 11/06 au 16/06.	Risque 4 du 16/06 au 22/06 puis risque 3.
Gard	Lecques Grenache N	FMI moyen de : 7 h/jour du 16/06 au 22/06 5 h/jour du 23/06 au 30/06.	Aucune spore du 12/06 au 19/06.	Risque 4 du 16/06 au 18/06 puis risque 3.
Aude	Prat de Cest Carignan	FMI moyen de 5 h/jour du 16/06 au 30/06.	104981 spores capturées du 12/06 au 19/06.	Risque 4 du 16/06 au 19/06 puis risque 3.
Aude	Pezens Grenache N	FMI moyen de : 5 h/jour du 16/06 au 22/06 7 h/jour du 23/06 au 30/06.	Aucune spore du 12/06 au 19/06.	Risque 3 du 16/06 au 20/06, Risque 2 du 21/06 au 25/06, puis risque 3 jusqu'au 30/06.

Sur l'ensemble du réseau, le FMI Oïdium présente une dynamique homogène, avec une moyenne journalière comprise entre 4 et 8 heures. Ce niveau traduit un risque météorologique d'infection modéré à faible.

Les mesures de spores réalisées sur le réseau BSV confirment l'état sanitaire observé sur les parcelles suivies : les niveaux sont nuls ou faibles sur les parcelles sans symptômes (Sérignan, Beauvoisin, Lecques et Pezens), tandis que les parcelles avec symptômes observés présentent des émissions de conidies plus marquées (plusieurs milliers par échantillon).

Sur la parcelle de Prat de Cest, connue pour sa forte sensibilité, la pression reste particulièrement élevée, avec des concentrations importantes d'oïdium.

• Situation au vignoble

✕ Aude

Présence de symptômes sur baies et pédicelles en légère augmentation cette semaine plus particulièrement sur les cépages sensibles (Carignan, Chardonnay).

Peu de symptômes observés dans l'ensemble mais ponctuellement certaines parcelles sont bien impactées par la maladie.

✕ Gard

Dans le Bassin Alésien, la fréquence des parcelles atteintes est en augmentation cette semaine, la maladie progresse aussi dans des parcelles de cépages moins sensibles.

Ailleurs dans le département, peu d'évolution de la maladie cette semaine. Une légère évolution est observée dans des parcelles présentant déjà de nombreux symptômes.

✕ Hérault

De nouveaux symptômes sur feuilles et baies sont toujours observés. La maladie est visible dans toutes les situations et sur tous cépages.

Cette semaine encore la maladie continue de progresser sur grappes avec une proportion des parcelles concernées qui passe de 38 à 44 % en 8 jours.

Dans les unités agroclimatiques du Minervois, des Hauts Coteaux, du Biterrois, de la Basse et Moyenne Vallée de l'Hérault et du Montpelliérain, des attaques significatives sont observées (> de 30 % des grappes avec symptômes).

Dans de rares parcelles du Biterrois et de la Basse Vallée de l'Hérault, des dégâts significatifs sont notés (jusqu'à 92 % des grappes atteintes et 38 % de la qualité de la récolte affectée). Dans ces situations, il y a peu d'espoir de stabiliser la maladie.

✕ Pyrénées-Orientales

Les symptômes sur feuilles sont toujours actifs et progressent légèrement tandis que ceux sur grappes ont une évolution plus importante.

La fréquence des parcelles avec présence augmente encore cette semaine.



Symptôme d'oïdium sur grappe

Evaluation du risque : période forte sensibilité toujours en cours dans les parcelles les plus tardives. A partir de la fermeture, la sensibilité des grappes décroît pour devenir nulle au début de la véraison. **Un examen exhaustif des grappes au cœur des souches est désormais indispensable.**



Techniques alternatives :

Il existe des produits de biocontrôle utilisables contre cette maladie. Pour connaître ces produits et leurs utilisations consulter la note biocontrôle du Guide des Vignobles [ICI](#).



Résistance : l'oïdium présente des résistances vis-à-vis de certains produits phytosanitaires. Il est important de les connaître et d'adapter son calendrier de traitement en fonction de ce risque de résistance. Pour en savoir plus, consultez la note nationale en cliquant [ICI](#)

BLACK ROT *(Guignardia bidwellii)*

• Situation aux vignobles

• Aude et Pyrénées-Orientales

Pas de nouveau symptôme observé cette semaine.

La maladie est présente sur feuilles dans de faibles proportions dans le vignoble départemental.

La fréquence de parcelles touchées reste stable.

✕ Gard

Une sortie sur grappes est en cours sur le Bassin Alésien dans des parcelles sensibles, les symptômes sur baies sont observés en fréquence faible à moyenne.

Dans la Vallée du Rhône Nord, très localement en bord de Cèze, des symptômes sur grappes sont visibles depuis le milieu de la semaine dernière. Des pertes de récoltes sont notées. Ces sorties sont probablement liées aux orages du 04 juin.

✕ Hérault

Dans la Moyenne Vallée de l'Hérault, de nouveaux symptômes sur baies sont découverts (Saint Jean de Fos). Dans les autres unités agroclimatiques, aucun nouveau symptôme n'est observé cette semaine.

Evaluation du risque : le risque est globalement faible et moyen dans les secteurs où de nouveaux symptômes sur grappes sont observés.

Nous sommes encore dans la période de forte sensibilité de la vigne.



Black rot sur baies



Techniques alternatives :

Il existe des produits de biocontrôle utilisable contre cette maladie. Pour connaître ces produits et leurs utilisations consulter la note biocontrôle du Guide des Vignobles [ICI](#).



Résistance : le black rot présente des résistances vis-vis de certains produits phytosanitaires. Il est important de les connaître et d'adapter son calendrier de traitement en fonction de ce risque de résistance. Pour en savoir plus, consultez la note nationale en cliquant [ICI](#)

TORDEUSES DE LA GRAPPE

- Eudémis (*Lobesia botrana*)
- Données de modélisation
 - ✕ **Activ** (modélisation arrêtée au 22 juin compris) :

	Début du vol de 2 ^{ème} génération	Début des pontes de 2 ^{ème} génération	Début des éclosions
ALAIGNE	19/6	24/6	29/6
CARCASSONNE	11/6	16/6	21/6
LEUCATE	10/6	14/6	19/6
LEZIGNAN	7/6	12/6	16/6
NARBONNE	4/6	9/6	13/6
BAGNOLS SUR CEZE	7/6	11/6	16/6
BOURDIC	12/6	16/6	21/6
CARDET	14/6	19/6	24/6
GENERAC	7/6	11/6	16/6
SOMMIERES	8/6	13/6	18/6
TAVEL	10/6	14/6	19/6
VAUVERT	3/6	8/6	13/6
BEZIERS	4/6	9/6	14/6
FRONTIGNAN	3/6	8/6	13/6
LAURENS	13/6	18/6	22/6
MARSEILLAN	6/6	11/6	16/6
OLONZAC	3/6	8/6	13/6
PLAISSAN	7/6	12/6	16/6
POUZOLLES	6/6	11/6	15/6
PRADES SUR VERNAZOBRE	9/6	13/6	18/6
ST CHRISTOL	7/6	13/6	16/6
ST JEAN DE FOS	6/6	12/6	17/6
VALFAUNES	12/6	17/6	22/6
VILLEMAGNE L'ARGENTIERE	23/6	28/6	2/7
LAROQUE DES ALBERES	30/5	4/6	9/6
PERPIGNAN RIVESALTES	1/6	6/6	12/6
SAINT PAUL FENOUILLET	12/6	17/6	21/6

- Situation au vignoble



Pontes fraîches



Pontes d'eudémis en évolution



Pontes au stade tête noire



Jeune larve et sa 1^{ère} perforation

- ✕ **Aude**

Le stade phénologique des baies est maintenant bien réceptif sur l'ensemble du département.

Résultats de piégeage au 23/06/2025 :

Commune des pièges + lieu dit	Preixan	Villars	Bouriège	Esperaza	Montréal-escapat	Mazerolles du Razès- Rau Ouest	Issel-en-cals	Talairan
Nb papillons/Nb de pontes	0/0	71/1	21/0	0/0	0/0	2/0	pas de relevé	5/0
Commune des pièges + lieu dit	Lauraguel-Estagnol	Lauraguel-Ruisseau l'albane	Alaigne-Cazes	Pezens-Molière	Carlipa-St André	Tuchan -Les Condomines	Caves	Bages
Nb papillons/Nb de pontes	49/1 pontes par grappe et 15% de grappe touchées	1/1 pontes par grappe et 20% de grappe touchées	1/0	pas de relevé	pas de relevé	0/0	3/1 pontes pour 25 grappes	19/1 pontes pour 25 grappes
Commune des pièges + lieu dit	Castel-Bera	Embres et Castelmare	Ginestas-Pouzeranque	Canet	Argeliers	St Nazaire	Portel des Cbrs	Coursan
Nb papillons/Nb de pontes	17/0	0/0	0/0	0/1	0/0	0/0	6/0	20/0

Des pontes ont été observées sur l'ensemble des secteurs, le vol continu cette semaine.

✕ Gard

Le vol de 2^{ème} génération diminue (voire est en arrêt) dans les secteurs des Sables, la Vaunage et la Vallée du Rhône Nord. Il se poursuit dans les secteurs du Bassin Alésien, les Costières et la Vallée du Rhône Sud où des pontes fraîches étaient encore observées en milieu de semaine dernière. Dans les secteurs plus tardifs, des pontes fraîches sont encore visibles.

Ce début de semaine, des perforations sont visibles dans tous les secteurs et des larves au stade L1-L2.

✕ Hérault

Le dépôt des pontes se généralise dans tout le département avec parfois des effectifs importants.

Cette semaine :

- **en zones précoces et moyennes**, alors que le dépôt se poursuit, des œufs au stade tête noire ainsi que les 1^{ères} éclosions sont visibles. Des larves (stade L1 et L2) commencent à être observées.
- **en zones tardives**, des pontes fraîches et en évolution sont maintenant visibles.

Par rapport à 2024, les pontes sont plus facilement observées et les effectifs sont en augmentation. Les dépassements des seuils de risque sont régulièrement constatés.

✕ Pyrénées-Orientales

Le vol de 2^{ème} génération est en cours dans le vignoble départemental.

Les 1^{ères} pontes sont observées dans les secteurs de la Haute Vallée de l'Agly, le Bas Conflent et les Fenouillèdes Vallée. Ces pontes sont facilement visibles dans les parcelles sensibles.

Les pontes sont toujours observées dans les secteurs de la Plaine Nord et Sud Tech, du Cru Banyuls, des Aspres 1^{ers} Coteaux et de la Moyenne Vallée de l'Agly.

Évaluation du risque : il est en augmentation.

Seuil indicatif de risque : 5 à 10 pontes pour 100 grappes observées

• Pyrale du Daphné (*Cryptoblabes gnidiella*)

✕ Aude

Les captures dans les pièges sont en nette diminution cette semaine sur l'ensemble du département excepté sur le secteur de Leucate-Caves.

Pas encore de toiles ou « nids » observés dans les parcelles historiquement sensibles à ce jour.

Relevé des captures semaine 24 25 et 26 :



Cryptoblabes gnidiella pris dans un piège

Commune des pièges + lieu dit	Preixan	Carcassonne-Herminis	Pezens-Molière	Tuchan- Les condamines	Cascastel-Bera	Embres et Castelmaure-Linas	Ginestas-Pouzeranque
Nb papillons semaine 24	0	0	0	20	23	5	0
Nb papillons semaine 25	0	0	0	9	3	6	3
Nb papillons semaine 26	0	pas de relevé	pas de relevé	1	2	0	1
Commune des pièges + lieu dit	Canet d'Aude	Raissac d'Aude	St Nazaire	Cruscades	Bagnolles-Parazols	Homps	Laure Minervois
Nb papillons semaine 24	0	pas de relevé	0	0	0	5	0
Nb papillons semaine 25	2	2	3	18	0	4	0
Nb papillons semaine 26	0	1	0	0	pas de relevé	6	0
Commune des pièges + lieu dit	Félines Minervois	Coursan	Cabanes de Fleury	Bages	Talairan	Portel des Cbrs	Caves
Nb papillons semaine 24	1	0	0	1	0	0	19
Nb papillons semaine 25	0	2	0	0	0	0	6
Nb papillons semaine 26	0	2	0	0	0	0	10

✕ Gard

Les captures sont faibles à nulles dans l'ensemble du département.

Des jeunes larves mais également des plus âgées sont observées ponctuellement, principalement dans des parcelles de Chardonnay.

✕ Hérault

Les effectifs sont généralement faibles, de l'ordre de 1 à 8 papillons hebdomadaires.



Larve dans une grappe

De nouvelles larves sont observées cette fois-ci dans le Biterrois (Béziers), les Hauts Coteaux (Prades sur Vernazobre) et les Basse et Moyenne Vallée de l'Hérault (Saint Pargoire, Saint Jean de Fos).

✕ Pyrénées-Orientales

Les captures de papillons sont notées dans les pièges du réseau d'observations.

Évaluation du risque : le risque est faible mais il augmente avec l'évolution des stades phénologiques de la vigne.

• **Eulia** (*Argyrotaenia ljungiana*)

✕ Hérault

Des larves sont encore observées dans des glomérules dans certaines parcelles du Biterrois (Magalas, Quarante) et des Basse et Moyenne Vallée de l'Hérault (Pinet, Saint André de Sangonis).

Évaluation du risque : le risque est faible.



Eulia dans une grappe

CICADELLE VERTE (*Empoasca vitis*)

✕ Aude

De nouvelles larves sont présentes dans les parcelles sensibles, les populations augmentent faiblement pour le moment.

De nombreux adultes sont observés cette semaine sur le secteur Razès Malepère, mais pas encore de symptômes de « grillures » visibles.

✕ Hérault

Des larves sont présentes dans le vignoble. Les 1^{ers} symptômes sur feuilles sont notés, ils restent éparés.

✕ Pyrénées-Orientales

Des larves sont notées au vignoble.

Évaluation du risque : à ce jour, le risque est en augmentation.

Seuil indicatif de risque : 200 larves pour 100 feuilles observées

MALADIE DU BOIS

✕ Vignoble régional

De nouveaux symptômes de Black-Dead-Arm et/ou Esca sont visibles au vignoble.

Évaluation du risque : repérez les souches exprimant des symptômes qui pourront être gérées par voie prophylactique.

ACCIDENTS CLIMATIQUES

• Grêle

✕ Hérault

Un orage accompagné de grêle est survenu le 22 juin, notamment dans le Piscenois (Caux, Gabian, Lézignan la Cèbe, Pézenas, Pouzolles, Roujan, ...) avant de gagner le littoral de la Basse Vallée de l'Hérault (Bessan, Saint Thibery...).

Quelques baies touchées sont observées, mais les dégâts seraient peu significatifs. Ils restent en cours d'évaluation.



dégâts de grêle sur aranne

ACCIDENT PHYSIOLOGIQUE

- **Stress hydrique**
 - × **Vignoble régional**

Les premiers symptômes de sécheresse sont observés cette semaine.

Après une période de « confort hydrique », les vignes commencent à souffrir des fortes chaleurs et de l'absence de précipitations.



Premiers symptômes de sécheresse

Crédit photos : Chambres d'agriculture de la zone Languedoc-Roussillon et Groupe Guide des Vignobles Rhône-Méditerranée.

Annexe – Notes nationales Biodiversité – BSV (cliquer sur les images)



Produits de Biocontrôle



Résistances aux pesticides

Prochain BSV le 1^{er} juillet

REPRODUCTION DU BULLETIN AUTORISÉE SEULEMENT DANS SON INTÉGRALITÉ (REPRODUCTION PARTIELLE INTERDITE)

Ce Bulletin de Santé du Végétal a été préparé par les animateurs filière viticulture des Chambres d'agriculture de l'Aude, du Gard, de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales avec la participation du comité de validation et élaboré sur la base des observations réalisées par les Chambres d'agriculture de l'Aude, du Gard, de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales, l'ADVAH, FREDON Occitanie, Pérès SAS, Ets Perret, Maison Sinnae et Neoterra.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La CRA d'Occitanie dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base des observations qu'ils auront réalisées et en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.