

Abonnez-vous
gratuitement
aux BSV de la région
Occitanie



A retenir

FRAISES

Pucerons : Risque en augmentation
Noctuelles : Risque en augmentation
Botrytis : Risque en augmentation
Dépérissement : Risque en augmentation

ARTICHAUT

Oïdium *Leveillula taurica* : Risque stable faible
Oïdium *Golovinomyces cichoracearum* : Risque en très forte augmentation
Mildiou : Risque stable fort à surveiller
Pucerons : Risque stable faible
Apion : Risque stable faible
Rat taupier : Risque en augmentation
Gros gibiers : Risque en augmentation
Carence physiologique : Risque en augmentation

CHOUX BROCOLI

Gel : Risque faible sauf en bord de cours d'eau
Limaces et escargots : Risque stable
Alternaria : Risque en augmentation
Mildiou et maladies du feuillage : Risque en augmentation
Chenilles défoliatrices : Risque stable faible
Pucerons : Risque stable faible
Sclerotinia : Risque bien présent

CELERI BRANCHE

Septoriose : Risque maximal
Mouche du céleri : Risque stable faible
Pucerons : Risque stable faible
Sclerotinia : Risque en forte augmentation
Limaces et escargots : Risque en augmentation

SALADES LAITUE ET SCAROLE

Noctuelles défoliatrices : Risque stable faible
Limaces et escargots : Risque stable moyen
Pucerons : Risque stable faible
Sclerotinia et botrytis : Risque en forte augmentation
Mildiou : Risque en augmentation
Dégâts de lapins : Risque très important dans certains secteurs
Forficules : Risque en augmentation
Oïdium : Risque stable

FENOUIL BIO

Limaces et escargots : Risque stable fort
Bactériose : Risque bien présent dans les secteurs concernés
Pucerons : Risque faible
Sclerotinia : Risque en forte augmentation

EPINARD

Mildiou : Risque bien présent

PETIT POIS SOUS ABRIS

Oïdium : Risque en augmentation



Directeur de publication :

Denis CARRETIER
Président de la Chambre
Régionale d'Agriculture
d'Occitanie
BP 22107
31321 CASTANET
TOLOSAN Cx
Tel 05.61.75.26.00

Dépôt légal : à parution

Comité de validation :
CENTREX, Chambre
d'agriculture du Gard, DRAAF
Occitanie, SUDEXPE

écophyto
Réduire et améliorer l'utilisation des phytos

Action du plan Ecophyto pilotée
par les ministères en charge de
l'agriculture, de l'écologie, de la
santé et de la recherche, avec
l'appui technique et financier de
l'Office français de la Biodiversité



Téléchargez la note en cliquant sur la vignette ou consultez-la depuis la page [Ecophytopic](#)



Consultez la note nationale Focus **abeilles – pollinisateurs** - réglementation en cliquant [ICI](#)

METEO

- Prévisions pour la période du 11 au 16 février (Source Météo France)

Département / Jour	Mer	Jeu	Vend	Sam	Dim	Lun
Gard						
Hérault						
Aude						
Pyrénées-Orientales						

La période actuelle reste perturbée, sous régime de vent d'ouest, avec des successions de fronts pluvieux. Le temps est fréquemment nuageux et venteux mercredi 11 et jeudi 12, parsemé d'averses. Les pluies se généraliseront sur tout le territoire vendredi 13, sous régime de vent marin. Samedi 14 sera plus clément, sous tramontane. Dès dimanche 15 après-midi, un nouveau front pluvieux traversera le territoire jusqu'à lundi 16 février. Les températures seront douces à fraîches

FRAISES SOUS ABRIS



A noter que des analyses ont été faites cet automne sur plusieurs lots de Trays plants de fraises et que du *Neopestalotiopsis* a été détecté. Des analyses faites par la DRAAF PACA en début d'année avaient permis d'identifier la présence d'au moins 2 espèces de *Neopestalotiopsis*, *Neopestalotiopsis hispanica* et *Neopestalotiopsis rosa-like*.

Du côté Occitanie, n'hésitez pas à contacter votre Chambre d'agriculture si jamais vous avez des plants suspects ou des problèmes de dépérissement sur vos cultures de fraises. Des analyses pourront être faites dans le cadre du BSV pour voir s'il s'agit de *Neopestalotiopsis* ou de *Phytophthora cactorum* et en cas de *Neopestalotiopsis* une analyse supplémentaire pourra être faite par la DRAAF. Vous trouverez avec ce BSV la [fiche Neopestalotiopsis](#) rédigée par la Chambre d'Agriculture du Vaucluse.


A noter que pour ceux qui ont eu du *Neopestalotiopsis* cette année et qui replantent dans les mêmes serres il est fortement conseillé de faire une désinfection des structures **avant** la mise en place des plants de fraisiers.

- **Stade des cultures : Plantation - reprise**

En hors sol chauffés, notamment dans l'Hérault, les cultures les plus avancées sont au stade floraison – nouaison.

En tunnel froid le nettoyage des Tray plants est terminé et pour les plus avancés dans la partie Costières les 1ers fruits tournants / rouges comme à arriver.

En plein champ, les plants de fraises sont en train de prendre des heures de froid, 873 h de froid en zone Costières de Nîmes (09 Février 2026, Source CTIFL) donc selon les variétés le nettoyage va pouvoir commencer et 546 h de froid dans la plaine du Roussillon (07 Février 2026, source CTIFL).



Bourdon en action – Photo CA30



Plantation plein champ



Multichapelle stade fruits tournants - Photos CA30

- **Pucerons (Plusieurs espèces)**

Nous observons toujours des pucerons (notamment du *chaetosyphon*) et les populations ont tendance à augmenter mais n'explorent pas. Bien surveiller les parcelles.

Évaluation du risque : Risque en augmentation



Techniques alternatives :

- Des produits de bio-contrôle existent. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.

Mesures prophylactiques :

Eviter les excès de fertilisation



Pucerons - Photo CA30

• **Noctuelles défoliatrices** (Plusieurs espèces)


Nous observons toujours de manière régulière quelques attaques de noctuelles défoliatrices avec la présence de quelques dégâts sur les feuilles et sur quelques fleurs. Ponctuellement les dégâts peuvent être importants.

Évaluation du risque : Risque en augmentation



Techniques alternatives :

- L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace. [Liste des produits de bio-contrôle](#). Contacter votre technicien.



Dégât sur fleur – Photo CA30

• **Botrytis** (*Botrytis cinerea*)

Avec les différentes périodes de pluie et aussi par manque d'aération lors des journées ensoleillées (peu nombreuses en ce moment), nous notons une augmentation de la présence de botrytis sur les feuilles et maintenant aussi sur fleurs..

Évaluation du risque : Risque en augmentation



Techniques alternatives : Des produits de bio-contrôle existent. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.

Mesures prophylactiques :

- Bien aérer les abris
- Bien nettoyer les plants



Botrytis – Photo JEEM



Botrytis sur fleur – Photo CA30

• Dépérissement

Nous observons toujours quelques dépérissement avec des nécroses au niveau des cœurs mais aussi quelques symptômes sur feuilles peuvent faire penser à du *Neopestalotiopsis*.... À suivre et nous ferons des analyses si besoin

Évaluation du risque : Risque en augmentation

Mesures prophylactiques : Bien gérer les irrigations

Techniques alternatives : L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible. [Liste des produits de bio-contrôle](#). Contacter votre technicien.



Neopestalotiopsis ???



Dépérissement – Photos CA30

ASPERGE

Stade des cultures : Les 1ères cultures ont commencé à être paillées mais les opérations sont rendues délicates à causes des pluies successives... les sols n'ont pas le temps de se ressuyer pour permettre le passage des tracteurs



Culture pas encore paillée – Photo CA30



Paillage des cultures – Photos CA30

• Désherbage

Il est à noter que pour le désherbage chimique de prélevé des adventices et des turions, la matière active Métribuzine a été arrêtée donc tous les produits qui en contenait ne sont plus autorisés depuis fin 2025.

Évaluation du risque : Risque important compte tenu des pluies



Techniques alternatives

- En asperges vertes, possibilité de mettre en place un paillage biodégradable noir, bien tendu avec environ 1-2 cm de terre dessus pour que les asperges puissent bien le percer sans faire la crosse.
- Sur adventices déjà levées, l'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace dans le cadre des « traitements généraux, désherbage des Cultures Installées (notamment en asperges

vertes, à utiliser 1 mois avant récolte). Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien

ARTICHAUT

- **Stade des cultures** : Capitules taille mandarine à approche récolte – Données Roussillon

- **Oïdium (*Leveillula taurica*)**

L'oïdium, habituellement observé sur artichaut (*Leveillula taurica*) qui provoque des taches circulaires blanches sous le dessous des feuilles et remonte de la base des feuilles vers le haut de la plante est très peu observé en ce moment. Quelques symptômes sont visibles sur les feuilles basses, mais n'ont pas progressé.



Leveillula sur face inférieure d'une feuille d'artichaut– Photo Centrex

Evaluation du risque : Risque stable faible



Techniques alternatives

L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.

- **Oïdium (*Golovinomyces cichoracearum*)**

De nouveaux symptômes d'oïdium, très différents de ceux observés jusqu'à présent sont observés, depuis une semaine, sur le haut des plants d'artichauts les plus avancés. Sur les feuilles présentes sur la tige des capitules en cours de formation, des points blancs et taches de décolorations jaunes sont observés parfois sans feutrage blanc au départ, puis se répand rapidement à l'ensemble de la couronne haute de la plante. Un mycelium blanc se développe à la surface de la face supérieure des feuilles. Les attaques sont en très fortes augmentation à l'approche de la récolte. Bien surveiller les parcelles.

Evaluation du risque : Risque en très forte augmentation



Techniques alternatives

L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.



Golovinomyces cichoracearum : Forte attaque de sur feuilles autour des capitules (gauche), début symptôme par décoloration (milieu et droite) – Photos Centrex

- **Mildiou (*Bremia lactucae*)**

Nous observons toujours des sporulations sur des taches qui étaient déjà présentes sur les plantes. Actuellement les symptômes évoluent peu en raison des températures froides, mais les conditions humides favorisent grandement le risque de dissémination des spores, qui risquent de créer des contaminations secondaires dès le retour de conditions plus chaudes. Le risque mildiou est présent, Bien surveiller les parcelles.



Mildiou sur artichaut – Photo Centrex

Évaluation du risque : Risque stable fort à surveiller



Techniques alternatives

- Eviter l'irrigation par aspersion
- Laisser ressuyer les sols et éviter les arrosages par temps humide
- Garder les inter-rangs, propres, sans adventices pour limiter l'excès d'humidité au niveau des feuilles de la base.
- L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.

• Pucerons (plusieurs espèces)

La pression pucerons verts et noirs est faible. Nous quelques petits foyers en culture. Bien surveiller les parcelles.

Évaluation du risque : Risque stable faible



Techniques alternatives :

- Eviter les excès de fertilisation azotée
- Planter des plantes attractives auxiliaires à proximité des parcelles
- Repérer les fourmis qui peuvent être un indicateur de leur présence
- Favoriser la biodiversité par implantation d'un parcellaire diversifié
- L'utilisation de moyens de biocontrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.

• Apion (Ceratapion carduorum)

Nous observons la présence de quelques adultes en culture. Le risque qu'ils provoquent des dégâts en cette saison est faible. Par contre, les larves issues des pontes de l'automne pourront remonter sur les capitules. A surveiller

Évaluation du risque : Risque stable faible

• Rat taupier (Arvicola amphibius) :

Après 2 années de sécheresse pendant lesquelles le rat taupier avait fait peu de dégâts, les populations sont fortement remontées cette saison, provoquant des pertes de plants pouvant aller jusqu'à 20 % sur certaines parcelles. Il mange les racines des artichauts et le collet laissant un trou à la base des feuilles.



Dégâts de rat taupier sur artichaut
– Photo Centrex

Évaluation du risque : Risque en augmentation

Techniques alternatives :

- Travailler le sol pour détruire les galeries
- Favoriser les rapaces (poteaux à rapaces)
- utiliser des pièges mécaniques

- **Gros gibiers : ragondin** (*Myocastor coypus*), **sanglier** (*Sus scrofa*) :

A l'approche des récoltes, les attaques de sangliers et de ragondins se multiplient. Ils mangent les capitules et provoquent d'importantes pertes de récolte sur certains secteurs.

Évaluation du risque : Risque en augmentation

Techniques alternatives :

- Barrières anti sanglier
- Pièges légaux : contacter le lieutenant de louvèterie ou la fédération de chasse près de chez vous.



Traces passage sanglier sur artichaut
Photo CA66

- **Carence physiologique :**

Sur plusieurs parcelles, nous observons un jaunissement des feuilles. Les plantes qui forment leurs capitules ont besoin de beaucoup d'éléments nutritifs et ils puisent dans les vieilles feuilles les éléments qu'ils ne trouvent pas dans le sol. Les fortes pluies des semaines passées ont pu lessiver les sols. Vérifier l'état des sols afin d'apporter les éléments nécessaires aux plantes. Dans les cas les plus extrêmes, le manque d'apports nutritifs peut engendrer des pertes de vigueur et sensibiliser les plantes aux maladies.

Évaluation du risque : Risque en augmentation



Techniques alternatives :

- Faites des tests nitrates au niveau du sol régulièrement pour ajuster les apports.

CHOUX BROCOLI

- **Stade des cultures : Croissance - Récolte**

- **Gel / Froid**

Dans le Languedoc, nous observons une coloration violette des brocolis suite aux basses températures notamment bords de cours d'eau. Les dégâts de gel peuvent entraîner ponctuellement des nécroses sur fleurs (pourritures de pommes avec les pluies).

Évaluation du risque : Risque faible sauf en bords de cours d'eau

Techniques alternatives : protection possible avec du P17



Dégâts de gel - Photo CA30

- **Limaces et escargots** (*Plusieurs espèces*)

Aussi bien dans le Languedoc que dans le Roussillon, nous observons toujours des attaques de limaces et d'escargots, les humidités matinales sont favorables.

Évaluation du risque : Risque stable



Techniques alternatives :

- L'utilisation de moyens de biocontrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.



Limace - Photo CA30

- **Alternaria** (*Alternaria sp.*)

En particulier dans le Roussillon, l'Alternaria provoque beaucoup de dégâts et d'écarts de tri. Les conditions météorologiques instables et humides sont favorables

Évaluation du risque : Risque en augmentation



- Techniques alternatives
- Arroser le matin par temps ensoleillé
- Eviter les excès de fertilisation azotée et d'eau
- L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.



Alternaria sur chou - Photo Centrex

- **Mildiou** (*Peronospora parasitica*) **et autres maladies du feuillage**

Aussi bien dans le Languedoc que dans le Roussillon, nous observons quelques symptômes de mildiou en culture. Les conditions climatiques sont favorables aux maladies du feuillage, surveiller les parcelles. .

Évaluation du risque : Risque en augmentation



Techniques alternatives :

- Eliminer les feuilles atteintes
- Eviter les excès de fertilisation azotée et d'eau
- Arroser le matin par temps ensoleillé
- L'utilisation de moyens de biocontrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.



Mildiou – Photo CA30


• Chenilles défoliatrices (plusieurs espèces)

Aussi bien dans le Languedoc que dans le Roussillon, ponctuellement, nous pouvons observer des traces de chenilles défoliatrices, mais leur activité est assez faible en période froide

Évaluation du risque : Risque stable faible

Techniques alternatives :

- Surveiller les parcelles afin de détecter les plus jeunes stades larvaires
- L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible sur jeunes chenilles. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.



Chrysalide de piéride du chou -
Photo CA30

• Pucerons (Plusieurs espèces)

Aussi bien dans le Languedoc que dans le Roussillon, nous observons la présence de pucerons, notamment cendrés en agriculture biologique. Les populations sont assez faibles et globalement nous ne notons pas d'évolution cette semaine.

Évaluation du risque : Risque stable faible

Techniques alternatives :

- Eviter les excès de fertilisation azotée
- Planter des plantes attractives auxiliaires à proximité des parcelles



Pucerons sur chou - Photo CIVAM BIO 66



Pucerons sur brocoli – Photo CA30

• Sclérotinia (*Sclerotinia sclerotiorum*)

En particulier dans le Languedoc, avec les conditions humides que nous connaissons nous observons quelques dégâts de sclérotinia, notamment sur choux brocoli.

Évaluation du risque : Risque bien présent

Techniques alternatives :

- Des produits de biocontrôles existent. [Liste des produits de biocontrôle](#). Contacter votre technicien



Sclérotinia sur choux –Photo CA30

CELERI BRANCHE

- **Stade des cultures :** Reprise – croissance – Récolte

• **Septoriose** (*Septoria apiicola*)

En particulier dans le Roussillon, la Septoriose fait d'importants dégâts en plein champ, notamment sur les parcelles qui ont du mal à ressuyer. Les pertes peuvent concerner des champs entiers. Les fortes humidités matinales favorisent le maintien de la maladie dans les cultures.

Évaluation du risque : Risque maximal

Méthodes prophylactiques :

- Utiliser des variétés résistantes septoriose
- Limiter l'humidité au niveau des plants en évitant notamment d'irriguer en fin de journée
- Eviter les excès d'azote
- Respecter les rotations de culture
- Eviter la circulation d'animaux dans les cultures (chiens...) ou de personnes. Les zones de contaminations suivent les marques de passages par dissémination des spores des zones contaminées vers les zones saines.



Septoriose sur céleri
Photo CA66

• **Mouche du Céleri** (*Euleia heraclei*)

Aussi bien dans le Languedoc que dans le Roussillon, les attaques de mouches sont assez faibles en raison des conditions climatiques fraîches

Évaluation du risque : Risque stable faible



Techniques alternatives :

- Mise en place de panneaux englués jaunes pour suivre les vols et faire un peu de piégeage
- La mise en place de filet anti-insectes est efficace mais il favorise une plus forte hygrométrie et donc les maladies fongiques comme la septoriose.



Galerie mouche du Céleri – Photo Centrex



Dégâts mouche du Céleri – Photo CA30

• **Pucerons** (plusieurs espèces)

Aussi bien dans le Languedoc que dans le Roussillon, la pression puceron est en forte diminution, les conditions climatiques actuelles froides ne sont pas favorables aux populations

Évaluation du risque : Risque stable faible

Techniques alternatives :

- Eviter les excès de fertilisation azotée
- Planter des plantes attractives auxiliaires à proximité des parcelles

-L'utilisation de moyens de biocontrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.



Pucerons verts - Photo CA66



Pucerons – Photo CA30

• Sclerotinia (*Sclerotinia* sp.)

En particulier dans le Roussillon, les attaques de Sclerotinia sont en forte augmentation en raison des pluies des semaines passées et des entrées maritimes, y compris sur de jeunes plantations.

Évaluation du risque : Risque en forte augmentation

Méthodes prophylactiques :

- Limiter l'humidité au niveau des plants en évitant notamment d'irriguer en fin de journée
- Eviter les excès d'azote
- Respecter les rotations de culture

Techniques alternatives :

L'utilisation de moyens de biocontrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.



Sclerotinia sur céleri
Photo Centrex

• Limaces et escargots (Plusieurs espèces)

En particulier dans le Roussillon, la présence des limaces et escargots est en augmentation, les conditions climatiques sont favorables

Évaluation du risque : Risque en augmentation

Techniques alternatives :

L'utilisation de moyens de biocontrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.

SALADES – LAITUE - SCAROLE

- **Stade des cultures :** Plantation - croissance - récolte
- **Noctuelles défoliatrices** (Plusieurs espèces)

Aussi bien dans le Languedoc que dans le Roussillon, nous observons ponctuellement quelques attaques de chenilles défoliatrices sur les salades sous abris. Les dégâts restent faibles

Évaluation du risque : Risque stable faible



Techniques alternatives :

- L'utilisation de moyens de biocontrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.



Noctuelle – Photo CA30

• **Limaces et escargots** (Plusieurs espèces)

Aussi bien dans le Languedoc que dans le Roussillon, les pluies et les humidités matinales favorisent les attaques de limaces et d'escargots sur les cultures de salades sous abris et en plein champ.

Évaluation du risque : Risque stable moyen



Techniques alternatives :

L'utilisation de moyens de biocontrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.



Limace - Photo CIVAM BIO 66

• **Pucerons** (plusieurs espèces)

Aussi bien dans le Languedoc que dans le Roussillon, les attaques pucerons sont plutôt faibles. Quelques foyers sont observés au stade récolte, notamment en agriculture biologique

Évaluation du risque : Risque stable faible



Techniques alternatives :

- L'utilisation de moyens de biocontrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.
- Eviter les excès de fertilisation azotée
- Utiliser des variétés tolérantes
- Des lâchers d'auxiliaires sont possibles
- Utiliser des plantes relais pour favoriser la faune auxiliaire



Pucerons - Photo CA30

• **Sclerotinia** (*Sclerotinia* sp) et **Botrytis** (*Botrytis* sp.)

Aussi bien dans le Languedoc que dans le Roussillon, les conditions climatiques sont favorables au Sclerotinia et au Botrytis sur salade en plein champs et sous abri. Le sclerotinia peut atteindre jusqu'à 5% des plants, notamment en agriculture biologique. Les attaques sont en augmentation notamment dans le Gard, Hérault et PO.

Évaluation du risque : Risque en forte augmentation



Méthodes prophylactiques :

- Bien aérer les abris
- Arroser de préférence le matin par temps ensoleillé
- Utiliser des champignons antagonistes pour ensemercer le sol et limiter les risques
- Solariser en fin de saison

Techniques alternatives : L'utilisation de moyens de biocontrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien



Botrytis sur Chicorée – Photo CIVAM BIO 66



Botrytis sur laitue - Photo CA30

• Mildiou (*Bremia lactucae*)

Aussi bien dans le Languedoc que dans le Roussillon, les conditions climatiques actuelles sont favorables au mildiou. Bien surveiller les parcelles pour repérer les premiers signes (décoloration jaunes sur le dessus des feuilles délimitées par les nervures et feutrage blanc dessous).

A noter que les variétés avec des résistances complètes aux souches déclarées de mildiou ne sont pour le moment pas touchées. Et à l'inverse certaines parcelles, plantées avec des variétés n'ayant pas toutes les résistances *Bremia*, ont été totalement perdues.

Évaluation du risque : Risque en augmentation


Méthodes prophylactiques :

- Limiter l'humidité au niveau des plants, arroser de préférence le matin par temps ensoleillé
- Bien aérer les abris
- Utiliser des variétés avec les résistances complètes
- Planter des plants jeunes, éviter de les faire attendre au champ

Techniques alternatives : L'utilisation de moyens de biocontrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.



Bremia sur laitue – Photo CENTREX



Bremia sur laitue – Photo CA30

• Dégâts de lapins

En particulier dans le Languedoc notamment Gard et Hérault, nous observons d'importants dégâts de lapins

Évaluation du risque : Risque très important dans certains secteurs

Techniques alternatives : Mise en place de barrière physique notamment avec du grillage à poule, en enterrant bien la base pour éviter que les lapins ne passent dessous mais aussi des grillages électrifiés.



Protection grille à poules



Grille électrifié - Photos CA30

• Forficules

En zone arboricole, les forficules se logent au cœur des plantes. Ils souillent les salades avec leurs déjections et abiment les feuilles

Évaluation du risque : Risque en augmentation

Techniques alternatives :

- Limiter les excès d'humidité
- Arroser plutôt le matin
- Faire des rotations de cultures

• Oïdium (*Leveillula taurica*)

Particulièrement dans le Languedoc nous observons de l'oïdium sur certaines variétés de laitue, en particulier sous abris.

Des températures voisines de 26°C et des hygrométries de 70-80 % sont favorables à son extension, même si des infections peuvent tout de même avoir lieu à des températures comprises entre 10 et 33°C en présence d'hygrométries plus ou moins élevées. La combinaison de journées chaudes et sèches avec des nuits fraîches et humides favorise la maladie. La présence de rosée sur le feuillage joue un rôle aggravant (source Ephytia).



Oïdium - Photo CA30

Évaluation du risque : Risque stable

- Arroser de préférence le matin par temps ensoleillé
- **Techniques alternatives :** L'utilisation de moyens de biocontrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.



FENOUIL

Stade des cultures : Croissance - Récolte

- **limaces et escargots** (*Plusieurs espèces*)

Aussi bien dans le Languedoc que dans le Roussillon, le risque limaces et escargots est important en raison des humidités matinales et des pluies.

Évaluation du risque : Risque stable fort



Techniques alternatives

L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.



Limace - Photo CA30

- **Bactériose** (*Pectobacterium carotovorum*)

En particulier dans le Languedoc, dans les endroits humides et froids comme les bords de cours d'eau, nous observons de la pourriture bactérienne.

Évaluation du risque : Risque bien présent dans les secteurs concernés

Méthodes prophylactiques :

- *Bien aérer les abris*
- *Ne pas planter trop dense dans les zones à risque*
- *L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien*



Partie haute de la bactériose - Photo CA30

- **Pucerons** (*Plusieurs espèces*)

En particulier dans le Languedoc nous observons toujours la présence de quelques colonies de pucerons mais la pression est faible.

Évaluation du risque : Risque faible

Méthodes prophylactiques : L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien



Pucerons - Photo CA30

- **Sclerotinia** (*Sclerotinia sp.*)

En particulier dans le Roussillon, les attaques de Sclerotinia sont en augmentation en raison des conditions météorologiques fortement favorables.

Évaluation du risque : Risque en forte augmentation

Méthodes prophylactiques : L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien



Sclerotinia sur fenouil - Photo Centrex

EPINARD

- **Stade des cultures :** De la croissance à la récolte.

- **Mildiou** (*Peronospora farisonosa f. sp. spinaciae*)

En particulier dans le Languedoc, Nous observons toujours quelques dégâts de mildiou sur épinard sous abri. Les taches violacées sous le feuillage sont bien visibles le matin. Bien surveiller les parcelles.

Évaluation du risque : Risque bien présent

Techniques alternatives

- Bien aérer les abris pour éviter l'humidité
- Irriguer par temps ensoleillé, le matin afin de laisser les plants ressuyer
- Utiliser des variétés avec des tolérances au mildiou



Mildiou - Photo JEEM

PETIT POIS SOUS ABRI

- **Stade des cultures :** Croissance

- **Oïdium** (Plusieurs espèces)

Nous observons les premières taches d'oïdium sur petit pois d'abri en agriculture biologique.

Évaluation du risque : Risque en augmentation



Techniques alternatives :

L'utilisation de moyens de biocontrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.

Annexe – Notes nationales Biodiversité – BSV (cliquer sur les images)



Produits de Biocontrôle



Résistances aux pesticides

Prochain bulletin le 25 Février 2026

REPRODUCTION DU BULLETIN AUTORISÉE SEULEMENT DANS SON INTÉGRALITÉ (REPRODUCTION PARTIELLE INTERDITE)

Le bulletin de santé du végétal a été préparé par les animateurs filière maraîchage de la Chambre d'agriculture du Gard, CENTREX et SUDEXPE et a été élaboré sur la base des observations réalisées, tout au long de la campagne, par les Chambres d'agriculture de l'Hérault, du Gard et du Roussillon, Cathy Conseil, X. Dubreucq, OP Goût du Sud, la CAPL, JEEM, le CIVAM Bio 66.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La CRA d'Occitanie dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base des observations qu'ils auront réalisées et en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.

Avec le soutien financier de



Financé dans le cadre
de la stratégie **ecophyto**

