

Abonnez-vous
gratuitement
aux BSV de la région
Occitanie



A retenir

FRAISES

Pucerons : Risque en augmentation
Noctuelles : Risque en augmentation
Botrytis : Risque en augmentation
Dépérissement : Risque en augmentation
Oïdium : Risque en augmentation

ARTICHAUT

Oïdium (*Leveillula taurica*) : Risque stable faible
Oïdium (*Golovinomyces cichoracearum*) : Risque en très forte augmentation
Mildiou : Risque stable à surveiller
Pucerons : Risque stable faible à surveiller
Apion : risque stable faible
Rat taupiers : Risque stable sur parcelles concernées
Sclerotinia et maladies du collet : Risque en augmentation à surveiller
Gros gibier (ragondin, sanglier) : Risque en augmentation
Carence physiologique : Risque en augmentation

CHOUX (BROCOLI-CHINOIS-RAVE)

Limaces et escargots : Risque stable moyen
Alternaria : Risque stable
Mildiou et autres maladies du feuillage : Risque stable
Pucerons : Risque stable faible voir en diminution
Chenilles défoliatrices : Risque stable faible
Désordres physiologiques : Risque à surveiller

CELERI BRANCHE

Septoriose : Risque maximal
Mouche du céleri : Risque stable faible
Pucerons : Risque stable faible à surveiller
Sclerotinia : Risque stable fort
Limaces et escargots : Risque stable

SALADES LAITUE ET SCAROLE

Noctuelles défoliatrices : Risque stable faible
Limaces et escargots : Risque stable moyen
Pucerons : Risque stable à surveiller
Sclerotinia et Botrytis : Risque en forte augmentation
Mildiou : Risque en augmentation
Forficules : Risque en augmentation
Oïdium : Risque en augmentation
Rat taupier : Risque stable sur parcelles concernées

FENOUIL BIO

Limaces et escargots : Risque stable
Sclerotinia : Risque en forte augmentation



Directeur de publication :

Denis CARRETIER
Président de la Chambre
Régionale d'Agriculture
d'Occitanie
BP 22107
31321 CASTANET
TOLOSAN Cx
Tel 05.61.75.26.00

Dépôt légal : à parution

Comité de validation :
CENTREX, Chambre
d'agriculture du Gard, DRAAF
Occitanie, SUDEXPE

écophyto
Réduire et améliorer l'utilisation des phytos

Action du plan Ecophyto pilotée
par les ministères en charge de
l'agriculture, de l'écologie, de la
santé et de la recherche, avec
l'appui technique et financier de
l'Office français de la Biodiversité

EPINARD

Mildiou : Risque bien présent
Rat taupier : Risque stable sur parcelles concernées
Pucerons : Risque faible à surveiller
Noctuelle : Risque moyen

PETIT POIS SOUS ABRIS

Oïdium : Risque en augmentation

OIGNON

Botrytis : Risque en augmentation

BLETTE

Cercosporiose : Risque faible à surveiller
Noctuelle : Risque faible à surveiller



Téléchargez la note en cliquant sur la vignette ou consultez-la depuis la page [Ecophytopic](#)



Consultez la note nationale Focus **abeilles – pollinisateurs – réglementation** en cliquant [ICI](#)

METEO

- **Prévisions pour la période du 25 février au 2 mars** (Source Météo France)

Département / Jour	Mer	Jeu	Vend	Sam	Dim	Lun
Gard						
Hérault						
Aude						
Pyrénées-Orientales						

La prévision annonce des journées couvertes avec de belles éclaircies potentielles de mercredi 25 février à dimanche 1^{er} mars. Le temps devrait devenir plus instable à partir de dimanche soir et lundi 2 mars, avec des risques d'averses. Les pluies pourraient se confirmer mardi 3 mars.
 Les températures sont douces, autour de 9-11 °C pour les minimales et 14-16 °C pour les maximales.

FRAISES SOUS ABRIS



A noter que des analyses ont été faites cet automne sur plusieurs lots de Trays plants de fraises et que du *Neopestalotiopsis* a été détecté. Des analyses faites par la DRAAF PACA en début d'année avaient permis d'identifier la présence d'au moins 2 espèces de *Neopestalotiopsis*, *Neopestalotiopsis hispanica* et *Neopestalotiopsis rosa-like*.

Du côté Occitanie, n'hésitez pas à contacter votre Chambre d'agriculture si jamais vous avez des plants suspects ou des problèmes de dépérissement sur vos cultures de fraises. Des analyses pourront être faites dans le cadre du BSV pour voir s'il s'agit de *Neopestalotiopsis* ou de *Phytophthora cactorum* et en cas de *Neopestalotiopsis* une analyse supplémentaire pourra être faite par la DRAAF. Vous trouverez avec ce BSV la [fiche Neopestalotiopsis](#) rédigée par la Chambre d'Agriculture du Vaucluse.


A noter que pour ceux qui ont eu du *Neopestalotiopsis* cette année et qui replantent dans les mêmes serres il est fortement conseillé de faire une désinfection des structures **avant** la mise en place des plants de fraisiers.

- **Stade des cultures : Plantation – reprise – début récolte pour les plus avancés**

En hors sol chauffés ou abris froids, notamment dans l'Hérault ou dans les Costières de Nîmes, les cultures les plus avancées sont au stade floraison – nouaison voir récolte pour les plus avancés.

En tunnel froid le nettoyage des Tray plants est terminé et pour les plus avancés dans la partie Costières les 1ers fruits tournants / rouges comme à arriver.

En plein champ, les plants de fraises sont en train de prendre des heures de froid, 873 h de froid en zone Costières de Nîmes (09 Février 2026, Source CTIFL) donc selon les variétés le nettoyage va pouvoir commencer et 546 h de froid dans la plaine du Roussillon (07 Février 2026, source CTIFL).



Bourdon en action – Photo CA30



Plantation plein champ



Multichapelle stade fruits tournants - Photos CA30

- **Pucerons (Plusieurs espèces)**

Nous observons toujours des pucerons (notamment du *chaetosyphon*) et les populations ont tendance à augmenter mais n'explorent pas. Bien surveiller les parcelles.

Évaluation du risque : Risque en augmentation



Techniques alternatives :

- Des produits de bio-contrôle existent. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.

Mesures prophylactiques :

Eviter les excès de fertilisation



Pucerons - Photo CA30

• **Noctuelles défoliatrices** (Plusieurs espèces)


Nous observons toujours de manière régulière quelques attaques de noctuelles défoliatrices avec la présence de quelques dégâts sur les feuilles et sur quelques fleurs. Ponctuellement les dégâts peuvent être importants.

Évaluation du risque : Risque en augmentation



Techniques alternatives :

- L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace. [Liste des produits de bio-contrôle](#). Contacter votre technicien.



Dégât sur fleur – Photo CA30

• **Botrytis** (*Botrytis cinerea*)

Avec les différentes périodes de pluie et aussi par manque d'aération lors des journées ensoleillées (peu nombreuses en ce moment), nous notons une augmentation de la présence de botrytis sur les feuilles et maintenant aussi sur fleurs..


Évaluation du risque : Risque en augmentation



Techniques alternatives : Des produits de bio-contrôle existent. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.

Mesures prophylactiques :

- Bien aérer les abris
- Bien nettoyer les plants



Botrytis - Photos CA30

• **Dépérissement**

Nous observons toujours quelques dépérissement avec des nécroses au niveau des cœurs mais aussi quelques symptômes sur feuilles peuvent faire penser à du *Neopestalotiopsis*.... À suivre et nous ferons des analyses si besoin

Évaluation du risque : Risque en augmentation

Mesures prophylactiques : Bien gérer les irrigations

Techniques alternatives : L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible. [Liste des produits de bio-contrôle](#) . Contacter votre technicien .



Neopestalotiopsis ???



Dépérissement – Photos CA30



• Oïdium (*Podosphaera macularis*)

Avec les différentes périodes de pluie et aussi par manque d'aération lors des journées ensoleillées (peu nombreuses en ce moment), nous notons une augmentation de la présence d'oïdium sur les feuilles et maintenant aussi sur les fruits.

Évaluation du risque : Risque en augmentation

Techniques alternatives : Des produits de bio-contrôle existent. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.

Mesures prophylactiques :

- Bien aérer les abris
- Bien nettoyer les plants



Oïdium - Photos CA30

ASPERGE



Culture pas encore paillée – Photo CA30

Stade des cultures : Les 1ères cultures ont commencé à être paillées mais les opérations sont rendues délicates à causes des pluies successives... les sols n'ont pas le temps de se ressuyer pour permettre le passage des tracteurs



Paillage des cultures – Photos CA30

• Désherbage

Il est à noter que pour le désherbage chimique de prélevé des adventices et des turions, la matière active Métribuzine a été arrêtée donc tous les produits qui en contenait ne sont plus autorisés depuis fin 2025.

Evaluation du risque : Risque important compte tenu des pluies



Techniques alternatives

- En asperges vertes, possibilité de mettre en place un paillage biodégradable noir, bien tendu avec environ 1-2 cm de terre dessus pour que les asperges puissent bien le percer sans faire la crosse.
- Sur adventices déjà levées, l'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace dans le cadre des « traitements généraux, désherbage des Cultures Installées (notamment en asperges vertes, à utiliser 1 mois avant récolte). Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien

ARTICHAUT

• Stade des cultures : Capitules taille mandarine à récolte– Données Roussillon

• Oïdium (*Leveillula taurica*)

L'oïdium, habituellement observé sur artichaut (*Leveillula taurica*) qui provoque des taches circulaire blanche sous le dessous des feuilles et remonte de la base de la plante vers le haut est très peu observé en ce moment. Quelques symptômes sont visibles sur les feuilles basses, mais n'ont pas progressé.

Evaluation du risque : Risque stable faible



Leveillula sur face inférieure d'une feuille d'artichaut– Photo Centrex



Techniques alternatives

L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.

• Oïdium (*Golovinomyces cichoracearum*)

L'oïdium qui attaque le haut des plantes (*Golovinomyces cichoracearum*), est bien présent sur les feuilles des tiges de capitule en cours de formation et jeunes pousses. Un mycelium blanc se développe à la surface de la face supérieur des feuilles. Les attaques sont en très fortes augmentation. Les symptômes se stabilisent, mais peuvent atteindre jusqu'à 100% des plants, notamment sur Green Queen. Bien surveiller les parcelles.

Evaluation du risque : Risque en très forte augmentation



Techniques alternatives

L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.



Golovinomyces cichoracearum : Forte attaque de sur feuilles autour des capitules (gauche), début symptôme par décoloration (milieu et droite)
– Photos Centrex

• Mildiou (*Bremia lactucae*)

Nous observons toujours des sporulations sur des taches qui étaient déjà présentes sur les plantes. Les symptômes ont peu évolué en raison des températures froides, mais les températures douces annoncées dans les jours qui viennent et l'influence de Sud-Est, amenant de l'humidité, pourraient augmenter le risque. La présence de mildiou est observée jusqu'à 20 % des pieds sur certaines parcelles de la variété Sambo. Bien surveiller les parcelles.

Évaluation du risque : Risque stable à surveiller



Techniques alternatives

- Eviter l'irrigation par aspersion
- Laisser ressuyer les sols et éviter les arrosages par temps humide
- Garder les inter-rangs, propres, sans adventices pour limiter l'excès d'humidité au niveau des feuilles de la base.
- L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.



Mildiou sur artichaut – Photo Centrex

• Pucerons (plusieurs espèces)

La pression pucerons verts et noirs est faible. Quelques rares pucerons verts ont été observés les semaines passées. Pour l'instant le risque est stable, faible, mais il menace d'augmenter rapidement avec le redoux. Bien surveiller les parcelles.

Évaluation du risque : Risque stable faible à surveiller

Techniques alternatives :

- Eviter les excès de fertilisation azotée
- Planter des plantes attractives auxiliaires à proximité des parcelles
- Repérer les fourmis qui peuvent être un indicateur de leur présence
- Favoriser la biodiversité par implantation d'un parcellaire diversifié



- L'utilisation de moyens de biocontrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.

• Apion (*Ceratapion carduorum*)

Nous observons la présence de quelques adultes en culture. Le risque qu'ils provoquent des dégâts en cette saison est faible. Par contre, les larves issues des pontes de l'automne pourront remonter sur les capitules. Les attaques de larves, sur certaines parcelles, mal protégées à l'automne, pas encore en fleur, peut atteindre jusqu'à 80 % des pieds. Bien surveiller les parcelles pour vérifier la présence des larves dans les tiges.

Évaluation du risque : Risque stable faible

• Rat taupier (*Arvicola amphibius*) :

Après 2 années de sécheresse pendant lesquelles le rat taupier avait fait peu de dégâts, les populations sont fortement remontées cette saison, provoquant des pertes de plants pouvant aller jusqu'à 20 % sur certaines parcelles. Il mange les racines des artichauts et le collet laissant un trou à la base des feuilles.

Évaluation du risque : Risque stable sur parcelles concernées

Techniques alternatives :

- Travailler le sol pour détruire les galeries
- Favoriser les rapaces (poteaux à rapaces)
- utiliser des pièges mécaniques



Dégâts de rat taupier sur artichaut
– Photo Centrex


• Sclerotinia (*Sclerotinia sclerotium*) et autres maladies du collet

Suite aux tempêtes, beaucoup de pieds ont été couchés ou cassés pouvant entraîner jusqu'à 10% de pieds perdus. Les blessures liées aux vents sont des portes d'entrée aux maladies. Nous notons la présence de *Sclerotinia* deci-delà, mais le risque menace d'augmenter en raison des blessures.

Évaluation du risque : Risque en augmentation à surveiller

Techniques alternatives :

- Limiter l'enherbement.



Sclerotinia sur artichaut
– Photo Centrex

• Gros gibiers : ragondin (*Myocastor coypus*), sanglier (*Sus scrofa*) :

À l'approche des récoltes, les attaques de sanglier et de ragondin se multiplient. Ils mangent les capitules et provoquent d'importantes pertes de récolte sur certains secteurs.

Évaluation du risque : Risque stable fort sur parcelles exposées

Techniques alternatives :

- Barrières anti sanglier
- Pièges légaux : contacter le lieutenant de l'association de chasse ou la fédération de chasse près de chez vous.



Traces passage sanglier sur artichaut
Photo CA66

• Carence physiologique :

Sur plusieurs parcelles, le jaunissement physiologique des feuilles s'accroît en raison de la montée des capitules et de défaut de fertilisation. Les risques de sous-alimentation des plantes est présent et peut provoquer des pertes de feuilles qui nuiront aux rendements. Les fortes pluies des semaines passées ont pu lessiver les sols et le vent à casser plusieurs étages de feuilles sur certains secteurs. Jusqu'à 10 %. Vérifier l'état des sols afin d'apporter les éléments nécessaires aux plantes. Dans les cas les plus extrêmes, le manque d'apports nutritifs peut engendrer des pertes de vigueur et sensibiliser les plantes aux maladies.

Évaluation du risque : Risque en augmentation

Techniques alternatives :

- Faites des tests nitrates au niveau du sol régulièrement pour ajuster les apports.

• Limaces et escargots

Sur certains secteurs, nous notons la présence de limaces et escargots. A surveiller

Évaluation du risque : Risque faible

Techniques alternatives :

- Limiter l'enherbement.
- L'utilisation de moyens de biocontrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.



CHOUX BROCOLI CHINOIS RAVE

• Stade des cultures : Récolte

• Limaces et escargots (Plusieurs espèces)

Les limaces et escargots sont toujours présents en culture, les humidités matinales sont favorables.

Évaluation du risque : Risque stable

Techniques alternatives :

L'utilisation de moyens de biocontrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.



Escargot - Photo CA30

• Alternaria (Alternaria sp.)

En particulier dans le Roussillon, l'Alternaria provoque beaucoup de dégâts et d'écarts de tri sur brocolis. Les conditions météorologiques instables des dernières semaines ont favorisé les symptômes.

Évaluation du risque : Risque stable

Techniques alternatives

Arroser le matin par temps ensoleillé

Eviter les excès de fertilisation azotée et d'eau

L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.



Alternaria sur chou - Photo Centrex

• Mildiou et autres maladies du feuillage

Nous observons quelques symptômes de mildiou en culture, surveiller les parcelles.

Évaluation du risque : Risque en stable



Techniques alternatives

Arroser le matin par temps ensoleillé

Eviter les excès de fertilisation azotée et d'eau

L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.



Mildiou - Photo CA30

• Chenilles défoliatrices (plusieurs espèces)

Ponctuellement, nous pouvons observer des traces de chenilles défoliatrices, mais leur activité est assez faible en période froide.

Évaluation du risque : Risque stable faible



Techniques alternatives :

- Surveiller les parcelles afin de détecter les plus jeunes stades larvaires

- L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible sur jeunes chenilles. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.



Dégât noctuelle - Photo CA30

• Pucerons (Plusieurs espèces)

Nous ne notons pas d'évolution des pucerons cette semaine, voir même des diminutions de populations sur plusieurs parcelles. Surveiller néanmoins les parcelles, car le redoux annoncé pourrait favoriser l'apparition de nouveaux foyers.

Évaluation du risque : Risque stable faible à surveiller



Techniques alternatives :

- Eviter les excès de fertilisation azotée

- Planter des plantes attractives auxiliaires à proximité des parcelles



Pucerons sur chou - Photo CIVAM BIO 66

• Désordres physiologiques

Sur chou chinois en particulier, nous notons la présence de pieds montés.

Évaluation du risque : Risque à surveiller

CELERI BRANCHE

• **Stade des cultures :** Reprise – croissance – Récolte

• **Septoriose (*Septoria apiicola*)**

En particulier dans le Roussillon, le risque Septoriose est très élevé, sur beaucoup de parcelles, la situation n'est pas maîtrisée impliquant des pertes de récoltes importantes. Le redoux et les influence de sud-Est annoncées dans les jours à venir augmentent le risque.

Évaluation du risque : Risque maximal

Méthodes prophylactiques :

- Utiliser des variétés résistantes septoriose
- Limiter l'humidité au niveau des plants en évitant notamment d'irriguer en fin de journée
- Eviter les excès d'azote
- Respecter les rotations de culture
- Eviter la circulation d'animaux dans les cultures (chiens...) ou de personnes. Les zones de contaminations suivent les marques de passages par dissémination des spores des zones contaminées vers les zones saines.



Septoriose sur céleri
Photo CA66

• Mouche du Céleri (*Euleia heraclei*)

Aussi bien dans le Languedoc que dans le Roussillon, les attaques de mouches sont assez faibles.

Évaluation du risque : Risque Stable faible



Techniques alternatives :

- Mise en place de panneaux englués jaunes pour suivre les vols et faire un peu de piégeage
- La mise en place de filet anti-insectes est efficace mais il favorise une plus forte hygrométrie et donc les maladies fongiques comme la septoriose.

• Pucerons (plusieurs espèces)

La pression puceron reste faible cette semaine, surveiller néanmoins les parcelles car le redoux pourrait favoriser le développement de colonies.

Évaluation du risque : Risque stable faible à surveiller



Techniques alternatives :

- Eviter les excès de fertilisation azotée
- Planter des plantes attractives auxiliaires à proximité des parcelles
- L'utilisation de moyens de biocontrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.



Pucerons verts - Photo
CA66

- **Sclerotinia** (*Sclerotinia* sp.)

En particulier dans le Roussillon, les attaques de Sclerotinia sont en forte augmentation en raison des pluies des semaines passées et des entrées maritimes, y compris sur de jeunes plantations.

Évaluation du risque : Risque stable fort

Méthodes prophylactiques :

- Limiter l'humidité au niveau des plants en évitant notamment d'irriguer en fin de journée
- Eviter les excès d'azote
- Respecter les rotations de culture

Techniques alternatives :

L'utilisation de moyens de biocontrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.



Sclerotinia sur céleri
Photo Centrex, CIVAM BIO 66

- **Limaces et escargots** (Plusieurs espèces)

La présence des limaces et escargots est stable

Évaluation du risque : Risque stable

Techniques alternatives :

L'utilisation de moyens de biocontrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.

SALADES – LAITUE - SCAROLE

- **Stade des cultures :** Croissance - récolte

- **Noctuelles défoliatrices** (Plusieurs espèces)

Nous observons ponctuellement quelques attaques de chenilles défoliatrices sur les salades sous abris. Les dégâts restent faibles, mais sont à surveiller en raison du redoux.

Évaluation du risque : Risque stable faible

Techniques alternatives :

- L'utilisation de moyens de biocontrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.



Noctuelle – Photo CA30

- **Limaces et escargots** (Plusieurs espèces)

Les humidités matinales favorisent les attaques de limaces et d'escargots sur les cultures de salades sous abris et en plein champ.

Évaluation du risque : Risque stable moyen

Techniques alternatives :

L'utilisation de moyens de biocontrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.



Limace - Photo CIVAM BIO

• **Pucerons** (*plusieurs espèces*)

Les attaques pucerons sont plutôt faibles, quelques foyers sont observés au stade récolte, jusqu'à 5 % de pieds atteints sur cultures de plein champ, le redoux pourrait favoriser leur retour.

Évaluation du risque : Risque stable à surveiller



Techniques alternatives :

- Eviter les excès de fertilisation azotée
- Utiliser des variétés tolérantes
- Des lâchers d'auxiliaires sont possibles
- Utiliser des plantes relais pour favoriser la faune auxiliaire
- L'utilisation de moyens de biocontrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.



Puceron - Photo CA30

• **Sclerotinia** (*Sclerotinia sp*) et **Botrytis** (*Botrytis sp.*)

Les conditions climatiques restent favorables au Sclerotinia et au Botrytis sur salade en plein champs et sous abri. Les symptômes sont en augmentation sur tous les secteurs à proximité de la récolte.

Évaluation du risque : Risque en forte augmentation



Méthodes prophylactiques :

- Bien aérer les abris
- Arroser de préférence le matin par temps ensoleillé
- Utiliser des champignons antagonistes pour ensemercer le sol et limiter les risques
- Solariser en fin de saison

Techniques alternatives : L'utilisation de moyens de biocontrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.



Botrytis sur chicorée- Photo CIVAM BIO

• **Mildiou** (*Bremia lactucae*)

Certaines parcelles, plantées avec des variétés, n'ayant pas toutes les résistances Bremia, ont été perdues en raison du mildiou. Le temps variable actuel, les pluies annoncées et les températures douces pourraient favoriser les symptômes. Bien surveiller les parcelles pour repérer les premiers signes (décoloration jaunes sur le dessus des feuilles délimitées par les nervures et feutrage blanc dessous).

Évaluation du risque : Risque stable à surveiller




Méthodes prophylactiques :

- Limiter l'humidité au niveau des plants, arroser de préférence le matin par temps ensoleillé
- Bien aérer les abris
- Utiliser des variétés avec les résistances complètes
- Ne pas laisser les planques de plants dans les abris, planter des plants jeunes

Techniques alternatives

L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.



Bremia sur laitue- Photo CENTREX

- **Oïdium (*Golovinomyces cichoracearum*)**

En particulier en Agriculture biologique, nous notons une augmentation des symptômes d'oïdium qui pourraient s'accroître avec le redoux

Évaluation du risque : Risque en augmentation à surveiller



Techniques alternatives

L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.

- **Forficules**

En zone arboricole, les forficules se logent au cœur des plantes. Ils souillent les salades avec leurs déjections et abiment les feuilles

Évaluation du risque : Risque en augmentation

- **Rat taupier (*Arvicola amphibius*) :**

Présence de ces nuisibles dans plusieurs exploitations gardoises, les dégâts sont stables sur les parcelles concernées.

Évaluation du risque : Risque stable sur parcelles concernées

Techniques alternatives :

- Travailler le sol pour détruire les galeries
- Favoriser les rapaces (poteaux à rapaces)
- utiliser des pièges mécaniques



Dégâts de rat taupier sur salade
– CA30

FENOUIL

Stade des cultures : Croissance - Récolte

- **limaces et escargots (Plusieurs espèces)**


Aussi bien dans le Languedoc que dans le Roussillon, le risque limaces et escargots est important en raison des humidités matinales et des pluies.

Évaluation du risque : Risque stable fort



Techniques alternatives

L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.



Limace - Photo CA30

- **Bactériose** (*Pectobacterium carotovorum*)

En particulier dans le Languedoc, dans les endroits humides et froids comme les bords de cours d'eau, nous observons de la pourriture bactérienne.

Évaluation du risque : Risque bien présent dans les secteurs concernés

Méthodes prophylactiques :

- Bien aérer les abris
- Ne pas planter trop dense dans les zones à risque
- L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien



Partie haute de la bactériose - Photo CA30

- **Pucerons** (Plusieurs espèces)

En particulier dans le Languedoc nous observons toujours la présence de quelques colonies de pucerons mais la pression est faible.

Évaluation du risque : Risque faible

Méthodes prophylactiques : L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien



Pucerons - Photo CA30

- **Sclerotinia** (*Sclerotinia sp.*)

Dans le Languedoc-Roussillon, les attaques de Sclerotinia sont en augmentation en raison des conditions météorologiques fortement favorables.

Évaluation du risque : Risque en forte augmentation

Méthodes prophylactiques : L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien



Sclerotinia sur fenouil - Photo Centrex

EPINARD

- **Stade des cultures :** De la croissance à la récolte.

- **Mildiou** (*Peronospora farisonosa f. sp. spinaciae*)

En particulier dans le Languedoc, Nous observons toujours quelques dégâts de mildiou sur épinard sous abri. Les taches violacées sous le feuillage sont bien visibles le matin. Bien surveiller les parcelles.

Évaluation du risque : Risque bien présent

Techniques alternatives

- Bien aérer les abris pour éviter l'humidité
- Irriguer par temps ensoleillé, le matin afin de laisser les plants ressuyer
- Utiliser des variétés avec des tolérances au mildiou



Mildiou - Photo JEEM

- **Rat taupier** (*Arvicola amphibius*) :

Présence de ces nuisibles dans plusieurs exploitations gardoises, les dégâts sont stables sur les parcelles concernées.

Évaluation du risque : Risque stable sur parcelles concernées

Techniques alternatives :

- Travailler le sol pour détruire les galeries
- Favoriser les rapaces (poteaux à rapaces)
- utiliser des pièges mécaniques



Dégâts de rat taupier sur épinard
– CA30

- **Pucerons** (*plusieurs espèces*)

Les attaques pucerons sont plutôt faibles, la présence d'auxiliaire permet de réguler la population de pucerons.



Momies de pucerons -Photo CA30



Œuf de syrphe- Photo CA30

Évaluation du risque : Risque faible à surveiller



Techniques alternatives :

- Éviter les excès de fertilisation azotée
- Utiliser des variétés tolérantes
- Des lâchers d'auxiliaires sont possibles
- Utiliser des plantes relais pour favoriser la faune auxiliaire
- L'utilisation de moyens de biocontrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.

- **Noctuelles défoliatrices** (*Plusieurs espèces*)

Nous observons ponctuellement quelques attaques de chenilles défoliatrices sur les épinards sous abris. Les dégâts restent faibles, mais sont à surveiller en raison du redoux.

Évaluation du risque : Risque moyen



Techniques alternatives :

- L'utilisation de moyens de biocontrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.



Dégât noctuelle – Photo CA30

PETIT POIS SOUS ABRI

- **Stade des cultures** : Croissance

- **Oïdium** (*Plusieurs espèces*)

En agriculture biologique sous abri, le risque Oïdium est en augmentation avec la remontée des températures.

Évaluation du risque : Risque en augmentation



Techniques alternatives :

L'utilisation de moyens de biocontrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.

OIGNON SOUS ABRI

- **Stade des cultures** : Croissance - récolte

- **Botrytis** (*Botrytis squamosa*)

Avec les différentes périodes de pluie et aussi par manque d'aération lors des journées ensoleillées (peu nombreuses en ce moment), nous notons une augmentation de la présence de botrytis sur les feuilles et maintenant aussi sur fleurs..


Évaluation du risque : Risque en augmentation



Techniques alternatives : Des produits de bio-contrôle existent. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.

Mesures prophylactiques :

- Bien aérer les abris
- Evacuer les plants atteints



Botrytis - Photos CA30

BLETTE SOUS ABRI

- **Stade des cultures :** Croissance - récolte

Cercosporiose (*Cercospora beticola*)

Dans le Languedoc, nous observons la présence de quelques tâches. Les conditions climatiques sont propices à son développement.

Évaluation du risque : Risque faible à surveiller



Techniques alternatives : Des produits de bio-contrôle existent. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.

Mesures prophylactiques :

- Bien aérer les abris
- Evacuer les plants atteints
- Réduire la densité de plantations



Cercosporiose - Photos CA30

Noctuelle (plusieurs espèces)

Dans le Languedoc, nous observons la présence de noctuelles dans la culture de blettes sous abris. Les conditions climatiques sont propices à son développement.

Évaluation du risque : Risque faible à surveiller



Techniques alternatives : Des produits de bio-contrôle existent. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.

Mesures prophylactiques :

- Eliminer les adventices

Annexe – Notes nationales Biodiversité – BSV (cliquer sur les images)



Produits de Biocontrôle



Résistances aux pesticides

Prochain bulletin le 11 Mars 2026

REPRODUCTION DU BULLETIN AUTORISÉE SEULEMENT DANS SON INTÉGRALITÉ (REPRODUCTION PARTIELLE INTERDITE)

Le bulletin de santé du végétal a été préparé par les animateurs filière maraîchage de la Chambre d'agriculture du Gard, CENTREX et SUDEXPE et a été élaboré sur la base des observations réalisées, tout au long de la campagne, par les Chambres d'agriculture de l'Hérault, du Gard et du Roussillon, Cathy Conseil, X. Dubreucq, OP Goût du Sud, la CAPL, JEEM, le CIVAM Bio 66.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La CRA d'Occitanie dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base des observations qu'ils auront réalisées et en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.

Avec le soutien financier de



Financé dans le cadre
de la stratégie **ecophyto**

