

Abonnez-vous
gratuitement
aux BSV de la région
Occitanie



A retenir

FRAISES

Pucerons : Risque en augmentation
Noctuelles : Risque en augmentation
Botrytis : Risque important
Dépérissement : Risque en augmentation
Oïdium : Risque en augmentation
Acariens : Risque faible mais en augmentation

ARTICHAUT

Oïdium (*Leveillula taurica*) : Risque en augmentation
Oïdium (*Golovinomyces cichoracearum*) : Risque en très forte augmentation
Mildiou : Risque en augmentation
Pucerons : Risque en augmentation
Chenilles défoliatrices et tordeuses : risque en augmentation
Botrytis : Risque en augmentation
Sclerotinia et maladies du collet : Risque en augmentation à surveiller
Gros gibier (ragondin, sanglier) : Risque stable fort sur parcelles exposées
Carence physiologique : Risque en augmentation

CELERI BRANCHE

Septoriose : Risque maximal
Sclerotinia : Risque stable fort
Limaces et escargots : Risque stable

SALADES LAITUE ET SCAROLE

Noctuelles défoliatrices : Risque en augmentation
Limaces et escargots : Risque stable moyen
Pucerons : Risque en augmentation
Sclerotinia et Botrytis : Risque en forte augmentation
Mildiou : Risque stable à surveiller
Oïdium : Risque en augmentation à surveiller
Forficules : Risque en augmentation

EPINARD

Mildiou : Risque bien présent
Pucerons : Risque faible à surveiller
Noctuelle : Risque en augmentation

OIGNON SOUS ABRIS

Botrytis : Risque important

POMME DE TERRE

Mildiou : Risque en augmentation



Directeur de publication :

Denis CARRETIER
Président de la Chambre
Régionale d'Agriculture
d'Occitanie
BP 22107
31321 CASTANET
TOLOSAN Cx
Tel 05.61.75.26.00

Dépôt légal : à parution

Comité de validation :
CENTREX, Chambre
d'agriculture du Gard, DRAAF
Occitanie, SUDEXPE

écophyto
Réduire et améliorer l'utilisation des phytos

Action du plan Ecophyto pilotée
par les ministères en charge de
l'agriculture, de l'écologie, de la
santé et de la recherche, avec
l'appui technique et financier de
l'Office français de la Biodiversité



Téléchargez la note en cliquant sur la vignette ou consultez-la depuis la page [Ecophytopic](#)



Consultez la note nationale Focus **abeilles – pollinisateurs** - réglementation en cliquant [ICI](#)

METEO

- **Prévisions pour la période du 11 au 16 mars** (Source Météo France)

Département / Jour	Mer	Jeu	Vend	Sam	Dim	Lun
Gard						
Hérault						
Aude						
Pyrénées-Orientales						

La prévision annonce un temps changeant : couvert à pluvieux mercredi 11 mars sous régime de vent marin, ensoleillé jeudi 12 et vendredi 13 sous régime de vents de nord puis de sud, avec de nouvelles averses potentielles en soirée. A partir de samedi 14, le temps devrait être plus clément, avec de belles éclaircies. Lundi 16 mars sera une belle journée ensoleillée, sauf dans l'ouest audois où des pluies seront possibles. Les températures sont fluctuantes, les nuits de jeudi à vendredi et de samedi à dimanche étant les plus froides (6-8 °C) ; les maximales restent stables, autour de 15-16 °C, en baisse durant le week-end. Elles remonteront lundi.

FRAISES SOUS ABRIS



A noter que des analyses ont été faites cet automne sur plusieurs lots de Trays plants de fraises et que du *Neopestalotiopsis* a été détecté. Des analyses faites par la DRAAF PACA en début d'année avaient permis d'identifier la présence d'au moins 2 espèces de *Neopestalotiopsis*, *Neopestalotiopsis hispanica* et *Neopestalotiopsis rosa-like*.

Du côté Occitanie, n'hésitez pas à contacter votre Chambre d'agriculture si jamais vous avez des plants suspects ou des problèmes de dépérissement sur vos cultures de fraises. Des analyses pourront être faites dans le cadre du BSV pour voir s'il s'agit de *Neopestalotiopsis* ou de *Phytophthora cactorum* et en cas de *Neopestalotiopsis* une analyse supplémentaire pourra être faite par la DRAAF. Vous trouverez avec ce BSV la [fiche Neopestalotiopsis](#) rédigée par la Chambre d'Agriculture du Vaucluse.

A noter que pour ceux qui ont eu du *Neopestalotiopsis* en 2025 et qui replantent dans les mêmes serres il est fortement conseillé de faire une désinfection des structures **avant** la mise en place des plants de fraisiers.


- **Stade des cultures :** Nettoyage des plants – reprise – début récolte pour les plus avancées

En hors sol chauffés ou abris froids, notamment dans l'Hérault ou dans les Costières de Nîmes, les cultures les plus avancées sont au stade récolte, les autres sont au stade grossissement des fruits – fruits blancs et fruits tournants.. Avec les conditions humides et couvertes, le pollen n'étant pas de bonne qualité, nous observons des fruits mal pollinisés.

En plein champ et dans les zones plutôt froides, les plants de fraisiers sont en train d'être nettoyés.



Récoltes sous abris - Photo CA30



Bourdon en action et fruit mal pollinisé – Photo CA30



Fruit mal pollinisé – Photo Gout du Sud



Nettoyage en plein champ, Avant / Après – Photos CA30

- **Pucerons (Plusieurs espèces)**

Nous observons toujours des pucerons et les populations ont tendance à augmenter mais n'explorent pas. Bien surveiller les parcelles.

Evaluation du risque : Risque en augmentation



Techniques alternatives :

- Des produits de bio-contrôle existent. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.

Mesures prophylactiques :

Eviter les excès de fertilisation



Pucerons - Photo Gout du Sud

• Noctuelles défoliatrices (Plusieurs espèces)

Nous observons toujours de manière régulière quelques attaques de noctuelles défoliatrices avec la présence de quelques dégâts sur les feuilles et sur quelques fleurs. Ponctuellement les dégâts peuvent être importants.

Évaluation du risque : Risque en augmentation



Techniques alternatives :

- L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace. [Liste des produits de bio-contrôle](#). Contacter votre technicien.



Dégât sur fleur – Photo CA30



Dégâts sur feuilles – Photo JEEM

• Botrytis (*Botrytis cinerea*)

Avec les différentes périodes de pluie et aussi par manque d'aération, nous notons toujours la présence de botrytis sur les feuilles et maintenant aussi sur fleurs et fruits.


Évaluation du risque : Risque stable important



Techniques alternatives : Des produits de bio-contrôle existent. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.

Mesures prophylactiques :

- Bien aérer les abris
- Bien nettoyer les plants



Botrytis - Photos CA30

• Dépérissement

Nous observons toujours quelques dépérissement avec des nécroses au niveau des cœurs mais aussi quelques symptômes sur feuilles peuvent faire penser à du *Neopestalotiopsis*... **des analyses sont en cours**... À suivre et nous ferons des analyses si besoin

Évaluation du risque : Risque en augmentation

Mesures prophylactiques : Bien gérer les irrigations

Techniques alternatives : L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible. [Liste des produits de bio-contrôle](#). Contacter votre technicien.



Neopestalotiopsis ???



Dépérissement – Photos CA30



• Oïdium (*Podosphaera macularis*)

Avec les différentes périodes de pluie et aussi par manque d'aération lors des journées ensoleillées (peu nombreuses en ce moment), nous notons une augmentation de la présence d'oïdium sur les feuilles et maintenant aussi sur les fruits.

Évaluation du risque : Risque en augmentation



Techniques alternatives : Des produits de bio-contrôle existent. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.

Mesures prophylactiques :

- Bien aérer les abris
- Bien nettoyer les plants



Oïdium - Photos Goût du Sud

• Acariens (*Tetranychus urticae*)

Nous commençons à avoir la présence d'acariens par endroits, notamment dans les entrées de serres, là où il y a de la poussière. Nous observons à la fois des formes mobiles et des œufs.

Évaluation du risque : Risque faible mais en augmentation



Techniques alternatives :

- L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.

- Compte tenu des conditions climatiques actuelles (humidité importante et températures pas très élevées), il est possible de faire des lâchers de *Phytoseiulus persimilis* qui a besoin d'humidité



Acariens formes mobiles et œufs – Photo CA30

*pour être efficace. A mettre notamment sur les 1ers foyers. Selon les contextes, possibilité de faire aussi des lâchers de *Neoseiulus californicus* qui est plus tolérant aux températures élevées et à la faible humidité que *Phytoseiulus persimilis**

ASPERGE

Stade des cultures : Les 1ères récoltes ont commencé notamment dans la partie Camargue.

Ensuite pour les autres cultures, elles continuent d'être paillées mais les opérations sont rendues délicates à causes des pluies successives... les sols n'ont pas le temps de se ressuyer pour permettre le passage des tracteurs.



Percée des
turions -
Sudexpé



Paillage des cultures – Photos CA30

• Désherbage

Il est à noter que pour le désherbage chimique de prélevé des adventices et des turions, la matière active Métribuzine a été arrêtée donc tous les produits qui en contenait ne sont plus autorisés depuis fin 2025.

Evaluation du risque : Risque important compte tenu des pluies



Techniques alternatives

- En asperges vertes, possibilité de mettre en place un paillage biodégradable noir, bien tendu avec environ 1-2 cm de terre dessus pour que les asperges puissent bien le percer sans faire la crosse.
- Sur adventices déjà levées, l'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace dans le cadre des « traitements généraux, désherbage des Cultures Installées (notamment en asperges vertes, à utiliser 1 mois avant récolte). Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien

MELON SOUS- ABRIS ET SOUS CHENILLES

- **Stade des cultures**

Début des plantations sous-abris et sous chenilles précoces. Les opérations sont rendues délicates à causes des pluies successives. Les sols n'ont pas le temps de se ressuyer pour permettre le passage des tracteurs



Culture de melon sous chenille - Photo SUDEXPE

ARTICHAUT

- **Stade des cultures** : Capitules taille mandarine à récolte– Données Roussillon

- **Oïdium (*Leveillula taurica*)**

L'oïdium, habituellement observé à la base des feuilles d'artichaut (*Leveillula taurica*) évolue peu sur les parcelles les mieux protégées, quelques taches se développent sur les feuilles de la base sur les parcelles les plus exposées, notamment de la variété Sambo.



Leveillula sur face inférieure d'une feuille d'artichaut– Photo Centrex

Evaluation du risque : Risque en augmentation

Techniques alternatives

L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.



- **Oïdium (*Golovinomyces cichoracearum*)**

L'oïdium qui attaque le haut des plantes (*Golovinomyces cichoracearum*), est en forte augmentation sur tous les secteurs, avec une pression élevée à l'approche de la récolte pouvant aller jusqu'à 90 % des plants atteints (variété Green Queen) contre 10 à 30% pour la variété Sambo. Un mycelium blanc se développe à la surface de la face supérieure des feuilles, et provoque ensuite des déformations et nécroses. Bien surveiller les parcelles.

Evaluation du risque : Risque en très forte augmentation

Techniques alternatives



L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.



Golovinomyces cichoracearum : Forte attaque de sur feuilles autour des capitules (gauche), début symptôme par décoloration (milieu et droite)
– Photos Centrex

• Mildiou (*Bremia lactucae*)

Nous notons des attaques de mildiou sur feuilles intermédiaires sur des parcelles très vigoureuses, avec sporulations abondantes (Variétés Green Queen et Sambo). Les conditions météorologiques sont favorables (fortes humidités) et le risque de propagation aux capitules est élevé. Bien surveiller les parcelles

Évaluation du risque : Risque en augmentation

Techniques alternatives

- Eviter l'irrigation par aspersion
- Laisser ressuyer les sols et éviter les arrosages par temps humide
- Garder les inter-rangs, propres, sans adventices pour limiter l'excès d'humidité au niveau des feuilles de la base.
- Limiter la vigueur des plantes
- L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.



Mildiou sur artichaut – Photo Centrex


• Pucerons (plusieurs espèces)

La pression pucerons verts et noirs est faible. Quelques individus sont observés sur capitules. Nous notons une forte présence d'auxiliaires en culture (Coccinelles, chrysope) qui régulent les premiers foyers. Bien surveiller les parcelles.

Évaluation du risque : Risque en augmentation

Techniques alternatives :

- Eviter les excès de fertilisation azotée
- Planter des plantes attractives auxiliaires à proximité des parcelles
- Repérer les fourmis qui peuvent être un indicateur de leur présence
- Favoriser la biodiversité par implantation d'un parcellaire diversifié
- L'utilisation de moyens de biocontrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.



Coccinelle sur feuille, œuf de chrysope sur capitule – Photos Centrex et CA66

• Chenilles défoliatrices et tordeuses (Plusieurs espèces)


Les larves de chenilles défoliatrices sont bien visibles en culture jusqu'au stade L3. Les populations augmentent. Bien surveiller les parcelles. Les tordeuses ont aussi fait leur apparition.

Évaluation du risque : Risque en augmentation



Techniques alternatives :

- Favoriser les oiseaux
- L'utilisation de moyens de biocontrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.



Larve de chenilles défoliatrices sur artichaut
– Photo Centrex

• Botrytis (*Botrytis cinerea*)

Les fortes humidités de ces derniers jours favorisent le risque de développement de botrytis et de bactérioses sur capitules. Bien surveiller les parcelles

Évaluation du risque : Risque en augmentation



Techniques alternatives :

- L'utilisation de moyens de biocontrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.


• Sclerotinia (*Sclerotinia sclerotiorum*) et autres maladies du collet

Les blessures liées aux vents sont des portes d'entrée aux maladies. Nous notons la présence de *Sclerotinia* en augmentation

Évaluation du risque : Risque en augmentation à surveiller

Techniques alternatives :

- Limiter l'enherbement.



Sclerotinia sur artichaut
– Photo Centrex

• Gros gibiers : ragondin (*Myocastor coypus*), sanglier (*Sus scrofa*) :

A l'approche des récoltes, les attaques de sanglier et de ragondin se multiplient. Ils mangent les capitules et provoquent d'importantes pertes de récolte sur certains secteurs.

Évaluation du risque : Risque stable fort sur parcelles exposées

Techniques alternatives :

- Barrières anti sanglier
- Pièges légaux : contacter le lieutenant de l'ouvetier ou la fédération de chasse près de chez vous.



Traces passage sanglier sur artichaut
Photo CA66

• Carence physiologique :

Sur plusieurs parcelles, le jaunissement physiologique des feuilles s'accroît en raison de la montée des capitules et de défaut de fertilisation. Les risques de sous-alimentation des plantes sont présents et peuvent provoquer des pertes de feuilles qui nuisent aux rendements. Les fortes pluies des semaines passées ont pu lessiver les sols et le vent a cassé plusieurs étages de feuilles sur certains secteurs. Jusqu'à 10 %. Vérifier l'état des sols afin d'apporter les éléments nécessaires

aux plantes. Dans les cas les plus extrêmes, le manque d'apports nutritifs peut engendrer des pertes de vigueur et sensibiliser les plantes aux maladies.

Évaluation du risque : Risque en augmentation

Techniques alternatives :

- Faites des tests nitrates au niveau du sol régulièrement pour ajuster les apports.

CELERI BRANCHE

- **Stade des cultures :** Reprise – croissance – Récolte

- **Septoriose** (*Septoria apiicola*)

En particulier dans le Roussillon, le risque Septoriose est maximal, les fortes humidités des derniers jours ont accentué les pertes au champ. La situation n'est pas maîtrisée avec beaucoup de pertes au champ.

Évaluation du risque : Risque maximal

Méthodes prophylactiques :

- Utiliser des variétés résistantes septoriose
- Limiter l'humidité au niveau des plants en évitant notamment d'irriguer en fin de journée
- Eviter les excès d'azote
- Respecter les rotations de culture
- Eviter la circulation d'animaux dans les cultures (chiens...) ou de personnes. Les zones de contaminations suivent les marques de passages par dissémination des spores des zones contaminées vers les zones saines.



Septoriose sur céleri
Photo CA66

- **Sclerotinia** (*Sclerotinia sp.*)

En particulier dans le Roussillon, les attaques de Sclerotinia sont en forte augmentation en raison des pluies des semaines passées et des entrées maritimes, y compris sur de jeunes plantations.

Évaluation du risque : Risque stable fort

Méthodes prophylactiques :

- Limiter l'humidité au niveau des plants en évitant notamment d'irriguer en fin de journée
- Eviter les excès d'azote
- Respecter les rotations de culture

Techniques alternatives :

L'utilisation de moyens de biocontrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.



Sclerotinia sur céleri
Photo Centrex, CIVAM BIO 66

- **Limaces et escargots** (Plusieurs espèces)

La présence des limaces et escargots est stable

Évaluation du risque : Risque stable

Techniques alternatives :

L'utilisation de moyens de biocontrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.

SALADES – LAITUE - SCAROLE

- **Stade des cultures** : Croissance - récolte

- **Noctuelles défoliatrices** (*Plusieurs espèces*)

Nous observons toujours ponctuellement quelques attaques de chenilles défoliatrices sur les salades sous abris. Les dégâts restent faibles, mais sont en augmentation.

Évaluation du risque : Risque en augmentation



Techniques alternatives :

- L'utilisation de moyens de biocontrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.



Noctuelle – Photo CA30

- **Limaces et escargots** (*Plusieurs espèces*)

Les humidités matinales favorisent les attaques de limaces et d'escargots sur les cultures de salades sous abris et en plein champ.

Évaluation du risque : Risque stable moyen



Techniques alternatives :

L'utilisation de moyens de biocontrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.



Limace - Photo CIVAM BIO

- **Pucerons** (*plusieurs espèces*)

Les attaques pucerons sont plutôt faibles (sauf dans quelques cas dans le Languedoc en Bio), mais les foyers sont en augmentation, notamment sur chicorées de plein champ

Évaluation du risque : Risque en augmentation



Techniques alternatives :

- Eviter les excès de fertilisation azotée
- Utiliser des variétés tolérantes
- Des lâchers d'auxiliaires sont possibles
- Utiliser des plantes relais pour favoriser la faune auxiliaire
- L'utilisation de moyens de biocontrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.



Pucerons - Photo CA30

- **Sclerotinia** (*Sclerotinia sp*) et **Botrytis** (*Botrytis sp.*)

Les conditions climatiques restent favorables au Sclerotinia et au Botrytis sur salade en plein champs et sous abri. Les symptômes sont en augmentation sur tous les secteurs à proximité de la récolte.

Évaluation du risque : Risque en forte augmentation

Méthodes prophylactiques :

- Bien aérer les abris



- Arroser de préférence le matin par temps ensoleillé
- Utiliser des champignons antagonistes pour ensemercer le sol et limiter les risques
- Solariser en fin de saison

Techniques alternatives : L'utilisation de moyens de biocontrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.



Botrytis sur chicorée- Photo CIVAM BIO



Botrytis sur laitue – Photo CA30

• **Mildiou (*Bremia lactucae*)**

Certaines parcelles, plantées avec des variétés, n'ayant pas toutes les résistances *Bremia*, ont été perdues en raison du mildiou. Le temps variable actuel, les pluies annoncées et les températures douces pourraient favoriser les symptômes. Bien surveiller les parcelles pour repérer les premiers signes (décoloration jaunes sur le dessus des feuilles délimitées par les nervures et feutrage blanc dessous).

Évaluation du risque : Risque stable à surveiller

Méthodes prophylactiques :

- Limiter l'humidité au niveau des plants, arroser de préférence le matin par temps ensoleillé
- Bien aérer les abris
- Utiliser des variétés avec les résistances complètes
- Ne pas laisser les planques de plants dans les abris, planter des plants jeunes

Techniques alternatives

L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.



Bremia sur laitue- Photo CENTREX



Bremia sur laitue face supérieure et face inférieure – Photos CA30

• **Oïdium (*Golovinomyces cichoracearum*)**

En particulier en Agriculture biologique, nous notons une augmentation des symptômes d'oïdium qui pourraient s'accroître avec le redoux

Évaluation du risque : Risque en augmentation à surveiller



Techniques alternatives

L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.



Oïdium - CA30

- **Forficules**

En zone arboricole, les forficules se logent au cœur des plantes. Ils souillent les salades avec leurs déjections et abiment les feuilles

Évaluation du risque : Risque en augmentation

EPINARD

- **Stade des cultures :** De la croissance à la récolte.

- **Mildiou** (*Peronospora farisonosa f. sp. spinaciae*)

En particulier dans le Languedoc, Nous observons toujours quelques dégâts de mildiou sur épinard sous abri. Les taches violacées sous le feuillage sont bien visibles le matin. Bien surveiller les parcelles.

Évaluation du risque : Risque bien présent

Techniques alternatives

- Bien aérer les abris pour éviter l'humidité
- Irriguer par temps ensoleillé, le matin afin de laisser les plants ressuyer
- Utiliser des variétés avec des tolérances au mildiou
- utiliser des pièges mécaniques



Mildiou - Photo JEEM

- **Pucerons** (plusieurs espèces)

Les attaques pucerons sont plutôt faibles, la présence d'auxiliaire permet de réguler la population de pucerons.

Évaluation du risque : Risque faible à surveiller

Techniques alternatives :

- Eviter les excès de fertilisation azotée
- Utiliser des variétés tolérantes
- Des lâchers d'auxiliaires sont possibles
- Utiliser des plantes relais pour favoriser la faune auxiliaire



- L'utilisation de moyens de biocontrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.



Momies de pucerons

Œuf de syrphe – Photos CA30

- **Noctuelles défoliatrices** (*Plusieurs espèces*)

Nous observons ponctuellement quelques attaques de chenilles défoliatrices sur les épinards sous abris. Les dégâts restent faibles, mais sont en augmentation avec le redoux et les conditions humides.

Évaluation du risque : Risque en augmentation



Techniques alternatives :

- L'utilisation de moyens de biocontrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.



Dégât noctuelle – Photo CA30

OIGNON SOUS ABRI

- **Stade des cultures :** Croissance - récolte

- **Botrytis** (*Botrytis squamosa*)

Avec les différentes périodes de pluie et aussi par manque d'aération lors des journées ensoleillées nous notons toujours la présence de botrytis sur les feuilles.

Évaluation du risque : Risque important



Techniques alternatives : Des produits de bio-contrôle existent. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.

Mesures prophylactiques :

- Bien aérer les abris



Botrytis - Photos CA30

POMME DE TERRE PRIMEUR SOUS ABRIS

- **Stade des cultures** : Croissance

- **Mildiou** (*Phytophthora infestans*)

En particuliers dans le Roussillon, pour l'instant les cultures sont saines mais les fortes pluies des jours passés sont favorables. Bien surveiller les parcelles

Évaluation du risque : Risque en augmentation



Techniques alternatives :

L'utilisation de moyens de biocontrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#) et contactez votre technicien.

Annexe – Notes nationales Biodiversité – BSV (cliquer sur les images)



Produits de Biocontrôle



Résistances aux pesticides

Prochain bulletin le 25 Mars 2026

REPRODUCTION DU BULLETIN AUTORISÉE SEULEMENT DANS SON INTÉGRALITÉ (REPRODUCTION PARTIELLE INTERDITE)

Le bulletin de santé du végétal a été préparé par les animateurs filière maraîchage de la Chambre d'agriculture du Gard, CENTREX et SUDEXPE et a été élaboré sur la base des observations réalisées, tout au long de la campagne, par les Chambres d'agriculture de l'Hérault, du Gard et du Roussillon, Cathy Conseil, X. Dubreucq, OP Goût du Sud, la CAPL, JEEM, le CIVAM Bio 66.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La CRA d'Occitanie dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base des observations qu'ils auront réalisées et en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.

Avec le soutien financier de



Financé dans le cadre
de la stratégie **ecophyto**

