

Abonnez-vous  
gratuitement  
aux BSV de la région  
Occitanie



Directeur de publication :

Denis CARRETIER  
Président de la Chambre  
Régionale d'Agriculture  
d'Occitanie  
BP 22107  
31321 CASTANET  
TOLOSAN Cx  
Tel 05.61.75.26.00

Dépôt légal : à parution

Comité de validation :  
Chambre d'agriculture du  
Gers, Chambre régionale  
d'Agriculture d'Occitanie,  
DRAAF Occitanie



Action pilotée par le Ministère  
chargé de l'agriculture et le  
ministère chargé de l'écologie,  
avec l'appui financier de  
l'Agence Française pour la  
Biodiversité, par les crédits  
issus de la redevance pour  
pollutions diffuses attribués au  
financement du plan Ecophyto.

## A RETENIR

|                          |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MILDIU</b>            |   | De nouvelles taches ont été observées. Le risque s'intensifie, des contaminations ont eu lieu lors des dernières précipitations et sont possibles au vu des conditions météorologiques annoncées. Soyez très vigilants à l'approche de la floraison. |
| <b>BLACK-ROT</b>         |   | Soyez vigilants, des contaminations ont eu lieu lors des dernières précipitations et sont possibles au vu des conditions météorologiques annoncées. Des taches sont visibles.                                                                        |
| <b>OIDIUM</b>            |  | Pas de symptômes visibles                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>VERS DE GRAPPE</b>    |                                                                                    | Le vol se termine. Les premiers glomérules ont été observés.                                                                                                                                                                                         |
| <b>FLAVESCENCE DOREE</b> |                                                                                    | Traitements obligatoires : T1 du 7 juin au 16 juin                                                                                                                                                                                                   |

Liste des mesures alternatives et prophylactiques en viticulture :

[Lien de téléchargement](#)



Résistances aux pesticides

Note commune résistance :

[Lien de téléchargement](#)

## METEO

### • Météo de ces derniers jours

| Station                   |     | lundi 12 mai 2025 | mardi 13 mai 2025 | mercredi 14 mai 2025 | jeudi 15 mai 2025 | vendredi 16 mai 2025 | samedi 17 mai 2025 | dimanche 18 mai 2025 | Cumul hebdomadaire | Cumul depuis maturité moyenne de la masse des œufs en Midi Pyrénées (26/04/25) |
|---------------------------|-----|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Beaumarchés (radar)       | 4   | 2,1               | 1,2               | 0,5                  | 0                 | 0                    | 0                  | 0                    | 7,8                | 81,9                                                                           |
| Bouzon Gellenave          | 0   | 0                 | 0                 | 0                    | 0                 | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                                                                              |
| Lelin (radar)             | 3   | 0,2               | 0                 | 2                    | 0                 | 0                    | 0                  | 0                    | 5,2                | 60,9                                                                           |
| Ste Christie (radar)      | 0,1 | 0,1               | 0                 | 1,3                  | 0                 | 0                    | 0                  | 0                    | 1,5                | 72,5                                                                           |
| Mauléon (radar)           | 0   | 0                 | 0                 | 4,5                  | 0                 | 0                    | 0                  | 0                    | 4,5                | 45,3                                                                           |
| Eauze (radar)             | 0   | 0,4               | 0,1               | 0,5                  | 0                 | 0                    | 0                  | 0                    | 1                  | 44,7                                                                           |
| Courrensan (radar)        | 0   | 0,8               | 0,2               | 0,6                  | 0                 | 0                    | 0                  | 0                    | 1,6                | 57                                                                             |
| Bezolles (radar)          | 0   | 0,5               | 0,1               | 1,9                  | 0                 | 0                    | 0                  | 0                    | 2,5                | 58,6                                                                           |
| Fleurance (radar)         | 0   | 0,2               | 0,1               | 4,8                  | 0                 | 0                    | 0                  | 0                    | 5,1                | 75,3                                                                           |
| Caussens (radar)          | 0   | 0,1               | 0                 | 4,1                  | 0                 | 0                    | 0                  | 0                    | 4,2                | 40,9                                                                           |
| Lagraulet du Gers (radar) | 0   | 0,4               | 0,2               | 3,3                  | 0                 | 0                    | 0                  | 0                    | 3,9                | 61,4                                                                           |
| Madiran (radar)           | 0,5 | 0,9               | 0,6               | 1,1                  | 0                 | 0                    | 0                  | 0                    | 3,1                | 119,9                                                                          |
| Moncaup (radar)           | 7,2 | 0,8               | 4,1               | 1,5                  | 0                 | 0                    | 0                  | 0                    | 13,6               | 93,9                                                                           |
| Viella (radar)            | 1,2 | 0,9               | 0                 | 0,4                  | 0                 | 0                    | 0                  | 0                    | 2,5                | 93,4                                                                           |

Figure 1 : Cumuls hebdomadaires des précipitations (Météo France)

La semaine dernière a été chaude, mais marquée par des pluies éparées. Les niveaux de pluies enregistrées sont très variables d'un secteur à l'autre. Les cumuls s'échelonnent de 1 à 13 mm.

### • Prévisions du 20 mai au 26 mai (Source Météo France)

| Date             | mar 20/05                                                                           | mer 21/05                                                                           | jeu 22/05                                                                           | ven 23/05                                                                             | sam 24/05                                                                             | dim 25/05                                                                             | lun 26/05                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Température (°C) | 12-22                                                                               | 11-22                                                                               | 12-21                                                                               | 10-23                                                                                 | 9-24                                                                                  | 9-24                                                                                  | 12-24                                                                                 |
| Pluie (mm)       | 4-10                                                                                | 0-3                                                                                 | 2-8                                                                                 | 0-7                                                                                   | 0-2                                                                                   | 0-6                                                                                   | 2-10                                                                                  |
|                  |  |  |  |  |  |  |  |

Les températures seront conformes aux normales de saison. Des pluies assez importantes sont prévues jusqu'à vendredi, après quoi la fin de semaine devrait être sèche.

## PHENOLOGIE

| Cépages    | Grappes séparées | Boutons floraux séparés | Début floraison |
|------------|------------------|-------------------------|-----------------|
| Chardonnay |                  |                         |                 |

|                    |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|
| Sauvignon          |  |  |  |
| Manseng            |  |  |  |
| Colombard          |  |  |  |
| Merlot             |  |  |  |
| Tannat             |  |  |  |
| Cabernet Sauvignon |  |  |  |
| Ugni blanc         |  |  |  |

|                   |  |                   |  |  |
|-------------------|--|-------------------|--|--|
| Stade Majoritaire |  | Stade Minoritaire |  |  |
|-------------------|--|-------------------|--|--|

|                       |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |  |  |  |
| Stades BBCH           | 55                                                                                 | 57                                                                                  | 61                                                                                   |
| Descriptif des stades | Grappes séparées – boutons floraux encore agglomérés                               | Boutons floraux séparés                                                             | Début floraison                                                                      |

Photos : Syndicat du Chasselas de MOISSAC

Pour un même cépage, le contexte global peut faire varier les stades de façon significative : nature du sol, orientation de la parcelle, porte greffe, date de la taille, etc.

# MILDIU (*PLASMOPARA VITICOLA*)

## • Modélisation (Potentiel système)

### Situation au 18 mai :

La pression reste forte sur tous les secteurs. Des contaminations épidémiques de moyenne à forte intensité (fonction du niveau de pression modélisé) ont pu avoir lieu dès cumul nécessaire atteint. Les contaminations de fin avril devraient être visibles depuis le courant de la semaine selon le modèle.

### Simulation au 25 mai :

Le niveau de risque continue à progresser à J+7, la pression restera forte sur tous les secteurs. Le cumul nécessaire pour entraîner des contaminations **épidémiques** est de 2mm. Les extériorisations des contaminations ayant pu avoir lieu début mai sont modélisées en fin de semaine. Les extériorisations des contaminations modélisées par la suite sont prévues au fur et à mesure des jours, avec un temps d'incubation modélisé d'environ 16 jours pour les plus récentes.



Figure 2 : Mildiou sur feuille – Crédit photo : Syndicat Chasselas de MOISSAC

## • Situation au vignoble

De nouvelles taches ont été observées sur feuilles en de nombreux secteurs.

**Évaluation du risque :** Le risque est fort, soyez très vigilants. Des contaminations primaires et des repiquages ont eu lieu lors des dernières pluies. Au regard des prévisions météo, sur la majorité des secteurs une pluie de 2 mm peut entraîner des contaminations épidémiques.


### Techniques alternatives :



L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle [en cliquant ICI](#).



### Produits de Biocontrôle



Les histogrammes positifs indiquent la pluviométrie moyenne enregistrée sur le secteur et son impact en termes de contaminations Mildiou.

Les histogrammes négatifs rappellent la hauteur de la pluie et la date correspond à la sortie des symptômes liée à cette pluie (date théorique à droite du trait rouge ou réelle à gauche de ce trait). Une croix sur ces sorties indique que la sortie théorique n'a pas été observée au vignoble, le signe √ indique une observation de ces symptômes.

# BLACK ROT (GUIGNARDIA BIDWELLII)

- **Éléments de biologie**

[ephytia.inra - Biologie-epidemiologie du Black Rot](http://ephytia.inra.fr/Biologie-epidemiologie-du-Black-Rot)

- **Situation au vignoble**

De nouvelles contaminations ont eu lieu lors des dernières précipitations. Des symptômes en lien avec les pluies du mois d'avril sont déjà visibles sur de nombreuses parcelles et de forte intensité sur les parcelles historiques.

**Évaluation du risque** : Le risque est présent. Soyez vigilants aux risques de pluies.



Figure 3 : Symptôme de Black Rot sur feuille – Crédit photo : Syndicat du Chasselas



## Ne pas confondre

A cette période, des symptômes de brûlure du feuillage liés à la dérive de produits d'épamprage peuvent apparaître. Afin de confirmer de manière formelle un symptôme de black-rot, il faut attendre l'apparition des pycnides (petits points noirs) à la surface des taches soit en laissant la feuille au champ, soit en la mettant en chambre humide.



De gauche à droite : 1-Taches de black-rot sur feuilles (Photo Ephytia) –  
2-Phytotoxicité d'épamprage chimique (Photo CA81)  
3-Dégâts de dés herbant (Photo CA82)

# OÏDIUM (*Erysiphe necator*)

## • Éléments de biologie

Suivre ce lien : [ephytia.inrae.fr-Biologie-epidemiologie de l'oïdium](https://ephytia.inrae.fr/biologie-epidemiologie-de-loïdium)

Même pour les cépages peu sensible la période de sensibilité démarre au stade boutons floraux séparés.

Ce champignon ne nécessite pas d'eau liquide pour germer et se développer, il peut même être lessivé par des pluies abondantes. Cependant les humidités relatives élevées lui sont favorables ; son développement requiert une hygrométrie élevée et une faible luminosité. C'est pourquoi, il affectionne les vignes vigoureuses dans lesquelles la lumière pénètre moins bien.

## • Situation au vignoble

Aucun symptôme visible pour le moment.

**Évaluation du risque** : Les pluies abondantes ne sont pas favorables à l'oïdium. Mais passé l'épisode orageux, le risque sera présent dans toutes les situations. Le stade boutons floraux séparés est atteint sur la majorité des cépages, soyez vigilants jusqu'à fermeture de grappe.



Figure 4 : Oïdium sur feuilles : jeune pousse de vigne montrant un symptôme très caractéristique de drapeau. Crédit photo : Euphytia-INRAE

### Techniques alternatives :

B

L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle [en cliquant ICI](#).

B

Produits de Biocontrôle



# VERS DE LA GRAPPE (*Lobesia botrana*)

## • Éléments de biologie

Deux espèces de vers de la grappe sont présentes dans notre vignoble : L'Eudémis (*Lobesia botrana*) et la Cochyliis (*Eupoecilia ambiguella*).

Eudémis est l'espèce la plus représentée, tandis que Cochyliis, dont les œufs et les jeunes larves supportent très mal les hygrométries inférieures à 60-70 %, est un peu moins visible chez nous.

L'activité des papillons d'Eudémis est crépusculaire. La femelle attire le mâle en diffusant des médiateurs chimiques : les phéromones. L'accouplement et les pontes se déroulent donc en début de nuit à partir de 12°C, seulement 24 heures après l'émergence de la femelle. Celle-ci peut s'accoupler une dizaine de fois et pondre jusqu'à 100 œufs si la pluie et le vent ne viennent pas les perturber.




Figure 3 : Cycle biologique d'Eudémis. Crédit photo : Euphytia-INRAE

La durée d'incubation de l'œuf est de 5 à 15 jours en fonction de la température. Mais les œufs peuvent avorter en période de forte sécheresse et de température élevée.

La chenille d'Eudémis est très vivace. Elle a un corps longiligne jaune verdâtre avec une tête beige. La chenille de Cochyliis est plus apathique et possède un corps orange avec une tête noire. Les chenilles vont passer par 5 stades larvaires consécutifs. Les larves L1 sont de très petite taille (2 mm) en première et deuxième génération. La larve a un comportement dit « baladeur » pendant seulement 10 h. Elle pénètre très vite dans les boutons floraux en première génération. Au moment de floraison, les chenilles mangent les boutons floraux et les agglomèrent avec des fils de soie : les glomérules. En moyenne une larve constitue 2 glomérules.

La durée d'une génération (œuf à adulte) dépend de la température. Le cycle de la G1 d'Eudémis dure 2 mois, alors que les générations estivales durent un peu plus d'un mois. Trois à 4 générations se succèdent par saison (variable selon les années).

## • Modélisation (EVA)

Selon le modèle, le vol est terminé et le stade majoritaire est L3.

## • Situation au vignoble

Le vol se termine. Les premiers glomérules ont été observés.

**Évaluation du risque** : Dès l'apparition des glomérules, il est important de définir un niveau de pression de la deuxième génération, afin d'anticiper la pression de cette dernière.



Figure 4 : Glomérule de vers de grappe. Crédit photo : Syndicat du Chasselas

# ESCARGOTS

- **Éléments de biologie**

Les attaques en début de végétation peuvent engendrer un rabougrissement ou un ralentissement de la croissance végétative, voire une destruction complète du feuillage ou des rameaux dans les cas de très fortes attaques. C'est souvent le cas lors de printemps particulièrement pluvieux, où des populations localement très abondantes peuvent occasionner des dégâts ponctuellement sévères.

- **Situation vignoble :**

Les populations d'escargots sont toujours aussi importantes, surveillez vos parcelles.

**Évaluation du risque :** Les pluies régulières favorisent le développement des escargots, mais le risque se raisonne au cas par cas, en fonction des secteurs. L'observation doit être soignée tôt en saison, afin d'évaluer la pression de ce ravageur. La gestion du risque n'est plus envisageable à ce jour car dans la plupart des cas, les escargots sont déjà montés dans les souches. Restez attentifs à l'évolution des dégâts.

*Techniques alternatives :*



*L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle [en cliquant ICI](#).*



**Produits de Biocontrôle**

# CICADELLE DE LA FLAVESCENCE DOREE (*Scaphoidus Titanus*)

- **Protocole de surveillance**

Un dispositif de suivi des éclosions des oeufs est mis en place à l'IFV. Ce dispositif permet à la DRAAF de définir les dates réglementaires d'intervention (1 mois après les premières éclosions). Ces résultats sont aussi validés par un suivi des larves sur le terrain. Une fois les dates définies, elles vous seront communiquées par les services de la DRAAF via le BS

- **Element de biologie**

Le T1 est généralement fixé 1 mois après les 1ères éclosions. Ce laps de temps permet aux larves d'éclore en plus grand nombre mais il correspond aussi au temps d'incubation du phytoplasme avant que la cicadelle ne devienne infectieuse.

- **Situation dans les parcelles**

1er larve en cage d'émergence dans le Tarn le 5 mai. Première larve observée le 12 mai dans le vignoble gersois.

**Évaluation du risque** : Les dates d'intervention ont été fixées par la DRAAF :

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>T1</b>                                                                                             | <b>du 7 juin au 16 juin</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>A venir</b>       |
| <b>T2</b>                                                                                             | <b>en conventionnel</b> : 15 jours après le T1 soit du 22 juin au 1 juillet<br><b>en AB</b> : 10 jours après le T1 soit du 17 juin au 28 juin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Prochainement</b> |
| <b>T3</b>                                                                                             | <p><b>Le T3 n'est obligatoire que sur les parcelles de vigne-mère ou les vignes des communes suivantes : Auch, Castillon Debats, Eauze, Gondrin, <u>Lannepax</u>, Lectoure, Montréal, Mouchan, Preignan</b></p> <p><b>Dans les autres cas, il est optionnel, selon l'analyse du risque.</b> Il est conseillé dans les cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- présence de foyers dans l'environnement des parcelles</li> <li>- présence de friches de vigne dans l'environnement des parcelles</li> <li>- présence de pieds FD dans la parcelle</li> </ul> | <b>Prochainement</b> |
| L'arrêté préfectoral est publié sur le site de la DRAAF, retrouvez-le en cliquant <a href="#">ICI</a> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |

# CICADELLE VERTE (*Empoasca vitis*)

## • Situation au vignoble

Les premières larves sont visibles. Le seuil de nuisibilité est atteint dans certains cas.

**Évaluation du risque : Le risque est nul à ce stade**, mais restez vigilant sur les secteurs historiques. Plus tard, au début de l'été, la gestion du ravageur reposera sur une surveillance des populations larvaires. Ce ne sont pas les adultes mais les larves qui sont à l'origine des dégâts de grillure.

**Seuil indicatif de risque : 100 larves de cicadelle pour 100 feuilles**

**Techniques alternatives :** Des solutions de biocontrôle existent. Elles sont à appliquer sur des larves jeunes ou de manière « préventive ». Par exemple, l'application d'argile comme barrière physique ; Consultez la liste des produits de bio-contrôle [en cliquant ICI](#).



Larve de cicadelle des grillures- Crédit photo EUPHYTIA

## Annexe – Notes nationales Biodiversité – BSV (cliquer sur les images)



Produits de Biocontrôle



Résistances aux pesticides

**Prochain BSV, le 27 mai 2025**

### REPRODUCTION DU BULLETIN AUTORISÉE SEULEMENT DANS SON INTÉGRALITÉ (REPRODUCTION PARTIELLE INTERDITE)

Ce bulletin de santé du végétal a été préparé par l'animateur filière viticulture de la Chambre d'Agriculture du Tarn et élaboré sur la base des observations réalisées par la Chambre d'Agriculture du Gers, Les Hauts de Montrouge, les Ets Ladevèze, OGR, les Producteurs Plaimont, la SICA Altema, Val de Gascogne, le Groupe Vivadour, VitiVista, l'EVV et les agriculteurs observateurs.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La CRA d'Occitanie dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base des observations qu'ils auront réalisées et en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.

# LISTE DES MESURES ALTERNATIVES ET PROPHYLACTIQUES EN VITICULTURE

Cette liste n'est pas exhaustive. Le choix du matériel végétal peut être un élément à prendre en considération pour limiter la vigueur de la vigne. Mais il ne figure pas dans cette liste car celle-ci se veut applicable à tous les objectifs de rendement.

| Bio-agresseurs                                    | Techniques alternatives et prophylaxie                                                                             | Objectifs                                                                                         |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mildiou</b>                                    | Drainage du sol                                                                                                    | Limiter les flaques réduit les possibilités de formation de foyers primaires                      |
|                                                   | Enherbement, travail du sol, épamprage                                                                             | Diminuer le développement d'organes verts à proximité du sol                                      |
|                                                   | Travail du sol (avant risque mildiou élevé)                                                                        | Détruire les plantules issues des semis de pépins                                                 |
|                                                   | Ebourgeonnage, effeuillage                                                                                         | Limiter les entassements de végétation pour réduire la durée d'humectation des grappes            |
| <b>Oïdium</b>                                     | Ebourgeonnage, effeuillage                                                                                         | Favoriser l'insolation et l'aération des grappes car l'oïdium est sensible aux UV                 |
|                                                   | Maîtrise de la fertilisation azotée et enherbement                                                                 | Réduire la vigueur                                                                                |
| <b>Black-rot</b>                                  | Destruction des bois de taille, élimination des vieux bois et des baies momifiées                                  | Limiter la source d'inoculum                                                                      |
|                                                   | Ebourgeonnage, effeuillage                                                                                         | Limiter les entassements de végétation pour réduire la durée d'humectation du feuillage           |
| <b>Pourriture grise et acide</b>                  | Drainage du sol                                                                                                    | Limiter les « mouillères »                                                                        |
|                                                   | Maîtrise de la fertilisation azotée, enherbement                                                                   | Réduire la vigueur                                                                                |
|                                                   | Ebourgeonnage, effeuillage                                                                                         | Limiter les entassements de végétation et aérer les grappes pour réduire les durées d'humectation |
|                                                   | Maîtrise des vers de grappes et de l'oïdium                                                                        | Limiter les risques de porte d'entrée pour le champignon                                          |
| <b>ESCA/BDA / Eutypiose</b>                       | Taille le plus possible respectueuse des circuits de sève                                                          | Diminuer l'impact des maladies du bois                                                            |
|                                                   | Absence de coupe rase sur les têtes de souches                                                                     | Éviter de créer de trop grandes plaies de taille offrant des portes d'entrée aux champignons      |
|                                                   | Taille au plus près du débourrement (Eutypiose)                                                                    | Se protéger des contaminations                                                                    |
| <b>Court-noué</b>                                 | Arrachage soigné des parcelles (enlever toutes les racines)                                                        | Compléter la lutte en privant les nématodes de nourriture avant l'enkystement hivernal            |
|                                                   | Repos du sol entre deux plantations (durée de 5 ans minimum fortement conseillée)                                  | Limiter la recontamination par le virus court-noué                                                |
| <b>Pourridié</b>                                  | Drainage du sol                                                                                                    | Limiter le développement du pourridié                                                             |
| <b>Cicadelle verte</b>                            | Poudrages d'argiles calcinées                                                                                      | Créer une barrière physique empêchant la reconnaissance du végétal par l'insecte                  |
| <b>Cicadelle vectrice de la flavescence dorée</b> | Destruction des ceps atteints de jaunisse, des repousses de porte-greffes et des vignes abandonnées et ensauvagées | Compléments indispensables à la lutte contre la flavescence dorée                                 |
|                                                   | Epamprage soigné avant intervention phytosanitaire obligatoire                                                     | Limiter les réservoirs de populations dans les pampres qui resteraient à l'abri des traitements   |
| <b>Tordeuses</b>                                  | Confusion sexuelle                                                                                                 | Empêcher la reproduction des papillons et donc les perforations occasionnées par les larves       |
| <b>Acariens/ Thrips</b>                           | Préservation des populations d'auxiliaires ou lâchers inoculatifs de phytoséides (Ex : typhlodromes)               | Maintenir une régulation des ravageurs par leurs prédateurs naturels                              |
| <b>Metcalfa pruinosa</b>                          | Lâchers de <i>Neodryinus typhlocybae</i> (prédateur de <i>Metcalfa pruinosa</i> )                                  | Installer une population suffisamment importante de prédateurs                                    |

Document rédigé en collaboration avec les partenaires du réseau SBT membres des comités de validation : les Chambres d'Agriculture de l'Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, du Tarn et du Tarn-et Garonne, la Cave de Valady, SODEPAC, le Syndicat AOC Cahors, Vinotalie (Côtes d'Olt, Fronton et Rabastens).





# NOTE TECHNIQUE COMMUNE RESISTANCES 2025

## MALADIES DE LA VIGNE : MILDIOU, OÏDIUM, POURRITURE GRISE, BLACK-ROT

date de diffusion : 8 janvier 2025

### Comité de rédaction

Il est constitué d'experts des structures suivantes :

- **IFV** : Institut français de la vigne et du vin
- **Anses-CASPER** : Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail - Unité Caractérisation et suivi des phénomènes d'évolution des résistances aux produits de protection des plantes
- **INRAE** : Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement
- **CIVC** : Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (Comité Champagne)
- **Chambres d'agriculture**
- **DGAL-SDSPV** : Direction générale de l'alimentation – Sous-direction de la santé et de la protection des végétaux du Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire.

### Objectifs de la note technique commune

Ce document vise à :

- 1) décrire le statut des résistances en 2024 vis-à-vis des principales familles de substances actives utilisables sur vigne en France dans les populations de *Plasmopara viticola* (agent du mildiou), *Erysiphe necator* (agent de l'oïdium de la vigne), *Botrytis cinerea* (agent de la pourriture grise),
- 2) établir des recommandations générales vis-à-vis de ces résistances pour préserver dans la durée les modes d'action et l'efficacité des programmes de protection, en complément de la mise en œuvre des autres méthodes de lutte.

Connaître la robustesse de chaque mode d'action, et *in fine* de chaque spécialité, permet de construire des programmes de protection efficaces, durables, tout en limitant les applications de fongicides.

### Sources d'information

Les recommandations rédigées ci-dessous se basent d'une part sur la connaissance du statut des résistances dans les populations (occurrence et/ou fréquence des résistances, vignobles concernés, pertes d'efficacité éventuelles mises en évidence dans les essais ou au vignoble) et d'autre part sur la connaissance des mécanismes de résistance et les phénotypes des souches résistantes (niveau de résistance, spectre de résistance croisée, fitness notamment).

Ces différentes informations sont issues :

- des résultats du **plan de surveillance national** de la résistance aux produits phytopharmaceutiques. Ce plan de surveillance, piloté par la DGAL-SDSPV<sup>1</sup>, participe au suivi des effets non intentionnels des pratiques agricoles de l'axe 1 (surveillance biologique du territoire) du plan ECOPHYTO II. Les analyses sont réalisées par le laboratoire de l'Unité CASPER de l'Anses de Lyon, et des laboratoires INRAE ;
- des résultats d'**autres plans de surveillance**, comme celui du Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, du Conseil Interprofessionnel des Vins de Bordeaux en lien avec l'IFV, des Chambres d'agriculture de Bourgogne et de Gironde, d'Agrosolutions ou ceux réalisés par des sociétés phytopharmaceutiques ;
- des données issues d'**essais d'efficacité sur le terrain**, en particulier ceux menés en situation de résistance et respectant les conditions de mise en œuvre des protocoles d'expérimentation dédiés à l'évaluation de l'efficacité résiduelle des substances en situation de résistance<sup>2</sup>. Ces données sont en général fournies par les sociétés phytopharmaceutiques et les instituts techniques ;
- de la **littérature scientifique** sur les cas de résistance décrits dans cette note ou pour d'autres organismes phytopathogènes.

L'ensemble de ces informations contribue à la connaissance globale des cas de résistance décrits dans cette note. Une alerte est formulée sur le risque de perte d'efficacité au vignoble lorsque l'occurrence et la fréquence de la résistance (si cette dernière donnée est connue) sont jugées moyennes à fortes. Cette alerte est modulée selon le phénotype résistant des individus et selon les contextes agronomiques et le risque épidémique.

### Substances actives, modes d'action et classification

Cette note liste toutes les substances actives qui entrent dans la composition des produits autorisés au moment de sa rédaction pour protéger la vigne contre le mildiou, l'oïdium, la pourriture grise et le black rot. Les recommandations indiquées dans les tableaux visent prioritairement à prévenir et gérer spécifiquement les phénomènes de résistance, comme prérequis au maintien de l'efficacité sur le long terme. Selon les situations, il s'agit soit de limiter, voire de stopper la progression d'une résistance récemment détectée, soit d'optimiser l'efficacité au terrain des modes d'action pour les résistances largement établies. Il s'agit enfin de limiter ainsi l'impact négatif d'applications répétées de fongicides rendues moins efficaces, voire inutiles, à cause des phénomènes de résistance.

Chaque mode d'action est associé aux codes proposés (1) dans la classification unifiée du **réseau R4P** ([www.r4p-inra.fr/fr/](http://www.r4p-inra.fr/fr/) ; DOI [10.17605/OSF.IO/UBH5J](https://doi.org/10.17605/OSF.IO/UBH5J)), et (2) dans la classification du **FRAC** (codes mode d'action et code cible séparés par « / » ; <http://www.frac.info/>).

<sup>1</sup> Direction générale de l'alimentation-Sous-direction de la santé et de la protection des végétaux.

<sup>2</sup> notamment le Document technique n°27 (DT 27) de la Commission des essais biologiques de Végéphyll.

Dans chaque classification, des codes distincts indiquent des modes d'action distincts. Les stratégies anti-résistance reposent sur l'utilisation d'une diversité la plus large possible de substances actives (*i.e.* présentant des codes mode d'action différents), à la fois dans le temps de la campagne et dans l'espace du vignoble, pouvant être combinées (en association ou en alternance) dans les stratégies de gestion des résistances.

### **Prophylaxie et qualité de pulvérisation**

#### **Une nécessité pour améliorer la stratégie de protection en limitant les risques de résistance.**

Les conditions de réussite de la protection du vignoble vis-à-vis des maladies sont d'autant plus favorables que sa mise en œuvre est accompagnée **de mesures prophylactiques** et d'une **qualité de pulvérisation optimisée** qui viennent limiter le développement des maladies.

Ces mesures participent à limiter la taille des populations (diminuer l'intensité des épidémies) de champignons pathogènes et, de ce fait, **à raisonner le nombre de traitements utiles. Elles contribuent donc à moduler le risque d'évolution de résistance(s).**

**Pour l'ensemble des maladies, les mesures prophylactiques passent par :**

- **la limitation de la vigueur de la vigne** par le raisonnement, dès l'implantation, du choix d'un porte-greffe adapté, et éventuellement du cépage et du clone. Sur une vigne en production, la vigueur peut se maîtriser par la diminution des apports (notamment azotés) et par l'enherbement permanent (spontané ou maîtrisé). En fonction des possibilités techniques et de la diminution de vigueur recherchée, la largeur de la bande enherbée pourra être modulée ;
- **des rognages raisonnés et autres travaux en vert** pour éliminer la jeune végétation très sensible, favoriser une bonne aération au sein de la haie foliaire limitant la propagation des maladies et permettant une meilleure pénétration de la bouillie lors de la pulvérisation.

En ce qui concerne plus spécifiquement **le mildiou**, il convient en outre :

- **d'éviter la formation de mouillères** qui favorisent les excès d'eau ;
- **d'éliminer tous les rejets** (pampres à la base des souches, plantules issues de la germination de pépins...) qui favorisent l'installation des foyers primaires de mildiou et participent au démarrage précoce de l'épidémie.

En ce qui concerne plus spécifiquement **la pourriture grise**, **la prophylaxie doit s'appliquer, quel que soit le risque parcellaire**. En effet, en cas de risque faible, la prophylaxie rend souvent inutile l'application de traitements. Il convient de :

- **bien aérer les grappes** par une taille et un mode de palissage qui assurent leur répartition homogène. L'ébourgeonnage, le rognage, l'effeuillage précoce de la zone fructifère et, éventuellement, l'éclaircissage permettent d'éviter l'entassement de la végétation ;
- **limiter les blessures des baies** par une **maîtrise correcte des vers de la grappe et de l'oïdium** lors de fortes pressions afin de diminuer les portes d'entrée du champignon dans les baies ;
- **limiter les blessures engendrées lors des opérations d'effeuillage ou de rognage** en effectuant les réglages adéquats du matériel utilisé.

De manière générale, la prévention et la gestion des résistances reposent sur la diversification de l'usage des modes d'action et l'implémentation précoce des stratégies anti-résistance. En effet, l'élimination des individus résistants sera d'autant plus probable s'ils sont à faible fréquence dans les populations. Cela suppose de limiter au moins temporairement l'usage du fongicide les ayant sélectionnés et de les contrôler par d'autres modes d'action efficaces. *A contrario*, lorsque la résistance est bien installée dans les populations ou en cas de résistance multiple, les stratégies de gestion visent principalement à ralentir la sélection des individus résistants. On parle de « **gestion de la résistance** » dans les situations où les recommandations visent à prévenir et ralentir la sélection des individus résistants.

Dans les situations où la fréquence des individus résistants est importante et stabilisée dans les populations, et où la gestion de la résistance n'est plus possible, les applications de fongicides visent essentiellement à compenser la perte d'efficacité totale ou partielle causée par la résistance pour maintenir un contrôle acceptable de la maladie en situation de résistance. On parle alors de « **gestion de l'efficacité** ».

Dans la colonne « Recommandations » des tableaux qui suivent, la finalité a été précisée en utilisant les mentions « **gestion de la résistance** » ou « **gestion de l'efficacité** » pour chaque mode d'action et pathogène.

Les **stratégies anti-résistance** incluent : la limitation des traitements, l'association de modes d'actions différents (ou mélange), l'alternance des modes d'action, la mosaïque territoriale et la modulation de la dose (peu utilisée en viticulture pour gérer la résistance). Elles visent à maximiser l'hétérogénéité de la sélection par les fongicides en vue de ralentir la vitesse d'adaptation des populations d'organismes phytopathogènes.

- **Limitation des traitements** : L'efficacité de cette stratégie repose sur une réduction quantitative de la pression de sélection. De manière plus générale, toute mesure, par exemple la prophylaxie, se substituant à un traitement fongicide et contribuant à diminuer les épidémies fongiques, participe à limiter le risque de résistance et **doit donc être utilisée prioritairement**.

- **Association des modes d'action** : Cette stratégie consiste à associer deux substances de modes d'action différents (ne présentant pas de résistance croisée positive) se protégeant mutuellement du risque de résistance. Cette stratégie peut être mise en défaut si l'un des partenaires présente déjà une résistance fortement évoluée ou n'est pas suffisamment efficace. Les associations d'un mode d'action concerné par une résistance fortement évoluée et d'un multisite (non concerné par la résistance) visent principalement à gérer l'efficacité de la spécialité.

- **Alternance des modes d'action au sein d'un programme et/ou au fil des saisons** : Cette stratégie consiste à introduire, entre deux applications d'un même mode d'action, une ou plusieurs applications avec des modes d'actions différents, dénommées *breakers*. Elle permet d'exercer des pressions de sélection diversifiées dans le temps, pour diminuer la fréquence des individus résistants dans les populations à chaque mode d'action au fil des générations. Cette stratégie ne peut être effective que si les descendants des individus résistants sélectionnés par un mode d'action sont éliminés par un mode d'action différent. Cette stratégie est d'autant plus efficace que les individus résistants présentent une fitness réduite (moindre compétitivité par rapport aux individus sensibles). Il faut dès lors qu'il y ait concomitance entre changement de génération et changement de substance active. Pour limiter la résistance, le nombre de *breakers* à introduire entre deux applications du même mode d'action est donc à raisonner, en théorie, d'une part selon la durée des générations de l'agent pathogène (dépendante des conditions climatiques) et d'autre part selon la rémanence des substances utilisées. Des travaux récents, réalisés avec des substances rémanentes, montrent que l'application consécutive de deux traitements *breakers* gère plus efficacement la résistance qu'une alternance avec un seul traitement *breaker*. Ce compromis doit cependant être évalué au cas par cas.

- **Mosaïque spatiale** : Cette stratégie correspond à l'utilisation de différents modes d'action au même moment, mais dans des parcelles différentes, pour limiter les « effets de masse » dans le paysage et créer une hétérogénéité spatiale de la sélection. L'efficacité de la *mosaïque* varie selon les distances de migration des bioagresseurs.

L'efficacité de l'alternance et de la mosaïque, destinées à éteindre des foyers de résistance en émergence, varie donc en fonction des modes d'action et de la biologie des agents pathogènes. Il est ainsi difficile, en l'état actuel des connaissances, de faire des recommandations précises (en particulier concernant un nombre de *breakers*) permettant de couvrir toutes les situations.

Enfin, ces stratégies anti-résistance ne peuvent avoir un intérêt pour limiter l'évolution des résistances que lorsque ces dernières ne sont pas généralisées dans les populations, *i.e.* lorsqu'il existe encore une marge de progression des résistances (phase d'émergence ou de sélection). Il s'agit alors de ralentir, stabiliser, voire de faire régresser, la résistance dans les populations.

En 2024, la pression a été forte à très forte dans tous les vignobles et a pu entraîner une augmentation des traitements dans les programmes de protection.

En l'état actuel des connaissances, les **Qol-P** ne sont plus recommandés pour lutter contre le mildiou.

Les **cyanooximes**, les **anilides**, et les **CAA** sont des groupes chimiques ou des modes d'action concernés depuis plusieurs années par la résistance. La résistance aux **acylpicolides** et aux **Qil** est désormais bien implantée dans tous les vignobles, à fréquence et occurrences souvent fortes. Les recommandations pour ces familles visent à gérer l'efficacité et non l'évolution de la résistance. La résistance non spécifique **AOX**, testée sur **Qil** et **Qiol** (mais qui concerne aussi les Qol-P), présente des occurrences élevées dans tous les vignobles. Bien que variable entre les populations, la fréquence moyenne au sein des populations de ce mécanisme de résistance reste élevée. Depuis 2023, des souches résistantes à l'amétoctradine (**Qiol**) sont détectées dans plusieurs vignobles, sans porter la mutation historiquement caractérisée. Des résultats complémentaires sont attendus pour mieux caractériser cette diversification des mécanismes de résistance à ce mode d'action. Dans ce contexte, les recommandations doivent être strictement respectées.

La campagne 2021 avait été marquée par la détection des premières souches résistantes aux **OBSPi (oxathiapiproline)** et aux **benzamides (zoxamide)**. En 2024, la situation diffère pour ces deux substances actives. Pour la **zoxamide**, la situation semble stable avec une seule population française positive, avec une fréquence faible de souches résistantes. Comme en 2023, les occurrences de la résistance à l'**oxathiapiproline** augmentent en 2024 et les détections concernent la plupart des vignobles. Les fréquences d'individus résistants restent cependant toujours faibles vis-à-vis de cette substance active au sein des populations concernées. Aucune diminution notable de l'efficacité des spécialités n'a, à ce jour, été signalée en France pour les **OBSPi**. Pour mémoire, les facteurs de résistance associés aux résistances vis-à-vis de ces deux modes d'action sont décrits comme forts dans la littérature. La plus grande vigilance est donc de rigueur et, en cette phase précoce de la dynamique adaptative, l'usage raisonné de ces modes d'action reste préconisé afin de ralentir l'émergence des résistances vis-à-vis de ces substances actives.

**Recommandation générale :** A l'exception des substances multisites dont l'efficacité intrinsèque est suffisante (folpel, cuivre, dithionon), tous les modes d'action sont désormais concernés par la résistance à des degrés divers. Dans les contextes de résistances les plus dégradés, il est fortement recommandé soit de ne pas utiliser les substances concernées par la résistance, en particulier quand les risques sont élevés, soit de les associer avec un partenaire efficace, notamment en situation de forte pression de mildiou (gestion de l'efficacité).

Le maintien de l'efficacité des substances actives actuellement autorisées est devenu essentiel. Les alternances de modes d'action, les renouvellements anticipés en fonction des épisodes de contamination et du climat, l'association avec des substances actives efficaces (e.g. multisites) sont plus que jamais essentiels pour limiter les risques de perte d'efficacité au champ. Dans un contexte général de diminution de la diversité des substances actives disponibles, une attention toute particulière doit être portée à la gestion des programmes de traitements. Ceux-ci doivent tenir compte de la résistance connue sur le bassin de production, et s'adapter durant la campagne en fonction de l'évolution de la pression parasitaire.

## Mildiou : Produits hors liste des produits de biocontrôle

| Substances actives                                                     | Type de résistance<br><i>Mécanisme de résistance</i><br>Facteur de résistance (FR)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tendance évolution<br><i>occurrence et fréquence (si disponible) de la résistance* en 2024</i>                                                                       | Impact de la résistance sur l'efficacité du mode d'action au vignoble                                             | RECOMMANDATIONS GENERALES                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produits à base de Qil (code R4P : A3a ; codes FRAC : C4/21)           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| amisulbrom<br>cyazofamide                                              | Résistance spécifique.<br><br><i>Modification de la cible : Cytb insertion E203-DE-V204 la plus fréquente, E203-VE-V204 rare en France (L201S non détectée en France).</i><br><br>Chez les génotypes en présence, la résistance croisée affecte différemment les 2 substances concernées : facteur de résistance élevé pour la cyazofamide, faible à moyen pour l'amisulbrom. | Stabilité.<br><br><i>Présence de la résistance dans tous les vignobles. Occurrence forte.</i><br><br><i>Fréquence moyenne à forte dans l'ensemble des vignobles.</i> | Baisse d'efficacité possible en situation de risque épidémique élevé avec un partenaire à l'efficacité partielle. | <i>Gestion de l'efficacité:</i><br><br>Déconseillé avec un partenaire à efficacité partielle en situation de risques épidémiques élevés.<br><br>1 application<br>+ 1 application supplémentaire éventuelle en association avec un mode d'action multisite. |
|                                                                        | Résistance non spécifique.<br><br><i>Surexpression de l'alternative oxydase (AOX) impliquée dans la respiration alternative.</i><br><br>Facteurs de résistance variables, faibles à élevés.                                                                                                                                                                                   | Stabilité.<br><br><i>Occurrence forte.</i><br><br><i>Fréquence moyenne à forte.</i>                                                                                  | Baisse d'efficacité mise en évidence en essai.                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Produits à base de Qiol (= QioSI) (code R4P : A6 ; codes FRAC : C8/45) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| amétoctradine                                                          | Résistance spécifique.<br><br><i>Modification de la cible (Cytb S34L) + nouveau mécanisme de résistance inconnu à caractériser</i><br><br>Facteurs de résistance élevés pour S34L.                                                                                                                                                                                            | En progression.<br><br><i>Occurrence en augmentation.</i><br><br><i>Fréquence faible à moyenne, plus forte en Armagnac.</i>                                          | Baisse d'efficacité possible en situation de risque épidémique élevé avec un partenaire à l'efficacité partielle. | <i>Gestion de l'efficacité :</i><br><br>1 application, de préférence en association avec un partenaire multisite en situation de risque élevé.                                                                                                             |
|                                                                        | Résistance non spécifique.<br><i>Surexpression de l'alternative oxydase (AOX) impliquée dans la respiration alternative.</i><br><br>Facteurs de résistance variables, faibles à élevés.                                                                                                                                                                                       | Stabilité.<br><br><i>Occurrence moyenne à forte.</i><br><br><i>Fréquence faible à forte, selon les régions.</i>                                                      | Baisse d'efficacité mise en évidence en essai.                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |



| Substances actives                    | Type de résistance<br><i>Mécanisme de résistance</i><br>Facteur de résistance (FR)                                                                 | Tendance évolution<br><i>occurrence et fréquence (si disponible) de la résistance* en 2024</i>                                                             | Impact de la résistance sur l'efficacité du mode d'action au vignoble | RECOMMANDATIONS GENERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produits à base de QoI-P</b>       |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                            |                                                                       | <b>(code R4P : A5 ; codes FRAC : C3/11)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| azoxystrobine                         | Résistance spécifique.<br><br><i>Modification de la cible (Cytb G143A).</i><br><br>Facteurs de résistance élevés.                                  | En diminution par rapport à l'historique<br><br><i>Occurrence et fréquence faibles à fortes.</i>                                                           | Efficacité souvent insuffisante d'après les données anciennes.        | <i>Gestion de l'efficacité :</i><br><br>Non recommandé sur mildiou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Produits à base de CAA</b>         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                            |                                                                       | <b>(code R4P : C1a ; codes FRAC : H5-40)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| mandipropamide<br>valifénalate        | Résistance spécifique.<br><br><i>Modification de la cible (PvCesA3 G1105S/V/Y).</i><br><br>Facteurs de résistance élevés.                          | Stabilité.<br><br><i>Occurrence globalement élevée.</i><br><br><i>Fréquence moyenne à forte.</i>                                                           | Baisse d'efficacité constatée.                                        | <i>Gestion de l'efficacité :</i><br><br>2 applications au maximum.<br>Privilégier l'association avec un mode d'action multisite.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Produits à base d'OSBPI</b>        |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                            |                                                                       | <b>(code R4P : E5 ; codes FRAC : F9/49)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| oxathiapiprolin                       | Résistance spécifique.<br><br><i>Modification de la cible (OSBP G685V, N752I ou I792F).</i><br><br>Facteurs de résistance élevés.                  | En progression.<br><br><i>Occurrence généralement nulle à faible, un peu plus forte en Charentes, Armagnac et Sud-Est.</i><br><br><i>Fréquence faible.</i> | Pas de baisse d'efficacité rapportée                                  | <i>Gestion de la résistance :</i><br>1 application maximum.<br>A associer avec un partenaire efficace.<br><br>Privilégier si possible le principe d'application en mosaïque spatiale à l'échelle d'un vignoble pour limiter les risques de pression de sélection sur un seul stade végétatif.<br><br>Déconseillé si la pression de la maladie se maintient dans une situation dégradée. |
| <b>Produits à base de cyanooximes</b> |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                            |                                                                       | <b>(code R4P : F5b ; code FRAC : 27)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| cymoxanil                             | Résistance spécifique.<br><br><i>Unsite avec mécanisme de résistance inconnu.</i><br><br>Facteurs de résistance élevés.                            | Données anciennes.                                                                                                                                         | Efficacité souvent insuffisante.                                      | <i>Gestion de l'efficacité :</i><br><br>2 applications au maximum.<br>Privilégier l'association avec un mode d'action multisite.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Produits à base d'anilides</b>     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                            |                                                                       | <b>(code R4P : G3 ; codes FRAC : A1/4)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| bénalaxyl-M<br>métalaxyl-M            | Résistance spécifique.<br><br><i>Modification de la cible (ARN Pol I / mutation inconnue).</i><br><br>Facteurs de résistance élevés.               | Occurrence et fréquence toujours fortes.                                                                                                                   | Efficacité souvent insuffisante.                                      | <i>Gestion de l'efficacité :</i><br><br>2 applications au maximum.<br>Privilégier l'association avec un mode d'action multisite.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Produits à base de benzamides</b>  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                            |                                                                       | <b>(code R4P : K2a ; codes FRAC : B3/22)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| zoxamide                              | Unsite à risque de résistance spécifique.<br><br><i>Modifications de la cible (β-tubuline) Tub C239G/S).</i><br><br>Facteurs de résistance élevés. | Premières détections en France en 2021.<br><br><i>1 détection en 2024.</i>                                                                                 | -                                                                     | <i>Gestion de la résistance :</i><br><br>1 application<br>+ 1 application supplémentaire éventuelle uniquement en association avec un mode d'action multisite.                                                                                                                                                                                                                          |

| Substances actives                        | Type de résistance<br><i>Mécanisme de résistance</i><br>Facteur de résistance (FR)                                         | Tendance évolution<br><i>occurrence et fréquence (si disponible) de la résistance* en 2024</i>                                  | Impact de la résistance sur l'efficacité du mode d'action au vignoble  | RECOMMANDATIONS GENERALES                                                                                                               |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produits à base d'acylpicolides           |                                                                                                                            |                                                                                                                                 |                                                                        | (code R4P : K5 ; codes FRAC : B5/43)                                                                                                    |
| fluopicolide                              | Résistance spécifique.<br><br><i>Mécanisme.</i><br><i>V-type proton ATPase : G759S/N</i><br>Facteurs de résistance élevés. | Présence de la résistance dans tous les vignobles.<br><br><i>Occurrence forte.</i><br><br><i>Fréquences moyennes à fortes .</i> | Baisse d'efficacité constatée en situation de risque épidémique élevé. | <i>Gestion de l'efficacité :</i><br><br>1 application au maximum (AMM).<br><br>Ne pas utiliser en situation de risque épidémique élevé. |
| Produits à base de phosphonates           |                                                                                                                            |                                                                                                                                 |                                                                        | (code R4P : S2 ; codes FRAC : U/33)                                                                                                     |
| fosétyl aluminium                         | Non concerné par les phénomènes de résistance.<br>Efficacité intrinsèque partielle.                                        |                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                         |
| Produits à base de substances multisites  |                                                                                                                            |                                                                                                                                 |                                                                        | (code R4P : W ; code FRAC : M)                                                                                                          |
| composés du cuivre<br>dithianon<br>folpel | Non concernés par les phénomènes de résistance.<br>Pas de variation d'efficacité constatée.                                |                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                         |

### **Mildiou : Produits de biocontrôle<sup>1</sup>**

|                                                                 |                                                                                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Produits affectant l'intégrité des membranes cellulaires</b> |                                                                                                  | (code R4P : O5b ; code FRAC : NC)   |
| huile essentielle d'orange                                      | Non concernée par les phénomènes de résistance.<br>Efficacité intrinsèque variable et partielle. |                                     |
| <b>Produits à base de phosphonates</b>                          |                                                                                                  | (code R4P : S2 ; codes FRAC : U/33) |
| phosphonate disodique<br>phosphonates de potassium              | Non concernés par les phénomènes de résistance.<br>Efficacité intrinsèque partielle.             |                                     |
| <b>Stimulateurs des défenses des plantes</b>                    |                                                                                                  | (code R4P : S6 ; code FRAC : NC)    |
| cerevisane<br>COS-OGA<br>ABE IT 56                              | Non concernés par les phénomènes de résistance.<br>Efficacité intrinsèque variable et partielle. |                                     |
| <b>Produits à base de microorganismes</b>                       |                                                                                                  | (code R4P : YB ; codes FRAC : NC)   |
| <i>Bacillus amyloliquefasciens</i><br>(souche FZB24)            | Non concerné par les phénomènes de résistance.<br>Efficacité intrinsèque variable et partielle.  |                                     |

<sup>1</sup> Liste des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle, au titre des articles L.253-5 et L.253-7 du code rural et de la pêche maritime :

Tous produits : <https://ecophytopic.fr/reglementation/proteger/liste-des-produits-de-biocontrôle>

Produits utilisables en viticulture : <https://www.vinopole.com/wiki/>

## OÏDIUM

En l'état actuel des connaissances, les **Qol-P** ne sont plus recommandés pour lutter contre l'oïdium. L'utilisation des **IDM** et **azanaphtalènes** est susceptible de fragiliser les programmes de protection et de reporter la pression de sélection sur les autres modes d'action. Il est nécessaire d'alterner les traitements contenant ces modes d'action avec des produits à modes d'action non concernés par la résistance et suffisamment efficaces, et de ne pas les utiliser en succession (ex : éviter un traitement à base d'**IDM** suivi d'**azanaphtalènes**).

La campagne 2024 est marquée par une stabilité de la résistance aux APK et aux SDHI. Chez *E. necator*, la résistance aux SDHI est caractérisée par une relative diversité de mutations affectant la cible de ces fongicides. Chaque mutation concourt à sélectionner globalement la résistance aux SDHI mais affecte différemment les diverses substances actives représentant les trois classes chimiques de SDHI (*i.e.* la résistance croisée est partielle, les facteurs de résistance varient de nuls à forts selon les substances actives et les mutations). Par exemple, chez de nombreux pathogènes, les substitutions SdhB H242R/Y affectent peu ou pas le fluopyram. Chez *E. necator*, le fluopyram est en revanche fortement affecté par les substitutions SdhC I244V et A83V. Le fluxapyroxade est peu affecté par les mutations actuellement en présence. Dans ce contexte, il est important d'utiliser toute la palette des SDHI disponibles, afin de conserver cette diversité mutationnelle, et d'éviter de concentrer la sélection de la résistance vers une ou quelques mutations qui serai(en)t fortement dommageable(s) pour une substance active en particulier. La plus grande vigilance est de rigueur et, en cette phase précoce de la dynamique adaptative, l'usage raisonné de ce mode d'action est préconisé afin de limiter la progression de cette résistance.

### Oïdium : Produits hors liste des produits de biocontrôle

| Substances actives<br>(classes chimiques)                                                                                                              | Type de résistance<br><i>Mécanisme de résistance</i><br>Facteur de résistance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tendance évolution<br><i>occurrence et fréquence (lorsque disponible) de la résistance*</i> en 2024                                                                                                                                                                                                                                                       | Impact de la résistance sur l'efficacité du mode d'action, au vignoble | RECOMMANDATIONS GENERALES                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produits à base de SDHI</b> (code R4P : A2a ; codes FRAC : C2/7)                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| boscalide<br>(pyridines-carboxamides)<br><br>fluopyram <sup>3</sup><br>(pyridinyles-éthyl-benzamides)<br><br>fluxapyroxade<br>(pyrazoles-carboxamides) | Résistance spécifique.<br>Spectres de résistance croisée incomplets entre classes chimiques : facteurs de résistance variables selon les substances actives et les mutations, affectant moins fortement le fluxapyroxade comparativement au fluopyram et au boscalide. Le boscalide présente généralement les facteurs de résistance les plus élevés.<br><br><i>Modification de la cible (SdhB H242R, affectant principalement le boscalide; SdhC A83V affectant principalement le fluopyram et le boscalide ; autres allèles SdhB H242Y, I244V et SdhC G169D/S ; doubles mutants observés).</i> | Stabilité.<br><br><i>Occurrence et fréquence variables, plus ou moins fortes selon la mutation observée.</i><br><br><i>Les isolats fortement résistants au boscalide sont plus fréquemment retrouvés et à de plus fortes fréquences que ceux résistants fortement au fluopyram. Pas d'isolats fortement résistants au fluxapyroxade détectés en 2024.</i> | Pas de baisse d'efficacité mise en évidence.                           | <b>Gestion de la résistance :</b><br><br>2 applications au maximum de SDHI.<br>1 application maximum par substance active afin de garder une diversité mutationnelle.<br><br>Ne pas utiliser le boscalide s'il est déjà utilisé comme anti-botrytis. |
| <b>Produits à base de Qol (Qol-P)</b> (code R4P : A5 ; codes FRAC : C3/11)                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| azoxystrobine<br>krésoxime-méthyle<br>trifloxystrobine                                                                                                 | Résistance spécifique.<br><br><i>Modification de la cible (Cytb G143A).</i><br><br>Facteurs de résistance élevés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Données anciennes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Efficacité souvent insuffisante.                                       | <b>Gestion de l'efficacité :</b><br>Non recommandé sur oïdium.                                                                                                                                                                                       |

<sup>3</sup> Fin utilisation des stocks en 2025.

| Substances actives<br>(classes chimiques)                                              | Type de résistance<br><i>Mécanisme de résistance</i><br>Facteur de résistance                                                                                                                  | Tendance évolution<br><i>occurrence et fréquence (lorsque disponible) de la résistance* en 2024</i>                       | Impact de la résistance sur l'efficacité du mode d'action, au vignoble         | RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produits à base d'IDM (IBS du groupe I)</b> (code R4P : E2 ; codes FRAC : G1/3)     |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           |                                                                                |                                                                                                                                                |
| diféniconazole<br>penconazole<br>tébuconazole<br>tétraconazole<br>méfentrifluconazole  | Résistance spécifique.<br><br><i>Modification de la cible (Cyp51 Y136F). Surexpression de Cyp51. Amplification génique Cyp51.</i><br>Facteur de résistance faible à fort selon les fongicides. | Tendance à augmentation<br><br><i>Occurrence et fréquences élevées (données anciennes).</i>                               | Les efficacités peuvent varier selon les substances actives et les situations. | <i>Gestion de l'efficacité :</i><br><br>2 applications au maximum d'IDM comme anti-oïdium, 1 application au maximum par substance active.      |
| <b>Produits à base d'amines (IBS du groupe II)</b> (code R4P : E3 ; codes FRAC : G2/5) |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           |                                                                                |                                                                                                                                                |
| spiroxamine                                                                            | Unisite à faible risque de résistance en vigne.                                                                                                                                                | Données anciennes.                                                                                                        | -                                                                              | <i>Gestion de la résistance :</i><br><br>2 applications au maximum.                                                                            |
| <b>Produits à base d'aryl-phényl-kétones</b> (code R4P : K6 ; code FRAC : U8)          |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           |                                                                                |                                                                                                                                                |
| métrafénone (benzophénones)<br>pyriofénone (benzoylpyridines)                          | Résistance spécifique.<br><br><i>Mécanisme inconnu.</i><br><br>Facteurs de résistance élevés                                                                                                   | Stabilité.<br><br><i>Occurrence forte en Armagnac, et plutôt moyenne dans les vignobles où l'oïdium est prépondérant.</i> | Pas de baisse d'efficacité mise en évidence                                    | <i>Gestion de la résistance :</i><br><br>1 application.                                                                                        |
| <b>Produits à base d'azanaphtalènes (AZN)</b> (code R4P : M4 ; codes FRAC : E1/13)     |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           |                                                                                |                                                                                                                                                |
| proquinazide (quinazolinones)                                                          | Résistance spécifique.<br><br><i>Mécanisme inconnu.</i><br><br>Facteurs de résistance modérés.                                                                                                 | Données anciennes.                                                                                                        | Baisse d'efficacité mise en évidence en essai (données anciennes).             | <i>Gestion de la résistance :</i><br><br>1 application<br>+ 1 application supplémentaire si la durée de la période de protection le nécessite. |
| <b>Produits à base d'amidoximes</b> (code R4P : XF8 ; code FRAC : U6)                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           |                                                                                |                                                                                                                                                |
| cyflufénamide                                                                          | Unisite à risque de résistance spécifique.<br><br>Facteurs de résistance modérés à élevés sur oïdium des cucurbitacées.                                                                        | Suspicion de résistance, à confirmer. Pas d'identification en 2024                                                        | -                                                                              | <i>Gestion de la résistance :</i><br><br>1 application<br>+ 1 application supplémentaire si la durée de la période de protection le nécessite. |
| <b>Produit à base de thiazolidines<sup>4</sup></b> (code R4P : U-XF12 ; code FRAC U13) |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           |                                                                                |                                                                                                                                                |
| flutianile                                                                             | Unisite à risque de résistance spécifique (résistance décrite sur oïdiums des cucurbitacées).                                                                                                  | -                                                                                                                         | -                                                                              | <i>Gestion de la résistance :</i><br><br>2 applications au maximum (AMM).                                                                      |

<sup>4</sup> Cette molécule a été approuvée réglementairement mais n'est pas commercialisée actuellement. Elle n'est donc pas disponible pour la campagne 2025.

## Oïdium : Produits de biocontrôle <sup>1</sup>

| Produits affectant l'intégrité des membranes cellulaires (code R4P : O5b ; code FRAC : NC)                   |                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| huile essentielle d'orange                                                                                   | Non concernée par les phénomènes de résistance.<br>Efficacité intrinsèque variable et partielle. |
| Stimulateurs des défenses naturelles des plantes (code R4P : S6 ; code FRAC : NC)                            |                                                                                                  |
| cerevisane<br>laminarine<br>COS-OGA                                                                          | Non concernés par les phénomènes de résistance.<br>Efficacité intrinsèque variable et partielle. |
| Produits à base de substances multisites (code R4P : W4 ; code FRAC : M2)                                    |                                                                                                  |
| soufre                                                                                                       | Non concerné par les phénomènes de résistance.<br>Pas de variation d'efficacité constatée.       |
| Produits de mode d'action inconnu (code R4P : XF ; code FRAC : NC)                                           |                                                                                                  |
| hydrogénocarbonate de potassium<br>(bicarbonate de potassium)                                                | Non concerné par les phénomènes de résistance.<br>Efficacité intrinsèque variable et partielle.  |
| Produits à mode d'action multiple (Code R4P : XF ; code FRAC : BM01)                                         |                                                                                                  |
| extrait aqueux de graines germées de <i>Lupinus albus</i> doux<br>huile de paraffine                         | Non concerné par les phénomènes de résistance.<br>Efficacité intrinsèque variable et partielle.  |
| Produits à base de microorganismes (codes R4P : YB ; codes FRAC : NC)                                        |                                                                                                  |
| <i>Bacillus amyloliquefasciens</i> (souche FZB24),<br><i>Bacillus pumilus</i> <sup>5</sup> (souche QST 2808) | Non concernés par les phénomènes de résistance.<br>Efficacité intrinsèque variable et partielle. |

<sup>1</sup> Liste des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle, au titre des articles L.253-5 et L.253-7 du code rural et de la pêche maritime :

Tous produits : <https://ecophytopic.fr/reglementation/protger/liste-des-produits-de-biocontrrole>

Produits utilisables en viticulture : <https://www.vinopole.com/wiki/>

<sup>5</sup> Retrait AMM au 31/08/2024 - fin utilisation 31/08/2025

## POURRITURE GRISE

Les recommandations d'emploi des fongicides anti-botrytis (basées sur la limitation d'utilisation de chaque famille chimique) et de respect des mesures de prophylaxie (p.2) ont fait leurs preuves. Quelle que soit la stratégie, l'emploi d'un seul produit par famille chimique et par an est impératif et réaliste. L'alternance pluriannuelle pour toute famille chimique concernée par la résistance spécifique est fortement recommandée.

**Remarque :** pour les groupes chimiques ou modes d'action concernés par une résistance spécifique ou non spécifique (résistance multidrogues), les occurrences (% de parcelles avec résistance détectée) sont en général moyennes à élevées. Ainsi, à la différence du mildiou et de l'oïdium, la fréquence de résistance indiquée correspond à la proportion moyenne d'individus résistants dans les populations. Elles ont donc une valeur indicative.

Ce tableau rapporte les éléments déjà présentés précédemment.

### Pourriture grise : Produits hors liste des produits de biocontrôle

Les éléments du tableau sont basés principalement sur les anciennes données du plan de surveillance du Comité Champagne (données anciennes). La surveillance des populations de *Botrytis cinerea* est limitée, voire absente, ces dernières années.

| Substances actives<br>(classe chimique)                                              | Type de résistance<br>et mécanisme de<br>résistance                                                                                   | Tendance évolution<br>fréquence de la<br>résistance   | Impact de la résistance<br>sur l'efficacité du mode<br>d'action, au vignoble | RECOMMANDATIONS                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produits à base de SDHI                                                              |                                                                                                                                       |                                                       | (code R4P : A2a ; codes FRAC : C2/7)                                         |                                                                                                                                           |
| boscalide<br>(pyridine-carboxamide)                                                  | Résistance spécifique.<br><br><i>Modification de la cible<br/>(SdhB H272Y/R/L/V, N230I,<br/>P225F/T/L ; SdhD H132R +<br/>autres).</i> | En progression<br>(isofétamide)<br><br><i>Faible.</i> | Aucune baisse d'efficacité<br>rapportée en lien avec de<br>la résistance.    | <i>Gestion de la résistance :</i><br>1 application au<br>maximum ;<br>ne pas choisir le boscalide<br>s'il est déjà utilisé sur<br>oïdium. |
| isofétamide<br>(phényl-oxo-éthyl-<br>thiophène amide)                                | Résistance non spécifique.<br><br><i>Efflux accru (MDR).</i>                                                                          | -<br><br><i>Elevée.</i>                               |                                                                              |                                                                                                                                           |
| Produits à base d'inhibiteurs de la C4-déméthylation des stérols (IBS du groupe III) |                                                                                                                                       |                                                       |                                                                              |                                                                                                                                           |
| fenhexamide<br>(hydroxylanilide)                                                     | Résistance spécifique.<br><br><i>Modification de la cible<br/>(erg27, principalement<br/>F412S/I/V).</i>                              | -<br><br><i>Faible à moyenne.</i>                     | Aucune baisse d'efficacité<br>rapportée.                                     | <i>Gestion de la résistance :</i><br>1 application au<br>maximum.                                                                         |
| fenpyrazamine<br>(aminopyrazolinone)                                                 | Résistance non spécifique.<br><br><i>Efflux accru (MDR).</i>                                                                          | -<br><br><i>Elevée.</i>                               |                                                                              |                                                                                                                                           |
| Produits à base de phénylpyrroles                                                    |                                                                                                                                       |                                                       |                                                                              |                                                                                                                                           |
| fludioxonil                                                                          | Non concerné par la<br>résistance spécifique.                                                                                         | -                                                     | Aucune baisse d'efficacité<br>rapportée.                                     | <i>Gestion de la résistance :</i><br>1 application au<br>maximum.                                                                         |
|                                                                                      | Résistance non spécifique.                                                                                                            | -                                                     |                                                                              |                                                                                                                                           |
|                                                                                      | <i>Efflux accru (MDR).</i>                                                                                                            | <i>Elevée.</i>                                        |                                                                              |                                                                                                                                           |
| Produits à base d'anilinopyrimidines                                                 |                                                                                                                                       |                                                       | (code R4P : M2 ; codes FRAC : D1/9)                                          |                                                                                                                                           |
| cyprodinil<br>pyriméthanol                                                           | Résistance spécifique.<br><br><i>8 mutations portées par<br/>deux gènes impliqués dans<br/>le métabolisme<br/>mitochondrial.</i>      | -<br><br><i>Faible à moyenne.</i>                     | Aucune baisse d'efficacité<br>rapportée.                                     | <i>Gestion de la résistance :</i><br>1 application au<br>maximum.                                                                         |
|                                                                                      | Résistance non spécifique.                                                                                                            | -                                                     |                                                                              |                                                                                                                                           |
|                                                                                      | <i>Efflux accru (MDR).</i>                                                                                                            | <i>Elevée.</i>                                        |                                                                              |                                                                                                                                           |



## Pourriture grise : Produits de biocontrôle<sup>1</sup>

| Produits affectant l'intégrité des membranes cellulaires (code R4P : O5d ; code FRAC : NC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eugénol, géraniol, thymol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Non concernés par les phénomènes de résistance.<br>Efficacité intrinsèque variable et partielle. |
| Produits à base de microorganismes (codes R4P : YB ; codes FRAC : NC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  |
| <i>Aureobasidium pullulans</i> (souches DSM 14940 et 14941)<br><i>Bacillus subtilis</i> (souche QST 713)<br><i>Bacillus amyloliquefasciens</i> (souche MBI600)<br><i>Bacillus amyloliquefasciens ssp. plantarum</i> (souche D747)<br><i>Bacillus amyloliquefasciens</i> (souche FZB24)<br><i>Bacillus subtilis</i> (souche IAB/BS03)<br><i>Metschnikowia fructicola</i> (souche NRRL Y-27328)<br><i>Saccharomyces cerevisiae</i> (souche LAS02)<br><i>Trichoderma atroviride</i> (souche SC1)<br><i>Clonostachys rosea</i> (souche J1446) | Non concernés par les phénomènes de résistance.<br>Efficacité intrinsèque variable et partielle. |
| Stimulateurs des défenses naturelles des plantes (code R4P : S6c ; code FRAC : NC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                  |
| cerevisane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Non concernée par les phénomènes de résistance.<br>Efficacité intrinsèque variable et partielle. |
| Produits au mode d'action inconnu ou incertain (code R4P : XF ; code FRAC : NC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                  |
| hydrogénocarbonate de potassium (bicarbonate de potassium)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Non concerné par les phénomènes de résistance.<br>Efficacité intrinsèque variable et partielle.  |
| Produits à mode d'action multiple (Code R4P :XF ; code FRAC : BM01)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                  |
| extrait aqueux de graines germées de <i>Lupinus albus</i> doux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Non concerné par les phénomènes de résistance.<br>Efficacité intrinsèque variable et partielle.  |

<sup>1</sup> Liste des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle, au titre des articles L.253-5 et L.253-7 du code rural et de la pêche maritime :

Tous produits : <https://ecophytopic.fr/reglementation/protger/liste-des-produits-de-biocontrrole>,

Produits utilisables en viticulture : <https://www.vinopole.com/wiki/>

## BLACK ROT

L'absence de données de surveillance des agents du black rot vis-à-vis des résistances ne permet pas de décrire leur sensibilité aux différentes substances actives listées ci-dessous et donc d'apporter des recommandations spécifiques pour limiter les risques de résistance. Toutefois, certaines préparations disposant d'une AMM pour l'usage black rot peuvent être autorisées sur mildiou et/ou oïdium.

Les recommandations ci-dessous ont pour objectif de proposer des règles d'emploi des substances actives utilisables sur le black-rot en tenant compte des résistances sur mildiou et oïdium.

| Substances actives                                                                    | Etat des résistances sur d'autres usages | RECOMMANDATIONS                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produits à base d'IDM (IBS du groupe I)</b>                                        |                                          | <b>(code R4P : E2 ; codes FRAC : G1/3)</b>                                                                                                                                                                      |
| diféniconazole<br>penconazole<br>tébuconazole<br>tétraconazole<br>méfentrifluconazole | Résistance chez l'oïdium.                | Applications spécifiques black rot possibles en période de moindre sensibilité à l'oïdium (donc à privilégier après fermeture de la grappe).                                                                    |
| <b>Produits à base de QoI-P</b>                                                       |                                          | <b>(code R4P : A5 ; codes FRAC C3/11)</b>                                                                                                                                                                       |
| azoxystrobine<br>krésoxime-méthyle<br>trifloxystrobine                                | Résistances chez oïdium et mildiou.      | Applications spécifiques black rot possibles associées à une substance efficace sur oïdium si risque oïdium. En cas de période à risque mildiou, privilégier les produits associant un anti-mildiou de contact. |
| <b>Produits à base de substances multi-sites</b>                                      |                                          | <b>(code R4P : W ; code FRAC : M)</b>                                                                                                                                                                           |
| composés du cuivre<br>folpel<br>dithianon                                             | Aucune résistance chez mildiou et oïdium | Applications spécifiques black rot possibles.                                                                                                                                                                   |

## Annexe : Références bibliographiques utiles

- Blum, M., et al. (2010). "A single point mutation in the novel PvCesA3 gene confers resistance to the carboxylic acid amide fungicide mandipropamid in *Plasmopara viticola*." Fungal Genetics and Biology 47(6): 499-510.
- Cai, M., et al. (2016). "C239S mutation in the  $\beta$ -tubulin of *Phytophthora sojae* confers resistance to zoxamide." Frontiers in Microbiology 7(762).
- Chen, W. J., et al. (2007). "At least two origins of fungicide resistance in grapevine downy mildew populations." Applied and Environmental Microbiology 73(16): 5162-5172.
- Cherrad, S., et al. (2018). "Emergence of boscalid-resistant strains of *Erysiphe necator* in French vineyards." Microbiological Research 216: 79-84.
- Cherrad, S., et al. (2018). *Plasmopara viticola* resistance to complex III inhibitors: an update on the phenotypic and genotypic characterization of strains. 12ème conférence internationale sur les maladies des plantes. Végéphyt. Tours, 11-12 December 2018.
- Colcol, J. F. and A. B. Baudoin (2016). "Sensitivity of *Erysiphe necator* and *Plasmopara viticola* in Virginia to QoI fungicides, boscalid, quinoxifen, thiophanate methyl, and mefenoxam." Plant Disease 100(2): 337-344.
- Colcol, J. F., et al. (2012). "Sensitivity of *Erysiphe necator* to Demethylation Inhibitor Fungicides in Virginia." Plant Disease 96(1): 111-116.
- Diriwächter, G., et al. (1987). "Cross-resistance in *Phytophthora infestans* and *Plasmopara viticola* against different phenylamides and unrelated fungicides." Crop Protection 6(4): 250-255.
- Dreinert, A., et al. (2018). "The cytochrome bc1 complex inhibitor ametoctradin has an unusual binding mode." Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Bioenergetics 1859(8): 567-576.
- Dufour, M.-C., et al. (2011). "Assessment of fungicide resistance and pathogen diversity in *Erysiphe necator* using quantitative real-time PCR assays." Pest Management Science 67(1): 60-69.
- Fehr, M., et al. (2016). "Binding of the respiratory chain inhibitor ametoctradin to the mitochondrial bc1 complex." Pest Management Science 72(3): 591-602.
- Fillinger, S., et al. (2008). "Genetic analysis of fenhexamid-resistant field isolates of the phytopathogenic fungus *Botrytis cinerea*." Antimicrobial Agents and Chemotherapy 52(11): 3933-3940.
- Fontaine, S., et al. (2019). "Investigation of the sensitivity of *Plasmopara viticola* to amisulbrom and ametoctradin in French vineyards using bioassays and molecular tools." Pest Management Science 75(8): 2115-2123.
- Genet, J. L. and O. Vincent (1999). "Sensitivity of European *Plasmopara viticola* populations to cymoxanil." Pesticide Science 55(2): 129-136.
- Gisi, U. and H. Sierotzki (2008). "Fungicide modes of action and resistance in downy mildews." European Journal of Plant Pathology 122(1): 157-167.
- Grasso, V., et al. (2006). "Cytochrome b gene structure and consequences for resistance to Qo inhibitor fungicides in plant pathogens." Pest Management Science 62(6): 465-472.
- Jones, L., et al. (2014). "Adaptive genomic structural variation in the grape powdery mildew pathogen, *Erysiphe necator*." BMC Genomics 15: 17.
- Kunova, A., et al. (2016). "Metrafenone resistance in a population of *Erysiphe necator* in northern Italy." Pest Management Science 72(2): 398-404.
- Lalève, A., et al. (2014). "Site-directed mutagenesis of the P225, N230 and H272 residues of succinate dehydrogenase subunit B from *Botrytis cinerea* highlights different roles in enzyme activity and inhibitor binding." Environmental Microbiology 16(7): 2253-2266.
- Lu, X. H., et al. (2011). "Wild type sensitivity and mutation analysis for resistance risk to fluopicolide in *Phytophthora capsici*." Plant Disease 95(12): 1535-1541.
- Leroux, P., et al. (2002). "Mechanisms of resistance to fungicides in field strains of *Botrytis cinerea*." Pest Management Science 58(9): 876-888.
- Mboup, M. K., et al. (2021). "Genetic mechanism, baseline sensitivity and risk of resistance to oxathiapiprolin in oomycetes." Pest Management Science: 9. <https://doi.org/10.1002/ps.6700>

McGrath, M. T. and Z. F. Sexton (2018). "Poor control of cucurbit powdery mildew associated with first detection of resistance to cyflufenamid in the causal agent, *Podosphaera xanthii*, in the United States." Plant Health Progress 19(3): 222-223.

Miao, J., et al. (2020). "Multiple point mutations in PsORP1 gene conferring different resistance levels to oxathiapiprolin confirmed using CRISPR-Cas9 in *Phytophthora sojae*." Pest Management Science 76(7): 2434-2440.

Miller, T. C. and W. D. Gubler (2004). "Sensitivity of California isolates of *Uncinula necator* to trifloxystrobin and spiroxamine, and update on triadimefon sensitivity." Plant Disease 88(11): 1205-1212.

Mosbach, A., et al. (2017). "Anilinopyrimidine resistance in *Botrytis cinerea* is linked to mitochondrial function." Frontiers in Microbiology 8: 19.

Mounkoro, P., et al. (2019). "Mitochondrial complex III Qi-site inhibitor resistance mutations found in laboratory selected mutants and field isolates." Pest Management Science 75(8): 2107-2114.

Panon, M. L., et al. (2018). Efficacy in vineyards of several fungicide preparations in the presence of different percentages of AOX resistant phenotypes of *Plasmopara viticola*. 12ème conférence internationale sur les maladies des plantes. Végéphyt. Tours, 11-12 December 2018.

Pirondi, A., et al. (2014). "First report of Resistance to cyflufenamid in *Podosphaera xanthii*, causal agent of powdery mildew, from melon and zucchini fields in Italy." Plant Disease 98(11): 1581-1581.

Stergiopoulos, I., et al. (2022). "Identification of putative SDHI target site mutations in the SDHB, SDHC, and SDHD subunits of the grape powdery mildew pathogen *Erysiphe necator*." Plant Dis 106(9): 2310-2320.

Thomas, A., et al. (2018). "Resistance to fluopicolide and propamocarb and baseline sensitivity to ethaboxam among isolates of *Pseudoperonospora cubensis* from the Eastern United States." Plant Disease 102(8): 1619-1626.

Walker, A.-S., et al. (2013). "French vineyards provide information that opens ways for effective resistance management of *Botrytis cinerea* (grey mould)." Pest Management Science 69(6): 667-678.

Zuniga, A. I., et al. (2020). "Baseline sensitivity of *Botrytis cinerea* isolates from strawberry to isofetamid compared to other SDHIs." Plant Disease 104(4): 1224-1230.