



## A retenir

### MILDIU



Pas de progression. Soyez vigilants avec la pluie annoncée.

### BLACK-ROT



Le risque de contamination est possible jusqu'à fermeture de la grappe. Soyez vigilants.

### OIDIUM



Rester vigilant sur les parcelles sensibles. Des contaminations sont possibles jusqu'à fermeture de grappes.

### CICADELLE VERTE



Les populations de larves progressent.

### TORDEUSES DE LA GRAPPE



Vol de G2 en cours.

### FLAVESCENCE DOREE

### DATES T3 A VENIR



Directeur de publication :

Denis CARRETIER  
Président de la Chambre  
Régionale d'Agriculture  
d'Occitanie  
BP 22107  
31321 CASTANET  
TOLOSAN Cx  
Tel 05.61.75.26.00

Dépôt légal : à parution

**Comité de validation :**  
Syndicat de Défense des  
vins AOC Cahors, Chambre  
d'agriculture du Lot,  
Chambre régionale  
d'Agriculture d'Occitanie,  
DRAAF Occitanie,  
SODEPAC, Vinotalie Cave  
des Côtes d'Olt

**ÉCOPHYTO**  
RÉDUIRE ET AMÉLIORER  
L'UTILISATION DES PHYTOS

Action pilotée par le Ministère  
chargé de l'agriculture et le  
ministère chargé de l'écologie,  
avec l'appui financier de  
l'Agence Française pour la  
Biodiversité, par les crédits  
issus de la redevance pour  
pollutions diffuses attribués au  
financement du plan Ecophyto.

Annexes : [Liste des mesures alternatives et prophylactiques en viticulture](#)  
[La note technique commune vigne 2025](#)

## METEO

### • Cumul de pluie de la semaine précédente (Source IFV)

| Station                       | lundi 23 juin 2025<br>mardi 24 juin 2025<br>mercredi 25 juin 2025<br>jeudi 26 juin 2025<br>vendredi 27 juin 2025<br>samedi 28 juin 2025<br>dimanche 29 juin 2025 |   |     |     |   |   |   | Cumul<br>hebdomadaire | Cumul depuis maturité<br>moyenne de la masse<br>des œufs en Midi<br>Pyrénées (26/04/25) |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----|---|---|---|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Prayssac (radar)              | 0                                                                                                                                                                | 0 | 3,8 | 0   | 0 | 0 | 0 | 3,8                   | 140,6                                                                                   |
| St Vincent Rive d'Olt (radar) | 0                                                                                                                                                                | 0 | 4,2 | 0   | 0 | 0 | 0 | 4,2                   | 105,9                                                                                   |
| Sauzet (radar)                | 0                                                                                                                                                                | 0 | 5,6 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 6                     | 122,1                                                                                   |
| Soturac (radar)               | 0                                                                                                                                                                | 0 | 1,8 | 0   | 0 | 0 | 0 | 1,8                   | 154,9                                                                                   |

De la grêle a provoqué quelques dégâts sur le secteur de Glanes lors de l'épisode orageux du 25/6. Des cumuls plus importants ont pu avoir lieu ponctuellement sur ce couloir orageux.

## • Prévisions du 30 juin 2025 (Source : Plein Champ - MétéoFrance)

| Date             | mar 01/07                                                                         | mer 02/07                                                                         | jeu 03/07                                                                         | ven 04/07                                                                          | sam 05/07                                                                           | dim 06/07                                                                           | lun 07/07                                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Température (°C) | 21-40                                                                             | 22-37                                                                             | 19-36                                                                             | 18-34                                                                              | 17-33                                                                               | 15-31                                                                               | 15-30                                                                               |
| Pluie (mm)       | 0-0                                                                               | 0-3                                                                               | 0-7                                                                               | 0-11                                                                               | 0-4                                                                                 | 0-5                                                                                 | 0-5                                                                                 |
|                  |  |  |  |  |  |  |  |

Une période de canicule est en cours. Le risque d'orage est présent et des pluies sont potentiellement attendues en fin de semaine.

## STADES PHENOLOGIQUES



Stade 31 : Grains de pois



Stade 33 : Fermeture de la grappe

| Cépage     | Grain de plomb | Grains de pois | Fermeture de grappe |
|------------|----------------|----------------|---------------------|
| Merlot     |                |                |                     |
| Côt        |                |                |                     |
| Chardonnay |                |                |                     |

|                |                   |  |
|----------------|-------------------|--|
| Code couleur : | Stade majoritaire |  |
|                | Stade présent     |  |

Tableau des stades phénologiques du vignoble

L'évolution est plutôt lente depuis la semaine dernière.

## BLACK ROT (*Guignardia bidwellii*)

Pour en savoir plus : [Le black-rot sur ephytia](#)

### • Situation au vignoble

De nouveaux symptômes sont observés sur grappes sur le secteur de Soturac.



*Black rot sur baies, Soturac  
(photo CA46)*

**Évaluation du risque :** La phase de sensibilité s'étend jusqu'à fermeture de la grappe sur les parcelles saines. Des repiquages peuvent encore avoir lieu jusqu'à la véraison sur parcelles impactées. Un risque de contamination existe pour chaque pluie significative.



**Techniques alternatives :**

*Il existe des produits de biocontrôle utilisable contre cette maladie. Pour en savoir plus, consultez la note nationale en cliquant [ICI](#).*



**Résistance :** le black rot présente des résistances vis-vis de certains produits phytosanitaires. Il est important de les connaître et d'adapter son calendrier de traitement en fonction de ce risque de résistance. Pour en savoir plus, consultez la note nationale en cliquant [ICI](#)

## MILDIU (PLASMOPARA VITICOLA)

### • Situation au vignoble

Dans le vignoble le mildiou ne progresse plus, la chaleur stabilise les symptômes.

### • Modelisation (Potentiel Système)

*La modélisation indique une pression et des contaminations dans le cadre de parcelles indemnes de mildiou. Elle ne tient pas compte de la pression induite par la présence de symptômes et le risque de repiquages.*


### Historique des contaminations :

#### Situation au 29 juin :

Le risque est toujours faible selon le modèle. Aucune contamination épidémique ni extériorisation de symptômes modélisées cette semaine.

#### Simulation au 6 juillet :

Le risque poursuit sa baisse, il sera faible à très faible selon le secteur à J+7. Le cumul nécessaire pour entraîner des contaminations épidémiques continue d'augmenter, avec au minimum 40mm. Aucune extériorisation de symptôme n'est attendue.



Les histogrammes positifs indiquent la pluviométrie moyenne enregistrée sur le vignoble de Cahors et son impact en termes de contaminations Mildiou.

Les histogrammes négatifs rappellent la hauteur de la pluie et la date correspond à la sortie des symptômes liée à cette pluie (date théorique à droite du trait rouge ou réelle à gauche de ce trait). Une croix sur ces sorties indiquent que la sortie théorique n'a pas été observée au vignoble, le signe √ indique une observation de ces symptômes.

**Evaluation du risque :** Des repiquages peuvent encore avoir lieu. Restez vigilants.



**Techniques alternatives :** L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et peut aider dans la gestion du mildiou. Consultez la liste des produits de bio-contrôle [ici](#).

**Résistance :** le mildiou présente des résistances vis-vis de certains produits phytosanitaires. Il est important de les connaître et d'adapter son calendrier de traitement en fonction de ce risque de résistance. Pour en savoir plus, consultez la note nationale en cliquant [ICI](#)

## OÏDIUM (ERYSIPHE NECATOR)

Pour en savoir plus : [L'oïdium sur ephytia](#)

### • Situation au vignoble

**Évaluation du risque :** La période de sensibilité est en cours sur toutes les parcelles. Elle s'étend jusqu'à « fermeture de la grappe ». Restez vigilant.



**Techniques alternatives :** L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace. Liste des produits de bio-contrôle : <https://ecophytopic.fr/proteger/liste-des-produits-de-biocontrôle>

**Résistance :** l'oïdium présente des résistances vis-vis de certains produits phytosanitaires. Il est important de les connaître et d'adapter son calendrier de traitement en fonction de ce risque de résistance. Pour en savoir plus, consultez la note nationale en cliquant [ICI](#)

## VERS DE LA GRAPPE *(Lobesia botrana)*

Pour en savoir plus : [Lobesia sur ephytia](#)

- **Modélisation**

Fin du vol, stade L1-L2 majoritaire.

- **Situation dans les parcelles**

Le second vol est en cours, pas de ponte observée pour le moment.

**Évaluation du risque** : Surveillez l'apparition des œufs et leur stade dans vos parcelles pour mettre en œuvre une stratégie de gestion du risque sur les parcelles au-dessus du seuil en G1 (comptage des glomérules).

**Techniques alternatives** : La confusion sexuelle est une méthode de lutte biologique.  
<https://www.vignevin-occitanie.com/fiches-pratiques/confusion-sexuelle/>

## CICADELLE VERTE *(Empoasca vitis)*

- **Situation au vignoble**

Les larves de cicadelles sont en nette progression.



Grillures sur feuilles (photo CA46)

**Évaluation du risque** : Le risque est nul pour le moment.

La gestion du ravageur repose sur une surveillance des populations larvaires. Ce ne sont pas les adultes mais les larves qui sont à l'origine des dégâts de grillure. Surveillez les populations de larves.

**Seuil indicatif de risque** : 50 larves de cicadelle pour 100 feuilles.

**Mesures prophylactiques** : L'application d'argile, de talc, ou de lait de chaux comme barrière physique est à mettre en place.

## FLAVESCENCE DOREE *(SCAPHOIDEUS TITANUS)*

Pour en savoir plus : [sur ephytia](#)

## • Situation au vignoble

Évaluation du risque : Les dates d'intervention sont fixées par la DRAAF :



Larves L3 et L5 de *Scaphoideus titanus* (photo CA81)

|    |                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| T1 | Du 7 au 16 juin                                                                                                                                                                                                                  | TERMINE  |
| T2 | 15 jours après le premier traitement en conventionnel : du 22/06 et le 01/07/25                                                                                                                                                  | TERMINE  |
|    | 10 jours après le premier traitement en agriculture biologique : du 17/06 au 28/06/25.                                                                                                                                           | TERMINE  |
| T3 | <p><b>En conventionnel</b> : A réaliser sur les populations adultes, selon analyse de risque (dates à préciser ultérieurement)</p> <p><b>En AB</b> : 10 jours après le T2, selon analyse de risque (du 29 juin au 8 juillet)</p> | En cours |

Le T3 n'est obligatoire que sur les parcelles de vigne-mère.

Dans tous les autres cas, sa réalisation est soumise à l'analyse de risque et est conseillée si :

- présence de foyers (parcelles à plus de 20%) dans l'environnement des parcelles lors de la prospection 2024 (ou antérieurement) ;
- présence de friches de vigne dans l'environnement proche ;
- présence de pieds FD dans la parcelle ...

Pensez à enlever tout pied atteint dès sa détection.

Pour en savoir plus : [DRAAF Occitanie](#)

**Mesures prophylactiques** : l'épamprage permet aux larves de cicadelles de remonter dans la végétation. Il faut épamprer avant le T1 afin d'en augmenter l'efficacité.

## FOCUS MALADIE DU BOIS

Les maladies du bois de la vigne constituent un enjeu majeur en viticulture, affectant la longévité et la productivité des parcelles. L'identification est souvent compliquée car une même maladie peut exprimer différents symptômes.



*Eutypiose (photo IFV Occitanie)*

**Eutypiose** : Causée par *Eutypa lata*, cette maladie se manifeste au printemps par des nécroses sectorielles internes du bois et un dépérissement des ceps. Les symptômes incluent des feuilles plus petites, chlorotiques, avec des nervures nécrosées, et des grappes desséchées. On la qualifie de « maladie du bras mort » car elle conduit souvent à la mort d'une partie de la souche. La transmission se fait principalement par les plaies de taille.

**Esca** : Complexe pathogène impliquant plusieurs champignons dont *Phaeomoniella chlamydospora* et *Phaeoacremonium aleophilum*. Les symptômes foliaires se manifestent en début d'été, ils incluent des taches nécrotiques bordées d'un liseré jaune sur les feuilles, tandis que le bois présente des différentes nécroses, dont la plus caractéristique est connue sous le nom d'amadou. Les ceps atteints montrent un dépérissement progressif et une réduction significative de la production.



*ESCA (photo CA81)*



*BDA (photo CA81)*

**Black Dead Arm (BDA)** : Associée à des champignons du genre *Botryosphaeria*, cette maladie se manifeste en début de floraison sous forme lente ou sévère. La forme lente ressemble à l'ESCA, avec des taches nécrotiques ne laissant qu'une bande verte le long des nervures principales. La forme sévère évolue rapidement vers une défoliation totale et un dessèchement complet du rameau et des grappes.



*Pied de vigne apoplectique (photo CA81)*

**Apoplexie** : Les symptômes d'apoplexie sont caractérisés par un flétrissement très rapide des feuilles et un dessèchement des rameaux plus ou moins généralisé à l'ensemble de la végétation, conduisant à la mort du cep. Ils sont souvent favorisés par des périodes de sécheresse ou de vent fort, avec une évapotranspiration importante. Il existe une forme apoplectique pour différentes maladie du bois (l'ESCA, le Black Dead Arm, l'eutypiose...) mais elle peut aussi être liée à d'autres facteurs tels que l'étranglement du porte-greffe par le greffon, la réalisation d'une très mauvaise taille...

### Prévention des maladies du bois, les mesures prophylactiques :

- Réduire l'inoculum en éliminant les bois infectés, de préférence avant la taille : bras ou ceps morts. De même tous les bois doivent être éliminés de la parcelle avant une nouvelle plantation.
- Soigner la taille : éviter les grosses plaies de taille, tailler le plus tard possible les cépages sensibles (pour l'eutypiose), renouveler les bras atteints...
- Maitriser la vigueur

Il est aussi possible de restaurer les ceps malades afin de limiter la perte du potentiel de production par recépage, greffage ou curetage, ou de les renouveler entièrement.

### Pour en savoir plus :

[Cahier technique IFV sur les maladies du bois](#)

[Les champignons du bois sur ephytia](#)

Les fiches pratiques Vignevin : [Eutypiose](#) ; [ESCA](#) ; [BDA](#)

## DIVERS

---

De nombreuses brûlures liées aux phytos et à la chaleur sont visibles au vignoble.




*Brûlures de phyto (photo CA81)*



*Echaudage (Photo CA81)*

## BIODIVERSITE

---



*Apatura ilia ou Petit mars changeant (photo CA81)*

## Annexe – Notes nationales Biodiversité – BSV (cliquer sur les images)



Des produits de biocontrôle sont autorisés pour lutter contre les bioagresseurs. Ils sont consultables à l'adresse <https://ecophytopic.fr/reglementation/proteger/liste-des-produits-de-biocontrrole>



Des résistances aux produits phytosanitaires existent. Une note nationale décrit l'état des lieux et les recommandations à respecter en la matière. De manière générale, la prévention et la gestion des résistances reposent sur la diversification de l'usage des modes d'action, qui s'appuie sur différentes stratégies : limitation des traitements, association de modes d'action différents, alternance des modes d'action au sein d'un programme et/ou au fil des saisons, mosaïque spatiale.

Retrouvez [ici](#) la note technique 2025 sur les résistances aux maladies en vigne.

**Prochain BSV le 08/07/2025**

### REPRODUCTION DU BULLETIN AUTORISÉE SEULEMENT DANS SON INTÉGRALITÉ (REPRODUCTION PARTIELLE INTERDITE)

Ce bulletin de santé du végétal a été préparé par l'animateur filière viticulture de la Chambre d'Agriculture du Tarn et élaboré sur la base des observations réalisées par la Chambre d'Agriculture du Lot, SODEPAC, Natera, Vitivista, Vínovale Cave des Côtes d'Olt et les agriculteurs observateurs.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La CRA d'Occitanie dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base des observations qu'ils auront réalisées et en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.