



A retenir



BLACK-ROT

Restez vigilants jusqu'à véraison sur parcelle impactée. Le black rot est bien maîtrisé sur le vignoble.

MILDIU

Le mildiou est globalement bien maîtrisé. Restez vigilant en cas d'orage surtout en cas de symptômes sur vos parcelles.

OIDIUM

Restez vigilant sur parcelle avec symptômes jusqu'à la véraison.

TORDEUSES DE LA GRAPPE

Stade majoritaire L2-L3 modélisé. Commencez les comptages de perforations.

CICADELLES VERTES

Des adultes sont observés, les larves sont encore sous le seuil, surveillez vos parcelles.

CICADELLE DE LA FLAVESCENCE DOREE

ERRATUM : 4 communes du Tarn sont passées à 3 traitements obligatoires cette année : Gaillac, Lisle sur Tarn, Montans, Villeneuve sur Vère.

T3 du 3 juillet au 13 juillet (conventionnel) / En bio : 10 jours après le T2

Directeur de publication :
Denis CARRETIER
Président de la Chambre
Régionale d'Agriculture
d'Occitanie
BP 22107
31321 CASTANET
TOLOSAN Cx
Tel 05.61.75.26.00

Annexes : [Liste des mesures alternatives et prophylactiques en viticulture](#)
[La note technique commune vigne 2026](#)

METEO

• Cumul de pluie la semaine précédente

Station	lundi 29 juin 2026	mardi 30 juin 2026	mercredi 1 juillet 2026	jeudi 2 juillet 2026	vendredi 3 juillet 2026	samedi 4 juillet 2026	dimanche 5 juillet 2026	Cumul 7 derniers jours	Cumul depuis maturité moyenne de la masse des œufs en Midi Pyrénées (07/04/26)
Le Verdier (radar)	0	0	0	0	0	0	0	0	130.4
Cestayrols (radar)	0	0	0	0	0	0	0	0	123.2
Senouillac (radar)	0.2	0	0	0	0	0	0	0.2	121.9
Gaillac (radar)	0.2	0	0	0	0	0	0	0.2	122.6
Rabastens (radar)	0.1	0	0	0	0	0	0	0.1	125.4
Cadalen (radar)	0.1	0	0	0	0	0	0	0.1	184.7
Cunac (radar)	0.7	0	0	0	0	0	0	0.7	147.2

Comité de validation :
Chambre d'agriculture du
Tarn, Chambre régionale
d'Agriculture d'Occitanie,
DRAAF Occitanie, Vinovalie
Cave de Rabastens

écophyto
Réduire et améliorer l'utilisation des phytos

Action pilotée par le Ministère
chargé de l'agriculture et le
ministère chargé de l'écologie,
avec l'appui financier de
l'Agence Française pour la
Biodiversité, par les crédits
issus de la redevance pour
pollutions diffuses attribués au
financement du plan Ecophyto.

• **Prévisions du 7 juillet au 14 juillet (Source MétéoBlue)**

Date	mar 07/07	mer 08/07	jeu 09/07	ven 10/07	sam 11/07	dim 12/07	lun 13/07
Température (°C)	17-40	17-40	19-41	19-39	18-41	20-40	17-37
Pluie (mm)	0-0	0-0	0-0	0-1	0-0	0-0	0-0
							

STADES PHENOLOGIQUES




Stade 33
Fermeture de grappe

Stade 34
Premiers grains vérés


Stade 35
Début véraison

Cépage	Pre-fermeture	Fermeture de grappe	Premiers grains vérés	Début véraison
Gamay				
Loin de l'oeil				
Syrah				
Fer servadou				
Duras				
Mauzac				
Merlot				

Tableau des stades phénologiques du vignoble

Code couleur :	Stade majoritaire	
	Stade minoritaire	

Les premiers grains vérés sont observés sur Gamay, mais aussi sur Fer, Merlot et Duras.



Début véraison sur Fer

MILDIOU

- **Situation au vignoble**

Pas d'évolution cette semaine.

- **Modélisation (Potentiel Système) :**

Modélisation :

Situation au 5 juillet :

La pression a diminué, le risque est très faible sur une majorité de secteurs. Aucune contamination épidémique ni extériorisation de symptômes issus de contaminations primaires modélisées cette semaine.

Simulation au 12 juillet :

Le risque potentiel reste très faible dans le vignoble à J+7 en l'absence de pluie. Les cumuls nécessaires pour entraîner des contaminations épidémiques sont importants (30 à 70mm).

Contaminations possibles le :	Temps d'incubation minimum modélisé	Sorties de taches modélisées à partir de :	Taches observées au vignoble
4-5-6 mai	19 j	23-25 mai	Oui isolées sur TNT + vignoble
10-11 mai	17 j	28 mai	✓
14-15-16 mai	15 j	31 mai	non
4 juin	11 j	13 juin	✓

Evaluation du risque : Le risque est nul. A partir de la véraison, seuls des repiquages sont possibles sur feuilles en présence d'eau libre. Il faut aussi préserver l'état sanitaire du feuillage afin qu'il reste fonctionnel jusqu'à la maturation et la mise en réserve.

Méthodes prophylactiques :

- Les mesures limitant les entassements de végétation (ébourgeonnage, palissage, effeuillage...) réduisent la durée d'humectation des grappes et favorisent la gestion du risque au cœur de la souche.
- Attention aux écimages excessifs (rognages) qui favorisent le départ des entre-cœurs et augmentent l'entassement du feuillage.

BLACK ROT *(Guignardia bidwellii)*

• Biologie

La sensibilité maximale des grappes se situe entre la nouaison et fermeture de la grappe, elle diminue ensuite jusqu'au début véraison.



Evolution des symptômes de black-rot – Photo CA81

Attention ! Eviter les confusions (Source : Guide de l'observateur la Vigne)



• Situation au vignoble

Il n'y a pas d'évolution au vignoble et sur TNT.

Évaluation du risque : La phase de sensibilité est terminée sur les parcelles saines ayant atteint le stade de fermeture de la grappe. Des repiquages peuvent encore avoir lieu jusqu'à la véraison sur parcelles impactées sur grappes. Rester vigilant en cas d'orage en présence de symptôme sur parcelle contaminée.

Mesures prophylactiques : Arracher les vignes abandonnées



Résistance : le black rot présente des résistances vis-vis de certains produits phytosanitaires. Il est important de les connaître et d'adapter son calendrier de traitement en fonction de ce risque de résistance. Pour en savoir plus, consultez la note nationale en cliquant [ICI](#)

OÏDIUM (Erysiphe necator)

• Situation au vignoble

Des anciens symptômes sont encore visibles sur parcelles contaminées, mais pas d'évolution à ce jour. Au vignoble, la maladie reste maîtrisée.



Symptômes sur baies de Gamay

Évaluation du risque : Sur parcelle saine, la protection peut être stoppée.

Sur parcelle présentant des symptômes, il faut rester vigilant jusqu'à la **véraison** afin de limiter la propagation du champignon.

Techniques alternatives : L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace.

Liste des produits de bio-contrôle : <https://ecophytopic.fr/protéger/liste-des-produits-de-biocontrôle>

L'effeuillage permet l'aération de la zone des grappes et ainsi la création d'un microclimat défavorable aux maladies.

VERS DE LA GRAPPE (Lobesia botrana)

• Modélisation

Stade majoritaire L2-L3.

• Situation au vignoble

Le vol d'eudemis est terminé, très peu de papillons piégés cette semaine.

Des perforations sont visibles tous secteurs confondus.



Foyer de perforations de larves d'eudemis

Évaluation du risque : Les perforations sont à dénombrer pour évaluer le niveau de pression en fin de G2 pour la gestion de la G3. Comptez les perforations sur vos parcelles, cette semaine sur les secteurs précoces et jusqu'à semaine prochaine sur secteurs tardifs.

Seuil indicatif de risque :

- 10 perforations pour 100 grappes en fin de G2
- 5 perforations pour 100 grappes en fin de G2 (parcelle en confusion)

Techniques alternatives : La confusion sexuelle est une méthode de lutte biologique.
<https://www.vignevin-occitanie.com/fiches-pratiques/confusion-sexuelle/>

Favoriser la présence de prédateurs naturels : araignées, chrysopes, syrphes, chauve-souris... Des lâchers de parasitoïdes sont possibles (trichogrammes).

Ne pas confondre : des dégâts d'eulia de G2 sont ponctuellement observés dans certaines parcelles. Les jeunes larves se nourrissent des baies et provoquent des blessures superficielles de l'épiderme et de la pulpe jusqu'à la récolte. Les chenilles d'eulia possèdent une tête vert foncé avec un corps pouvant aller du vert clair au vert foncé. Les chenilles d'eudemis ont une tête et un thorax jaune brun.



A gauche : larve d'eudemis et perforation d'eudemis – A droite : Larve d'eulia et dégâts (Photo CA81)

CICADELLE VERTE (*Empoasca vitis*)

• Situation au vignoble

Des adultes sont observés mais les larves sont encore la plupart du temps sous le seuil (0-20%).
Pas d'évolution des symptômes de grillures.

Grillures sur cépage blanc




Évaluation du risque : Surveillez vos parcelles.

Ce ne sont pas les adultes mais les larves qui sont à l'origine des dégâts de grillure.

Seuil indicatif de risque : 100 larves de cicadelle pour 100 feuilles

Mesures prophylactiques : L'application d'argile comme barrière physique est à mettre en place.

FLAVESCENCE DOREE (*SCAPHOIDEUS TITANUS*)



Evolution du stade larvaire

Évaluation du risque : Les dates d'intervention ont été fixées par la DRAAF.

<https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/flavescence-doree-dates-d-interventions-pour-les-traitements-obligatoires-2026-a9988.html>

T1	Du 3 au 14 juin	Terminé
T2	en conventionnel : 15 jours après le T1 soit du 18 juin au 29 juin 2026 en AB : 10 jours après le T1 soit du 13 juin au 24 juin 2026	Terminé
T3	Du 3 juillet au 13 juillet (conventionnel) En bio : 10 jours après le T2	En cours terminé

ERRATUM : 4 communes du Tarn sont passées à 3 traitements obligatoires cette année : Gaillac, Lisle sur Tarn, Montans, Villeneuve sur Vère.

Tableaux des communes à traitements obligatoires :

[Flavescence dorée : Dates d'interventions pour les traitements obligatoires - 2026 | DRAAF Occitanie](#)

Mesures prophylactiques : l'épamprage permet aux larves de cicadelles de remonter dans la végétation. Il faut épamprer avant le T1 afin d'en augmenter l'efficacité.

DIVERS

L'échaudage est toujours très présent au vignoble, les dégâts sur grappes peuvent être importants, d'autant si les rangs sont orientés Nord-Sud. Le stress hydrique commence à avoir des conséquences surtout sur les parcelles à faible réserve utile.



Des galles phylloxériques peuvent être observées sur certains cépages (ici Gamay)



Annexe – Notes nationales Biodiversité – BSV (cliquer sur les images)



Prochain BSV le 21 juillet 2026



Produits de Biocontrôle

Résistances aux pesticides

Des produits de biocontrôle sont autorisés pour lutter contre les bioagresseurs. Retrouvez la liste [ici](#)

Des résistances aux produits phytosanitaires existent. Une note nationale décrit l'état des lieux et les recommandations à respecter en la matière. Retrouvez la note 2026 [ici](#).

REPRODUCTION DU BULLETIN AUTORISEE SEULEMENT DANS SON INTEGRALITE (REPRODUCTION PARTIELLE INTERDITE)

Ce bulletin de santé du végétal a été préparé par l'animateur filière viticulture de la Chambre d'Agriculture du Tarn et élaboré sur la base des observations réalisées par la Chambre d'Agriculture du Tarn et Vinovalie.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La CRA d'Occitanie dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base des observations qu'ils auront réalisées et en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.

Financé dans le cadre
de la stratégie **écophyto**



GOUVERNEMENT

*Justice
Égalité
Environnement*

Avec le soutien financier de



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Justice
Égalité
Environnement*



OFB

Office Français de la Biodiversité