



A retenir

EUDEMIS	3 ^{ème} génération à venir
OÏDIUM	Fin de période de sensibilité
FLAVESCENCE DOREE	Symptômes bien visibles
ACCIDENTS CLIMATIQUES	Vague de chaleur et incendies

Annexes : [Liste des mesures alternatives et prophylactiques en viticulture](#)
[Note-technique-commune-vigne-2026.pdf](#)
[BSV LR mars 2026 annexes modèles](#)

PLUVIOMETRIE

Répartition des pluies – cumul hebdomadaire du 29/06 au 05/07/2026 – échelle du Min au Max (0 à 101 mm)

Source IFV



4260705:
mini=0.0mm - maxi=101.4mm

Valeur
Elevée : 100
Faible : 0

Directeur de publication :

Denis CARRETIER
Président de la Chambre
Régionale d'Agriculture
d'Occitanie
BP 22107
31321 CASTANET
TOLOSAN Cx
Tel 05.61.75.26.00

Dépôt légal : à parution

Comité de validation :
Chambres d'agriculture de
l'Aude, du Gard, de l'Hérault,
des Pyrénées-Orientales,
Chambre régionale
d'agriculture d'Occitanie,
IFV, FREDON Occitanie,
DRAAF Occitanie

écophyto

Réduire et améliorer l'utilisation des phytos

Action pilotée par le Ministère
chargé de l'agriculture et le
ministère chargé de l'écologie,
avec l'appui financier de
l'Agence Française pour la
Biodiversité, par les crédits
issus de la redevance pour
pollutions diffuses attribués au
financement du plan Ecophyto

		29-juin	30-juin	1-juil.	2-juil.	3-juil.	4-juil.	5-juil.
AUDE	ALAIGNE	0,1	0	0	0	0	0	0
	CAZILHAC	0	0	0	0	0	0	0
	LEZIGNAN	0	0	0	0	0	0	0
	LIMOUX	0	0	0	0	0	0	0
	NARBONNE	0	0,1	0	0	0	0	0
GARD	AIGUES-MORTES	0	0	0	0	0	0	0
	BARJAC	0	0	0	0	0	0	0
	CARDET	0,3	0	0	0	0	0	0
	CHUSCLAN	0	0	0	0	0	0	0
	SAINT-GILLES	0	0	0	0	0	0	0
	VILLEVEILLE	0	0	0	0	0	0	0
HERAULT	MARSEILLAN	0	0,1	0	0	0	0	0
	OLONZAC	0	0	0	0	0	0	0
	POUZOLLES	0	0,1	0	0	0	0	0
	PUISSERGUIER	0	0,1	0	0	0	0	0
	SAINT-JEAN-DE-FOS	0	0	0	0	0	0	0
	VALFLAUNES	0,8	0	0	0	0	0	0
PO	ESTAGEL	0	0	0	0	0	0	0
	LAROCHE-DES-ALBERES	1,3	0	0	0	0	0	0
	LLUPIA	0,3	0	0	0	0	0	0
	PIA	0,2	0	0	0	0	0	0
	RODES	0,1	0	0	0	0	0	0

STADES PHENOLOGIQUES

Dans les parcelles observées, les stades phénologiques varient de :

- « **fermeture de la grappe** » (stade 33 ou L ou BBCH 77) dans les **secteurs tardifs et/ou parcelles tardives**
- à « **début véraison** » (stade 35 ou BBCH 81) dans les **parcelles en zone précoce**.

Le stade majoritairement observé est « **fin fermeture de la grappe** » (BBCH 79).




Stade fermeture de la grappe

OÏDIUM (*Erysiphe necator*)

Données de modélisation

× DAC ADN






Stade phénologique :
Considéré comme sensible.

Facteur Météo d'Infection :
Les conditions météo sont très peu propices à l'infection à partir du 05/07. Elles ne redeviendront modérément propices qu'à partir du 11/07.

Sporée aérienne *E. necator* :
32 conidies mesurées sur l'échantillon du 02/07.

Risque épidémique :
Le risque est entre 3 et 4 jusqu'au 08/07, puis diminué à 2.

Oïdium - suivi des paramètres épidémiques - 2026 - Prat de Cest (11) 	Stade phénologique : Considééré comme sensible. Facteur Météo d'Infection : Les conditions météo sont très peu propices à l'infection à partir du 30/06. Elles ne redeviendront propices qu'à partir du 11/07. Sporée aérienne <i>E. necator</i> : 6 conidies mesurées sur l'échantillon du 02/07 Risque épidémique : Le risque se maintient à 4 jusqu'au 02/07 avec de faibles détections de conidies. Ce risque diminue ensuite jusqu'à atteindre le niveau 2 en fin de semaine.
Oïdium - suivi des paramètres épidémiques - 2026 - Vauvert (30) 	Stade phénologique : Fin de période de sensibilité. Facteur Météo d'Infection : Les conditions météo sont très peu propices à l'infection à partir du 30/06. Elles redeviendront propices qu'à partir du 10/07. Sporée aérienne <i>E. necator</i> : Aucune conidie mesurée sur l'échantillon du 02/07. Risque épidémique : Le risque passe de 3 à 4 entre le 18 et 24/06, hausse expliquée par la forte hausse de FMI et la détection de conidie. Le risque diminue à 1 à partir du 05/07.
Oïdium - suivi des paramètres épidémiques - 2026 - Venejan (30) 	Stade phénologique : Considééré comme sensible. Facteur Météo d'Infection : Les conditions météo sont très peu propices à l'infection à partir du 30/06. Elles redeviendront moyennement propices qu'à partir du 10/07. Sporée aérienne <i>E. necator</i> : Aucune conidie mesurée sur l'échantillon du 03/07. Risque épidémique : Le risque est à 2 jusqu'à la fin de la semaine à venir.



• Situation au vignoble

× Aude

Comme la semaine dernière, la maladie a tendance à évoluer uniquement dans les parcelles déjà atteintes principalement sur les cépages sensibles. On ne note pas une augmentation de la fréquence des symptômes sur le reste du vignoble.

× Gard

Pas d'évolution notable depuis la semaine dernière : la grande majorité des parcelles présente peu ou pas de symptômes. Sur cépages peu sensibles, les symptômes observés sont éparés et, dans de rares parcelles, l'intensité augmente légèrement. Dans les parcelles sensibles, la fréquence des symptômes peut aller jusqu'à 80 % de grappes touchées.

× Hérault

Dans les parcelles où les grappes sont maintenant bien fermées, voire proche de la véraison, les fréquences et intensités sur grappes se stabilisent et le champignon est de moins en moins actif.

Dans quelques parcelles des unités agroclimatiques du Minervois, de la Vallée de l'Orb Lodévois, des Basse et Moyenne Vallée de l'Hérault et du Montpelliérain, des attaques significatives sont observées (plus de 30 % des grappes avec symptômes). Dans ces parcelles à sensibilité tardive (Carignan, Chardonnay notamment), les symptômes restent actifs malgré le début de véraison et ce d'autant plus que les parcelles sont vigoureuses et que les grappes restent ombragées. Les 1^{ers} éclatements de baies sont notés.



Symptômes d'oïdium sur grappes

✖ Pyrénées-Orientales

La maladie est toujours présente dans le vignoble départemental. Les fortes chaleurs de ces derniers jours impactent fortement l'évolution la maladie.

Avec ces conditions climatiques chaudes, la fréquence et l'intensité des symptômes sur grappes sont en diminution voire arrêtés. Cependant quelques parcelles présentent encore des symptômes.

Evaluation du risque : à partir de la fermeture de la grappe, la sensibilité de la vigne à la maladie décroît jusqu'à la véraison complète des grappes. Cependant, quelques cépages (Piquepoul, Muscats, Chardonnay...) restent sensibles jusqu'à véraison.

Techniques alternatives :



Il existe des produits de biocontrôle utilisables contre cette maladie. Pour connaître ces produits et leurs utilisations consulter [l'annexe ci-jointe](#).



Résistance : l'oïdium présente des résistances vis-vis de certains produits phytosanitaires. Il est important de les connaître et d'adapter son calendrier de traitement en fonction de ce risque de résistance. Pour en savoir plus, consultez la note nationale en cliquant [ICI](#)

MILDIU (Plasmopara viticola)

• Données de la modélisation

✖ Potentiel Système (modélisation arrêtée au 5 juillet compris) :

	Situation au 5 juillet	Simulation au 13 juillet
Risque modélisé Mildiou	Le Risque est faible. Il peut être localement fort sur quelques petites zones : Espérazza, Valmigère (11), Bédarieux (34), Carnas, Ceyrac, Saint Anastasie (30).  fait le 29/06/2026	Le Risque modélisé est stable à 7 jours.  fait le 29/06/2026
Contaminations modélisées	Les pluies du 29 juin ont détecté des contaminations épidémiques sur : (30) La Vaunage, Salavès	Sur la semaine à venir, aucune contamination épidémique n'est annoncée.
Sorties modélisées	Les sorties de tâches des contaminations du 29 juin sont annoncées à partir du 4 juillet.	

Vert = Rien à signaler

Bleu = démarrage de nouvelles contaminations


Interprétation : le risque régional est très faible. Quelques nouveaux symptômes sur feuilles pourraient apparaître sur les événements pluvieux localisés et intenses de fin juin si les conditions climatiques le permettent.



✕ **Milstop** (modélisation arrêtée au 5 juillet compris) :

	Semaine du 22 au 28 juin				Semaine du 29 juin au 5 juillet			
	date de contaminations	Risque foyer primaire	Repiquages	Sortie de tache à partir du :	date de contaminations	Risque foyer primaire	Repiquages	Sortie de tache à partir du :
LEUCATE	-	-	-	-	-	-	-	-
ALAIGNE	28/6	-	R	8/7	-	-	-	-
LEZIGNAN	-	-	-	-	-	-	-	-
CARCASSONNE	28/6	-	R	8/7	-	-	-	-
NARBONNE	-	-	-	-	-	-	-	-
BAGNOLS SUR CEZE	-	-	-	-	-	-	-	-
TAVEL	-	-	-	-	-	-	-	-
GENERAC	-	-	-	-	-	-	-	-
VAUVERT	-	-	-	-	-	-	-	-
CARDET	-	-	-	-	29/6	-	R	13/7
SOMMIERES	-	-	-	-	-	-	-	-
BOURDIC	-	-	-	-	-	-	-	-
ST JEAN DE FOS	-	-	-	-	-	-	-	-
VALFLAUNES	-	-	-	-	-	-	-	-
MARSEILLAN	-	-	-	-	-	-	-	-
POUZOLLES	24/6	-	R	5/7	-	-	-	-
BEZIERS	24/6	-	R	5/7	-	-	-	-
ST CHRISTOL	-	-	-	-	-	-	-	-
PRADES SUR VERNAZOBRE	24/6	-	R	5/7	-	-	-	-
OLONZAC	-	-	-	-	-	-	-	-
VILLEMAGNE LARGENTIERE	24 au 26/6	-	R	4/7	-	-	-	-
FRONTIGNAN	-	-	-	-	-	-	-	-
PLAISSAN	-	-	-	-	-	-	-	-
LAURENS	24/6	-	R	5/7	-	-	-	-
LAROQUE DES ALBERES	-	-	-	-	-	-	-	-
PERPIGNAN RIVESALTES	-	-	-	-	-	-	-	-
SAINT PAUL FENOUILLET	-	-	-	-	-	-	-	-

D'après la modélisation, les conditions météorologiques enregistrées entre le 29 juin et le 5 juillet sont susceptibles de générer des rares repiquages sur la station de Cardet dans le Gard. Ces symptômes pourraient sortir à partir du 13 juillet dans les parcelles où la maladie est déjà présente.

✕ **DAC ADN :**



Mildiou - suivi des paramètres épidémiques - 2026 - Prat de Cest (11) 	Stade phénologique : Considéré comme sensible. Facteur Météo d'Infection : Dernier pic de FMI enregistrés du 24 au 26/06 (4 h). Sporée aérienne <i>P. viticola</i> : Aucune sporée aérienne mesurée sur l'échantillon du 02/07. Risque épidémique : Le risque est à 2 jusqu'au 012/07.
Mildiou - suivi des paramètres épidémiques - 2026 - Vauvert (30) 	Stade phénologique : Fin de période de sensibilité. Facteur Météo d'Infection : Dernier pic de FMI enregistrés le 29/06 (4 h). Sporée aérienne <i>P. viticola</i> : 1778 sporanges mesurés sur l'échantillon du 02/07. Risque épidémique : Les niveaux de sporée mesurés correspondent aux sorties de symptômes observées sur la parcelle. Le risque diminue à 0 parallèlement au début de la véraison.
Mildiou - suivi des paramètres épidémiques - 2026 - Venejan (30) 	Stade phénologique : Considéré comme sensible. Facteur Météo d'Infection : Dernier pic de FMI enregistrés le 25/06 (1 h). Sporée aérienne <i>P. viticola</i> : Aucune sporée aérienne mesurée sur l'échantillon du 03/07. Risque épidémique : Le risque reste à 4 jusqu'au 01/07, puis diminue à 2 jusqu'au 12/07.



— FMI Mildiou (heure) — Log(qté sporange) — Risque Mildiou



• Situation au vignoble :

× Vignoble régional

Cette semaine aucun nouveau symptôme n'est observé et les symptômes sont le plus souvent secs. Quelques symptômes de mildiou mosaïque sont observés.

Évaluation du risque : il est maintenant faible, l'arrivée de la véraison diminue fortement le risque.

Globalement, les conditions climatiques de la semaine à venir ne sont pas favorables à de nouvelles contaminations et au développement de la maladie, mais attention aux humidités qui peuvent relancer la maladie dès que les températures seront moins élevées.

Techniques alternatives :



Il existe des produits de biocontrôle utilisables contre cette maladie. Pour connaître ces produits et leurs utilisations consulter [l'annexe ci-jointe](#).



Résistance : le mildiou présente des résistances vis-vis de certains produits phytosanitaires. Il est important de les connaître et d'adapter son calendrier de traitement en fonction de ce risque de résistance. Pour en savoir plus, consultez la note nationale en cliquant [ICI](#)

BLACK ROT *(Guignardia bidwellii)*

• Situation au vignoble

✖ Gard

Aucune évolution des symptômes n'est notée.

Evaluation du risque : le risque diminue avec l'avancée des stades phénologiques.



Techniques alternatives :

Il existe des produits de biocontrôle utilisables contre cette maladie. Pour connaître ces produits et leurs utilisations consulter la note biocontrôle du Guide des Vignobles [ICI](#).



Résistance : le black rot présente des résistances vis-à-vis de certains produits phytosanitaires. Il est important de les connaître et d'adapter son calendrier de traitement en fonction de ce risque de résistance. Pour en savoir plus, consultez la note nationale en cliquant [ICI](#)

TORDEUSES DE LA GRAPPE

• Eudémis (*Lobesia botrana*)

✖ Données de modélisation : ACTIV (modélisation arrêtée au 5 juillet)

	Début du vol de 3ème génération (10 % des imagos)	Début des pontes de 3ème génération (10 % des pontes)	éclosions (10% de larves L1)
ALAINNE	-	-	-
CARCASSONNE	16/7	21/7	-
LEUCATE	13/7	18/7	-
LEZIGNAN	12/7	17/7	-
NARBONNE	8/7	13/7	17/7
BAGNOLS SUR CEZE	14/7	19/7	-
BOURDIC	-	-	-
CARDET	-	-	-
GENERAC	12/7	16/7	-
SOMMIERES	17/7	-	-
TAVEL	17/7	-	-
VAUVERT	11/7	15/7	-
BEZIERS	8/7	13/7	17/7
FRONTIGNAN	7/7	12/7	16/7
LAURENS	15/7	19/7	-
MARSEILLAN	11/7	15/7	-
OLONZAC	9/7	14/7	19/7
PLAISSAN	12/7	17/7	-
POUZOLLES	9/7	14/7	19/7
PRADES SUR VERNAZOBRE	11/7	16/7	-
ST CHRISTOL	14/7	18/7	-
ST JEAN DE FOS	14/7	19/7	-
VALFAUNES	18/7	-	-
VILLEMAGNE L'ARGENTIERE	-	-	-
LAROQUE DES ALBERES	4/7	9/7	14/7
PERPIGNAN RIVESALTES	5/7	10/7	15/7
SAINT PAUL FENOUILLET	18/7	-	-

✖ Aude

Le vol de 2^{ème} génération se poursuit encore en zone tardive.

La fréquence des perforations dans les parcelles impactées varie de 5 à 100 %. Ces dégâts sont répertoriés pour le moment dans le Littoral (Cabanes de Fleury, Bages...)

Les stades larvaires des chenilles varient de L1 à L3.

commune du piège + lieu-dit de la parcelle	Carlipa- St André	Lauraguel - Ruisseau de l'Albane	Villars	Bouriège	Espéraza	Alaigne - Cazes	Pezens-Molière
nb papillons G2 semaine 27	8	54	85	63	61	0	0
nb papillons G2 semaine 28	0	13	9	27	29	1	0
commune du piège + lieu-dit de la parcelle	Montréal - Escapat	Mazerolles Razes - Rau Ouest	Arzens - Fontorbe	Preixan	Sallèles Cabardès villatade	Issel- en Cals	Pezens pourqué
nb papillons G2 semaine 27	0	0	0	0	0	15	0
nb papillons G2 semaine 28	0	0	0	0	0	2	0

× Gard

Le vol de 2^{ème} génération est terminé. Quelques pontes au stade tête noire sont observées dans la Vallée du Rhône Nord sans dépassement de seuil. Des perforations sont visibles dans l'ensemble des secteurs en nombre parfois important dans des parcelles à historique, vigoureuses et avec irrigation. Des larves de L4 à L5 sont observées.

× Hérault

Les perforations de la 2^{ème} génération sont désormais bien visibles. Dans quelques parcelles du réseau d'épidémiosurveillance, le nombre de perforations pour 100 grappes est au-delà des 20 % et plus exceptionnellement peut monter jusqu'à 150 %.

× Pyrénées-Orientales

Le vol de 2^{ème} génération est terminé dans le vignoble départemental.

Les foyers de perforations sont visibles dans le vignoble.

Évaluation du risque : nous sommes en fin de cycle de cette 2^{ème} génération et le vol de 3^{ème} génération est susceptible de démarrer au cours de cette semaine.

Pensez à changer les plaques engluées et les capsules dans les pièges pour suivre le début du vol et le dépôt des pontes de 3^{ème} génération



Perforation et larve

Seuil indicatif de risque : 5 à 10 pontes pour 100 grappes.

• Pyrale du Daphné (*Cryptoblabes gnidiella*)

× Aude

Le vol est globalement en stagnation ou en régression selon les secteurs. Dans les parcelles de référence, pour le moment, comme la semaine dernière il n'a pas été observé de nids ou des chenilles.

Commune	Paraza	Raissac d'aude	St Nazaire	ginestas pouzeranque	Coursan	Canet d'aude
nb papillons semaine 27	3	0	0	3	0	0
nb papillons semaine 28	2	1	1	0	0	3
Commune	Homps	Laure Minervoix	Rieux Minervoix	Sallèles Cabardès	Aigues- Vives	Embres
nb papillons semaine 27	2	0	0	0	0	3
nb papillons semaine 28	5	2	0	0	0	2
Commune	Cabanes de Fleury	Bages	Talairan	Portel des Corbières	Caves	Bagnols-Parazols
nb papillons semaine 27	0	0	0	4	33	0
nb papillons semaine 28	1	0	0	0	0	0
Commune	Arzens	Carcassonne-Herminis	Pezens-Molière	Tuchan	Cascastel	
nb papillons semaine 27	0	0	0	1	0	
nb papillons semaine 28	0	0	0	0	0	

× Gard

Les captures sont faibles dans l'ensemble du département. Dans la Vaunage et les Costières, les captures s'intensifient avec une trentaine de papillons dans certains pièges.

Comme la semaine dernière, quelques nids avec présence de larves sont observés dans plusieurs secteurs : les Costières, la Vaunage, la Vallée du Rhône Sud et le Bassin Alésien.



Larve au sein d'une grappe

× Hérault

Cette semaine, les effectifs hebdomadaires des pièges restent globalement faibles. C'est dans la Basse Vallée de l'Hérault que les captures sont les plus régulières.

De rares larves sont toujours observées dans de rares parcelles avec et sans historique.

× Pyrénées-Orientales

Quelques papillons sont notés dans les pièges du réseau d'observation.

Évaluation du risque : il augmente légèrement, relever régulièrement les pièges et observer les larves au sein des grappes.

• *Eulia* (*Argyrotaenia ljugiana*)

× Aude

Le vol est assez aléatoire avec une augmentation cette semaine pour le piège de Preixan avec 15 papillons capturés, il reste nul pour le piège d'Herminis (hameau de Carcassonne).

Évaluation du risque : le risque est en diminution

FLAVESCENCE DOREE

• Éléments de biologie

Les caractéristiques de l'expression de la maladie sont :

- la **décoloration du feuillage** (rougissement pour les cépages rouges, jaunissement pour les cépages blancs) plus ou moins bien délimitée par les nervures. Les feuilles deviennent

« cassantes » et s'enroulent en fonction des cépages ;

- le **dessèchement des rafles** avec des inflorescences avortées ou des baies partiellement ou totalement flétries, qui peuvent aller jusqu'à la chute complète des grappes ;

- l'**aoûtement absent ou partiel**, aspect caoutchouteux des sarments, qui donne un port « retombant » à la souche atteinte.

Ces dégâts sont observés jusqu'à la chute des feuilles.



Symptômes sur cépages rouge et blanc

• Situation au vignoble

× Vignoble régional

Quelques larves sont toujours présentes au vignoble, mais les adultes sont maintenant majoritaires.

Les symptômes continuent de s'exprimer au vignoble.

Évaluation du risque : il est important.

Mesures prophylactiques : Dès à présent, il est primordial de :

- repérer et de marquer les souches atteintes,
- déclarer obligatoirement les symptômes de jaunisses de la vigne à la FREDON/FDGDON ou l'application [Vigiflav](#) (Cf. Arrêtés préfectoral et ministériel),
- arracher ou tailler « à blanc » les souches atteintes le plus tôt possible (après passage de la FREDON/FDGDON) pour limiter les contaminations.



Cicadelle adulte

POURRITURE GRISE (*Botrytis cinerea*)

× Hérault

Quelques baies avec de la pourriture grise sont observés en lien avec des perforations de la 2^{ème} génération d'eudémis.

Évaluation du risque : il est globalement faible, il augmente dans les parcelles très vigoureuses.

CICADELLE VERTE *(Hebatia vitis anciennement Empoasca vitis)*

× Vignoble régional

Des larves et des adultes sont observés au vignoble. Leur nombre est faible. Des symptômes sont observés.

Évaluation du risque : à ce jour, le risque est nul.

Seuil indicatif de risque : 200 larves pour 100 feuilles observées.



Début des symptômes de cicadelle verte

MALADIE DU BOIS

× Vignoble régional

Les symptômes de Black-Dead-Arm et/ou Esca sont de plus en plus visibles. Les formes lentes et apoplectiques sont présentes au vignoble.

Évaluation du risque : repérez les souches exprimant des symptômes qui pourront être gérées par voie prophylactique.

RAVAGEURS SECONDAIRES

• Cochenilles

× Gard, Hérault et Pyrénées-Orientales

Elles sont observées localement dans des grappes.

Évaluation du risque : Il peut être localement important.

• Erinose

× Gard, Hérault et Pyrénées-Orientales

Présence dans certaines parcelles.

Évaluation du risque : il est faible.

• Oiseaux

× Hérault

Des dégâts sont localement constatés sur variétés très précoces telles que le Fleurtaï.

Évaluation du risque : il peut être localement important.

ACCIDENT PHYSIOLOGIQUE

• Stress hydrique

× Vignoble régional

Les symptômes de sécheresse sont plus régulièrement observés avec des débuts de défoliations en cœur de souches, des arrêts de croissance, et des jaunissements des feuilles de la base des ceps typiques d'une réaction à la chaleur et surtout à la sécheresse induite par ces conditions météorologiques chaudes et sèches.

Dans quelques parcelles, les baies ne grossiront plus et les grappes ne "fermeront" pas. Des débuts de flétrissements de grappes sont aussi visibles dans quelques parcelles.



Symptômes de sécheresse

L'absence de pluies et les fortes chaleurs limitent la bonne reprise des plantiers et ce d'autant plus que les chantiers de plantations ont dû être repoussés à causes de pluies et de l'hydromorphie de sortie d'hiver.

ACCIDENTS CLIMATIQUES

• Stress thermique ou échaudage

× Aude

L'échaudage continue au niveau des grappes qui ne sont pas protégées par les feuilles notamment dans les parcelles en stress hydrique et en situation de faible vigueur.

× Gard

Des dégâts d'échaudage sont plus fréquemment visibles sur feuilles et sur grappes.

× Hérault


Des symptômes d'échaudage sont régulièrement observés sur feuilles et grappes dans plusieurs secteurs du vignoble. Les grappes affectées lors du premier épisode de fortes chaleurs de la mi-juin présentent désormais un dessèchement partiel à total des baies.

Lors des observations de ce début de semaine, de nouveaux symptômes sont également identifiés à la suite de la récente vague de chaleur. Ils concernent notamment les secteurs des Hauts Coteaux, des Basse Vallée et Moyenne Vallée de l'Hérault et le Montpelliérain.

La vigilance reste de mise, les symptômes pouvant continuer à s'exprimer dans les jours suivant les épisodes de températures élevées.



Symptômes d'échaudage



× Pyrénées-Orientales

Des symptômes d'échaudage sont observés dans quelques parcelles du vignoble départemental. Le nombre de parcelles avec ces symptômes est stable mais l'intensité de l'échaudage augmente.

INCENDIES

× Aude, Gard

Des incendies se sont déclarés dans le courant de la semaine, les remontées d'informations sont encore en cours.

× Hérault

La dernière semaine a été marquée par plusieurs incendies ayant impacté le vignoble héraultais :
1^{er} juillet :

- Le plus important s'est déclaré dans le secteur du **Minervois (Beaufort, Oupia, Aigne)**, dans un contexte de vent fort et de risque incendie maximal. L'incendie a parcouru plusieurs centaines d'hectares de végétation sur le secteur Hérault-Aude et a localement touché le vignoble. Les premières observations de terrain font état de plus de 50 à 60 ha de vignes impactées, avec une intensité très variable selon les parcelles, allant de dégâts limités à des destructions totales de récolte.
- En **Moyenne Vallée de l'Hérault**, un incendie survenu à **Montpeyroux** a également affecté environ 1 ha de vigne, sans dégâts majeurs signalés à ce stade sur les parcelles voisines.

5 juillet :

D'autres départs de feu ont concerné la **Basse Vallée de l'Hérault**, notamment à **Abeilhan** (5 ha) et **Bessan** (1 ha). Les dégâts observés dans les vignes sont liés à la fois au rayonnement thermique et au passage des secours : feuilles et grappes partiellement ou totalement brûlées, réseaux de goutte-à-goutte fondus, matériel d'irrigation endommagé, jeunes plantations détruites ou dégradées par les interventions, ainsi que des dépôts de retardant sur la végétation.

De nombreux départs d'incendies sont régulièrement signalés.

× Pyrénées-Orientales

4 juillet : un incendie s'est déclaré sur la commune de Trévilach. Cet incendie toujours en cours a parcouru près de 5000 ha au mardi 7 juillet à 8 h. Dans cette surface de nombreuses vignes sont présentes. Actuellement il n'est pas possible de faire une évaluation de l'ampleur des dégâts.

Annexe – Notes nationales Biodiversité – BSV (cliquer sur les images)



Prochain BSV le 21 juillet 2026



Produits de Biocontrôle

Des produits de biocontrôle sont autorisés pour lutter contre les bioagresseurs. Retrouvez la liste [ici](#).

Résistances aux pesticides

Des résistances aux produits phytosanitaires existent. Une note nationale décrit l'état des lieux et les recommandations à respecter en la matière. Retrouvez la note [ici](#).

REPRODUCTION DU BULLETIN AUTORISÉE SEULEMENT DANS SON INTÉGRALITÉ (REPRODUCTION PARTIELLE INTERDITE)

Ce bulletin de santé du végétal a été préparé par les animateurs filière viticulture des Chambres d'agriculture de l'Aude, du Gard, de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales avec la participation du comité de validation et élaboré sur la base des observations réalisées par les Chambres d'agriculture de l'Aude, du Gard, de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales, FREDON Occitanie, Périss SAS, Ets Perret, Maison Sinnæ.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La CRA d'Occitanie dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base des observations qu'ils auront réalisées et en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.

Avec le soutien financier de



Financé dans le cadre
de la stratégie **écophyto**



GOUVERNEMENT

Liberté
Égalité
Fraternité