




A retenir

EUDEMIS	Vol de la 3 ^{ème} génération et dépôt de pontes en cours.
FLAVESCENCE DOREE	Symptômes bien visibles.
PYRALE DU DAPHNE	Surveiller les parcelles sensibles.

Annexes : [Liste des mesures alternatives et prophylactiques en viticulture](#)
[Note-technique-commune-vigne-2026.pdf](#)
[BSV LR mars 2026 annexes modèles](#)

PLUVIOMETRIE

Répartition des pluies – cumul hebdomadaire du 20/07 au 26/07/2026 – échelle du Min au Max (0 à 94 mm)
 Source IFV



4260727:
mini=0.0mm - maxi=93.7mm

Valeur
Elevée : 100
Faible : 0

Directeur de publication :

Denis CARRETIER
Président de la Chambre
Régionale d'Agriculture
d'Occitanie
BP 22107
31321 CASTANET
TOLOSAN Cx
Tel 05.61.75.26.00

Dépôt légal : à parution

Comité de validation :
Chambres d'agriculture et
de l'Aude, du Gard, de l'Hérault,
des Pyrénées-Orientales,
Chambre régionale
d'agriculture d'Occitanie,
IFV, FREDON Occitanie,
DRAAF Occitanie

écophyto

Réduire et améliorer l'utilisation des phytos

Action pilotée par le Ministère
chargé de l'agriculture et le
ministère chargé de l'écologie,
avec l'appui financier de
l'Agence Française pour la
Biodiversité, par les crédits
issus de la redevance pour
pollutions diffuses attribués au
financement du plan Ecophyto

STADES PHENOLOGIQUES

Dans les parcelles observées, les stades phénologiques varient de :

- « **début véraison** » (stade 35 ou BBCH 81) à
- à « **fin véraison-maturité** » (BBCH 89) dans les **parcelles précoces**.

Les stades majoritairement observés vont de « **mi-véraison** » (stade 36 ou M ou BBCH 85) à « **fin véraison** » (stade 37 ou BBCH 89)



Stade mi-véraison

TORDEUSES DE LA GRAPPE

- **Eudémis** (*Lobesia botrana*)

× **Données de modélisation : ACTIV** (modélisation arrêtée au 26 juillet)

	Début du vol de 3ème génération (10 % des imagos)	Début des pontes de 3ème génération (10 % des pontes)	éclosions (10% de larves L1)
ALAIGNE	25/7	30/7	3/8
CARCASSONNE	17/7	21/7	26/7
LEUCATE	13/7	17/7	21/7
LEZIGNAN	13/7	17/7	22/7
NARBONNE	9/7	13/7	17/7
BAGNOLS SUR CEZE	16/7	20/7	24/7
BOURDIC	21/7	26/7	30/7
CARDET	25/7	29/7	3/8
GENERAC	12/7	16/7	21/7
SOMMIERES	18/7	24/7	28/7
TAVEL	18/7	22/7	26/7
VAUVERT	11/7	15/7	19/7
BEZIERS	9/7	13/7	17/7
FRONTIGNAN	7/7	12/7	15/7
LAURENS	15/7	19/7	24/7
MARSEILLAN	11/7	15/7	20/7
OLONZAC	11/7	14/7	19/7
PLAISSAN	13/7	17/7	22/7
POUZOLLES	10/7	14/7	19/7
PRADES SUR VERNAZOBRE	12/7	16/7	21/7
ST CHRISTOL	14/7	19/7	24/7
ST JEAN DE FOS	16/7	21/7	26/7
VALFAUNES	19/7	24/7	29/7
VILLEMAGNE L'ARGENTIERE	26/7	31/7	5/8
LAROQUE DES ALBERES	4/7	10/7	14/7
PERPIGNAN RIVESALTES	5/7	10/7	14/7
SAINT PAUL FENOUILLET	18/7	22/7	27/7

× **Aude**

Le vol est toujours en cours sur l'ensemble du département. Les pontes sont repérées dans l'ensemble des secteurs. Les 1^{ères} chenilles sont visibles dans les secteurs précoces.

commune du piège + lieu-dit de la parcelle	Canet	Argeliers	St Nazaire	Cruscades olivary	Douzens lalande	Lagrasse borde rouge	Ornaisons cendrillon	Monze carbonnac	Laure Minervois
nb papillons G3 semaine 30	0	0	0	1	0	0	0	0	0
nb papillons G3 semaine 31	0	0	27	0	0	0	0	0	0
commune du piège + lieu-dit de la parcelle	Aigues Vives la thibaude	Coursan la pardeilhane	Cabanes Fleury pageze	Caves	Bages	Portel des Corbières	Talairan	Issel-en Cals	Sallèles Cabardès villatade
nb papillons G3 semaine 30	4	6	6	4	73	0	0	6	0
nb papillons G3 semaine 31	0	26	12	24	182	0	5	21	0
commune du piège + lieu-dit de la parcelle	Alaigne - Cazes	Pezens-Molière	Pezens pourqué	Carlipa-St André	Tuchan	Cascastel bera	Embres	ginestas pouzeranque	Rieux-Minervois st josphe
nb papillons G3 semaine 30	0	0	0	13	0	3	0	0	2
nb papillons G3 semaine 31	4	0	0	17	0	16	0	0	0
commune du piège + lieu-dit de la parcelle	Preixan	Villars	Bouriège	Espéza	Montréal	Mazerolles du Razès - Rau Ouest	Arzens - Fontorbe	Lauraguel - Ruisseau de l'Albane	
nb papillons G3 semaine 30			3		0	0	0	27	
nb papillons G3 semaine 31	0	21	28	25	0	1	0	83	

× Gard

Le vol de 3^{ème} génération se poursuit dans l'ensemble du département, il s'intensifie dans certains secteurs sensibles. Les dépôts de pontes sont très variables mais dans certaines parcelles le seuil de risque est atteint. Les premières éclosions sont observées.

× Hérault

En zones précoces et moyennes, des pontes à tous stades sont visibles ainsi que de jeunes larves. Les effectifs de pontes sont très variables, avec dans certaines parcelles des dépassements des seuils de risque.

En zones tardives, le dépôt des pontes débute. A ce jour, les effectifs de pontes sont assez faibles, même si des dépassements de seuil de risque sont notés.

Globalement, les niveaux de pontes sont inférieurs aux dépôts observés en 2^{ème} génération et très inférieurs à ceux observés en 3^{ème} génération en 2025.

× Pyrénées-Orientales

Le vol de 3^{ème} génération est en cours dans le vignoble départemental.

Les dépôts de pontes sont toujours observés dans les secteurs de La Plaine Nord et Sud Tech, le Cru Banyuls, les Aspres 1^{ers} Coteaux et la Moyenne Vallée de l'Agly.



Ponte fraîche



Ponte en évolution



Ponte stade tête noire

Évaluation du risque : il est en augmentation. Les perforations de cette 3^{ème} génération risquent d'engendrer des pourritures de type *Botrytis cinerea* et *Aspergillus carbonarius*.

Seuil indicatif de risque : 5 à 10 pontes pour 100 grappes.

• Pyrale du Daphné (*Cryptoblabes gnidiella*)

× Aude

Le vol est hétérogène avec des niveaux faibles selon les secteurs, les prises de papillons restent plutôt faibles. Dans les parcelles de référence, pour le moment, il n'a pas été observé de « dégâts » ou de chenilles.

Commune	Homps	Canet d'aude	Caves	Bagnoles-Parazols	ginestas pouzeranque	Portel des Corbières	Embres	Ormaisons Cendrillon
nb papillons semaine 30	2	2	3	0	0	1	7	0
nb papillons semaine 31	0	0	22	0	0	1	0	0
Commune	Laure Minervois	Rieux Minervois	Sallèles Cabardès	Coursan	Cabanes de Fleury	Bages	Talairan	
nb papillons semaine 30	0	1	0	1	0	0	0	
nb papillons semaine 31	0	0	0	0	0	1	0	
Commune	Paraza	Raissac d'aude	St Nazaire	Cruscades	Douzens	Lagrasse	Capendu	
nb papillons semaine 30	4	2	5	0	1	0	0	
nb papillons semaine 31	0	0	4	0	0	0	0	
Commune	Preixan	Limoux	Arzens	Carcassonne-Herminis	Pezens-Molière	Tuchan	Cascastel	
nb papillons semaine 30			1	0	0	0	0	
nb papillons semaine 31	0	0	0	0	0	0	0	

✖ Gard

Cette semaine encore, les captures sont globalement faibles dans l'ensemble du département. On note cependant une légère augmentation. Localement dans les Sables et les Costières, les piégeages s'intensifient : jusqu'à 70 papillons. Des nids sont observés un peu plus régulièrement.



Larve au sein d'une grappe

✖ Hérault

Les effectifs hebdomadaires des pièges augmentent dans quelques situations.

De rares larves sont toujours observées. Dans certaines situations à historique, quelques nids et début de dégâts sont signalés, mais ils restent anecdotiques.

✖ Pyrénées-Orientales

Quelques papillons sont notés dans les pièges du réseau d'observation. De rares chenilles sont observées dans nos parcelles de suivis.

Évaluation du risque : il continue d'augmenter, relever régulièrement les pièges et observer les larves au sein des grappes. Les cochenilles peuvent être un indicateur de la présence du ravageur.

OÏDIUM *(Erysiphe necator)*

• Situation au vignoble

✖ Aude

La maladie a tendance à évoluer uniquement dans les parcelles déjà atteintes principalement sur les cépages sensibles. On ne note pas une augmentation de la fréquence des symptômes sur le reste du vignoble.

Évaluation du risque : du fait de l'avancement des stades phénologiques et des conditions climatiques, le risque est désormais faible.

Techniques alternatives :



Il existe des produits de biocontrôle utilisables contre cette maladie. Pour connaître ces produits et leurs utilisations consulter [l'annexe ci-jointe](#).



Résistance : l'oïdium présente des résistances vis-vis de certains produits phytosanitaires. Il est important de les connaître et d'adapter son calendrier de traitement en fonction de ce risque de résistance. Pour en savoir plus, consultez la note nationale en cliquant [ICI](#)

FLAVESCENCE DOREE

✖ Vignoble régional

Des adultes sont observés.

Les symptômes continuent de s'exprimer au vignoble.

Évaluation du risque : il est important.

Mesures prophylactiques : Dès à présent, il est primordial de :

- repérer et de marquer les souches atteintes,
- déclarer obligatoirement les symptômes de jaunisses de la vigne à la FREDON/FDGDON ou l'application [Vigiflav](#) (Cf. Arrêtés préfectoral et ministériel),
- arracher ou tailler « à blanc » les souches atteintes le plus tôt possible (après passage de la FREDON/FDGDON) pour limiter les contaminations.



Symptômes sur cépages rouge et blanc

POURRITURE GRISE (*Botrytis cinerea*)

✖ Gard et Hérault

Quelques baies avec de la pourriture grise sont observées. Ces symptômes s'expliquent le plus souvent par la présence de perforations de la 2^{ème} génération d'eudémis ou de blessures sur les baies. Cette semaine la fréquence des parcelles concernées n'évolue pas.

✖ Pyrénées-Orientales

De rares symptômes sur baies sont visibles dans quelques parcelles de la Plaine Nord. Ces symptômes se développent sur des foyers de perforations de 2^{ème} génération d'eudémis et en présence d'humidité.

Évaluation du risque : il est globalement faible, il augmente dans les parcelles très vigoureuses.

ASPERGILLUS CARBONARIUS

✖ Gard

Quelques baies sont observées, notamment en Vallée du Rhône sud. Ces symptômes s'expliquent le plus souvent par la présence de perforations de la 2^{ème} génération d'eudémis ou de blessures sur les baies.

✖ Hérault

Quelques baies sont observées notamment dans les unités agroclimatiques du Biterrois, des Basse et Moyenne Vallées de l'Hérault et du Montpelliérais. Ces symptômes s'expliquent le plus souvent par la présence de perforations de la 2^{ème} génération d'eudémis ou de blessures sur les baies.

✖ Pyrénées-Orientales

Des symptômes sur baies sont visibles dans quelques parcelles de la Plaine Nord. Ces symptômes se développent sur des foyers de perforations de 2^{ème} génération d'eudémis et en présence d'humidité.

Évaluation du risque : il est globalement faible. Surveillez l'apparition de symptômes sur grappes.

CICADELLE VERTE *(Hebatia vitis anciennement Empoasca vitis)*

✖ Vignoble régional

Quelques larves sont présentes. De rares parcelles présentent quelques grillures non dommageables.

Évaluation du risque : à ce jour, le risque est faible.

Seuil indicatif de risque : 200 larves pour 100 feuilles observées.



Début des symptômes de cicadelle verte

CICADELLE AFRICAINE *(Jacobiasca lybica)*

✖ Pyrénées-Orientales

Des larves et des adultes sont observés dans nos parcelles de suivis dans les secteurs de la Plaine Nord Tech (littoral) et le Cru Banyuls. Leur nombre est en augmentation et les symptômes sont visibles. De nouvelles parcelles présentent des symptômes avec présence de larves et d'adultes dans le secteur de la Plaine Nord Tech.

Évaluation du risque : le risque est en augmentation.

MALADIE DU BOIS

✖ Vignoble régional

Les symptômes de Black-Dead-Arm et/ou Esca sont de plus en plus visibles. Les formes lentes et apoplectiques sont présentes au vignoble.

Évaluation du risque : repérez les souches exprimant des symptômes qui pourront être gérées par voie prophylactique.

RAVAGEURS SECONDAIRES

• Cochenilles

✖ Vignoble régional

Quelques individus sont signalés sur baie de raisin. Dans de rares situations les niveaux d'infestation peuvent être importants et dommageables pour la récolte.

Évaluation du risque : il est généralement faible, localement important et en relation avec l'historique de la parcelle.

• Oiseaux

✖ Hérault et Pyrénées-Orientales

Des dégâts sont localement constatés sur variétés très précoces.

Évaluation du risque : il peut être localement important.

ACCIDENT PHYSIOLOGIQUE

- **Stress hydrique**

- × **Vignoble régional**

Les symptômes de sécheresse typiques d'une réaction à la chaleur et surtout à la sécheresse induite par ces conditions météorologiques chaudes et sèches sont :

- des défoliations en cœur de souches,
 - des arrêts de croissance,
 - des jaunissements des feuilles de la base des ceps.

Dans quelques parcelles, les baies ne grossiront plus et les grappes ne « fermeront » pas. Des débuts de flétrissements de grappes sont aussi visibles dans quelques parcelles.

La contrainte hydrique est de plus en plus marquée avec des défoliations en cœur de souche. Ils ont tendance à s'aggraver dans les zones de côteaux avec des sols plus superficiels.



Symptômes de sécheresse

ACCIDENTS CLIMATIQUES

- **Stress thermique ou échaudage**

- × **Vignoble régional**

Des symptômes d'échaudage sont toujours régulièrement observés sur feuilles et grappes dans plusieurs secteurs du vignoble. Ils sont stabilisés cette semaine.

- **Grêle**

- × **Gard**

Lors des orages du samedi 25 juillet de petits grêlons ont occasionnées quelques dégâts dans la Vallée du Rhône Nord, sans conséquence sur la récolte.



Symptômes d'échaudage

Annexe – Notes nationales Biodiversité – BSV (cliquer sur les images)



Prochain BSV le 4 août 2026



Produits de Biocontrôle

Des produits de biocontrôle sont autorisés pour lutter contre les bioagresseurs. Retrouvez la liste [ici](#).

Résistances aux pesticides

Des résistances aux produits phytosanitaires existent. Une note nationale décrit l'état des lieux et les recommandations à respecter en la matière. Retrouvez la note [ici](#).

REPRODUCTION DU BULLETIN AUTORISÉE SEULEMENT DANS SON INTÉGRALITÉ (REPRODUCTION PARTIELLE INTERDITE)

Ce bulletin de santé du végétal a été préparé par les animateurs filière viticulture des Chambres d'agriculture de l'Aude, du Gard, de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales avec la participation du comité de validation et élaboré sur la base des observations réalisées par les Chambres d'agriculture de l'Aude, du Gard, de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales, FREDON Occitanie, Péris SAS, Ets Perret, Maison Sinnæ.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La CRA d'Occitanie dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base des observations qu'ils auront réalisées et en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.

