




A retenir

EUDEMIS	Le dépôt des pontes se poursuit, des larves sont visibles.
PYRALE DU DAPHNE	Légère augmentation des vols cette semaine.
POURRITURE GRISE	Symptômes en progression.

Annexes : [Liste des mesures alternatives et prophylactiques en viticulture](#)
[Note-technique-commune-vigne-2026.pdf](#)
[BSV LR mars 2026 annexes modèles](#)

PLUVIOMETRIE

Répartition des pluies – cumul hebdomadaire du 27/07 au 03/08/2026 – échelle du Min au Max (0 à 17 mm) Source IFV



4260802:
mini=0.0mm - maxi=16.6mm

Valeur Elevée : 20
Faible : 0

Directeur de publication :

Denis CARRETIER
Président de la Chambre
Régionale d'Agriculture
d'Occitanie
BP 22107
31321 CASTANET
TOLOSAN Cx
Tel 05.61.75.26.00

Dépôt légal : à parution

Comité de validation :
Chambres d'agriculture de
l'Aude, du Gard, de l'Hérault,
des Pyrénées-Orientales,
Chambre régionale
d'agriculture d'Occitanie,
IFV, FREDON Occitanie,
DRAAF Occitanie

écophyto

Réduire et améliorer l'utilisation des phytos

Action pilotée par le Ministère
chargé de l'agriculture et le
ministère chargé de l'écologie,
avec l'appui financier de
l'Agence Française pour la
Biodiversité, par les crédits
issus de la redevance pour
pollutions diffuses attribués au
financement du plan Ecophyto

STADES PHENOLOGIQUES

Dans les parcelles observées, les stades phénologiques varient de :

- « début véraison » (stade 35 ou BBCH 81) à
- à « fin véraison-maturité » (BBCH 89).

Les stades majoritairement observés vont de « mi-véraison » (stade 36 ou M ou BBCH 85) à « fin véraison » (stade 37 ou BBCH 89).



Stade fin-véraison

TORDEUSES DE LA GRAPPE

• Eudémis (*Lobesia botrana*)

× Aude

Le vol de 3^{ème} génération est en diminution mais se poursuit sur l'ensemble du département, excepté pour Lauraguel, Ginestas, Alaigne, Talairan. Des pontes en nombre variable sont observées, quel que soit le secteur.

commune du piège + lieu-dit de la parcelle	Preixan	Villars	Bouriège	Espéraz	Montréal	Mazerolles du Razès - Rau Ouest	Arzens - Fontorbe	Lauraguel - Ruisseau de l'Albane	Canet
nb papillons piège G3 du 27 juillet	0	21	28	25	0	1	0	83	0
nb papillons piège G3 du 03 août	x	x	x	x	0	1	0	86	0
commune du piège + lieu-dit de la parcelle	Alaigne - Cazes	Pezens-Molière	Pezens pourquié	Carlipa- St André	Tuchan	Cascastel bera	Embres	ginestas pouzeranque	Issel- en Cals
nb papillons piège G3 du 27 juillet	4	0	0	17	0	16	0	5	21
nb papillons piège G3 du 03 août	8	0	1	3	0	7	0	15	6
commune du piège + lieu-dit de la parcelle	Argeliers	St Nazaire	Cruscades olivry	Douzens lalande	Lagrasse borde rouge	Ornaisons cendrillon	Monze carbonnac	Laure Minervo	Talairan
nb papillons piège G3 du 27 juillet	0	27	0	0	0	0	0	0	5
nb papillons piège G3 du 03 août	0	0	0	0	0	0	0	x	9
commune du piège + lieu-dit de la parcelle	Sallèles Cabardès villatade	Rieux-Minervo st josph	Aigues Vives la thibaude	Coursan la pardeilhane	Cabanes Fleury pageze	Caves	Bages	Portel des Corbières	
nb papillons piège G3 du 27 juillet	0	0	0	26	12	24	81	0	
nb papillons piège G3 du 03 août	x	x	x	14	12	11	68	0	

× Gard

Les captures d'eudémis de 3^{ème} génération se réduisent ou sont nulles dans certains secteurs (Vallée du Rhône Sud, Sommiérois...). Aucune ponte fraîche n'est observée.

× Hérault

En toutes zones, des captures de papillons sont encore dénombrées et des pontes viables (à tous stades) sont toujours observées. Dans quelques situations, des dépassements de seuil de risque sont toujours notés.

× Pyrénées-Orientales

Le vol de 3^{ème} génération est toujours cours dans le vignoble départemental.

Les dépôts de pontes sont toujours observés dans les secteurs de La Plaine Nord et Sud Tech, le Cru Banyuls, les Aspres 1^{ers} Coteaux et la Moyenne Vallée de l'Agly.

Quelques parcelles présentent encore des dépôts de pontes importants.

Les perforations sont visibles et des larves de stade L2-L3 sont observées.



Ponte fraîche



Ponte en évolution



Ponte stade tête noire

Évaluation du risque : il reste significatif. Suivre le dépôt des pontes de la 3^{ème} génération. Les perforations de cette 3^{ème} génération risquent d'engendrer des pourritures de type *Botrytis cinerea* et *Aspergillus carbonarius*.

Seuil indicatif de risque : 5 à 10 pontes pour 100 grappes.

• Pyrale du Daphné (*Cryptoblabes gnidiella*)

× Aude

Les prises de papillons restent plutôt faibles pour la plupart des secteurs, sauf le Littoral sur la commune de Caves. Dans les parcelles de référence, pour le moment, il n'a toujours pas été observé de « dégât » ou de chenille.

En revanche, les pièges alimentaires continuent de capturer des papillons cette semaine : exemple pour les Hautes-Corbières : 23 sur la commune de Cascastel, 12 pour St Jean de Barrou, 17 pour Fraïsse des Corbières.

Commune	Preixan	Limoux	Arzens	Carcassonne-Herminis	Pezens-Molière	Tuchan	Cascastel	Embres
nb papillons crypto 27 juillet	0	0	1	0	0	0	0	0
nb papillons crypto 4 août	x	x	0	0	0	0	1	2
Commune	ginestas pouzeranque	Canet d'aude	Paraza	Raissac d'aude	St Nazaire	Cruscades	Douzens	Lagrasse
nb papillons crypto 27 juillet	0	0	0	0	4	0	0	0
nb papillons crypto 4 août	0	0	0	0	0	0	4	0
Commune	Ornaisons Cendrillon	Bagnoles-Parazols	Homps	Laure Minervois	Rieux Minervois	Sallèles Cabardès	Aigues- Vives	Coursan
nb papillons crypto 27 juillet	0	0	0	0	0	0	x	0
nb papillons crypto 4 août	0	0	x	x	x	x	x	3
Commune	Cabanes de Fleury	Bages	Talairan	Portel des Corbières	Caves	Capendu		
nb papillons crypto 27 juillet	0	1	0	1	22	0		
nb papillons crypto 4 août	0	0	0	2	29	0		

× Gard

Cette semaine encore, des captures sont présentes mais sont globalement faibles dans l'ensemble du département. Localement dans les Sables et les Costières, les piégeages s'intensifient encore par rapport à la semaine dernière : jusqu'à 80 papillons. Sur le département, peu de nids sont observés cette semaine.



Larve au sein d'une grappe

× Hérault

Les effectifs hebdomadaires des pièges continuent d'augmenter dans quelques situations des Hauts Coteaux, du Biterrois, de la Basse Vallée de l'Hérault et du Montpelliérain.

De rares larves sont toujours observées. Dans certaines situations à historique, quelques nids et début de dégâts sont signalés, mais ils restent anecdotiques.

× Pyrénées-Orientales

Des papillons sont notés dans les pièges du réseau d'observation. Dans certains pièges du Littoral, une forte augmentation des captures est notée.

De rares chenilles sont observées dans nos parcelles de suivis.

Évaluation du risque : il continue d'augmenter, relever régulièrement les pièges et observer les larves au sein des grappes. Les cochenilles peuvent être un indicateur de la présence du ravageur.

FLAVESCENCE DOREE

× Vignoble régional

Les symptômes continuent de s'exprimer au vignoble.

× Aude

De nouveaux symptômes sont observés dans des parcelles où aucune expression de la maladie n'avait été constatée jusqu'à présent, principalement sur les cépages Chardonnay et Marselan.



Symptômes sur cépages rouge et blanc

Évaluation du risque : il est important.

Mesures prophylactiques : Dès à présent, il est primordial de :

- repérer et de marquer les souches atteintes,
- déclarer obligatoirement les symptômes de jaunisses de la vigne à la FREDON/FDGDON ou l'application [Vigiflav](#) (Cf. Arrêtés préfectoral et ministériel),
- arracher ou tailler « à blanc » les souches atteintes le plus tôt possible (après passage de la FREDON/FDGDON) pour limiter les contaminations.

POURRITURE GRISE (*Botrytis cinerea*)

✖ Aude et Pyrénées-Orientales

Des symptômes sur baies sont visibles dans quelques parcelles des vignobles. Ces symptômes se développent sur des foyers de perforations d'eudémis et des éclatements de baies.

✖ Gard

Des symptômes de pourriture sont observés dans certaines grappes « pignées » ou atteintes d'oïdium sans lien avec les vers de la grappe.

✖ Hérault

La majorité des parcelles du réseau d'épidémiologie-surveillance restent saines. Toutefois, la pourriture grise se développe rapidement dans les zones littorales de la Basse Vallée de l'Hérault et dans une moindre mesure dans le Biterrois. L'orage du 25 juillet et les fortes à très fortes hygrométries de ces derniers jours sont des facteurs favorisants. Dans ces rares situations, en quelques jours les symptômes qui touchaient quelques baies sont désormais des foyers de pourriture avec des intensités d'attaques allant jusqu'à 10 %.

Évaluation du risque : le risque est en augmentation du fait des conditions climatiques « tropicales » (chaleur et fortes humidités).

ASPERGILLUS CARBONARIUS

✖ Aude et Pyrénées-Orientales

Des symptômes sur baies sont visibles dans quelques parcelles des vignobles. Ces symptômes se développent sur des foyers de perforations d'eudémis et des éclatements de baies.

✖ Gard

De l'*Aspergillus carbonarius* est présent sur des grappes atteintes de pourriture.

✖ Hérault

Quelques symptômes sont observés avec des fréquences et intensités faibles. Ces symptômes s'expliquent le plus souvent par la présence de perforations de la 2^{ème} génération d'eudémis ou de blessures sur les baies.

Évaluation du risque : le risque est en augmentation du fait des conditions climatiques « tropicales » (chaleur et fortes humidités).

POURRITURE ACIDE

✖ Hérault

Dans de rares situations, des attaques sont signalées dans des parcelles où la maturité est proche. Ces dégâts sont signalés à la suite de dégâts de guêpes ou autres insectes opportunistes.

Évaluation du risque : le risque est en augmentation.

CICADELLE VERTE (*Hebatia vitis anciennement Empoasca vitis*)

✖ Vignoble régional

Quelques larves sont présentes. De rares parcelles présentent quelques grillures non dommageables.

Évaluation du risque : à ce jour, le risque est faible.

Seuil indicatif de risque : 200 larves pour 100 feuilles observées.



Début des symptômes de cicadelle verte

CICADELLE AFRICAINE *(Jacobiasca lybica)*

× Pyrénées-Orientales

Des larves et des adultes sont observés dans nos parcelles de suivis dans les secteurs de la Plaine Nord Tech (littoral) et le Cru Banyuls. Leur nombre est en forte augmentation et les symptômes sont visibles.

Le nombre de parcelles présentant des symptômes avec présence de larves et d'adultes est en augmentation.

Évaluation du risque : le risque est en augmentation.

MALADIE DU BOIS

× Vignoble régional

Les symptômes de Black-Dead-Arm et/ou Esca sont de plus en plus visibles. Les formes lentes et apoplectiques sont présentes au vignoble.

Évaluation du risque : repérez les souches exprimant des symptômes qui pourront être gérées par voie prophylactique.

RAVAGEURS SECONDAIRES

• Cochenilles

× Vignoble régional

Quelques individus sont signalés sur baie de raisin. Dans de rares situations les niveaux d'infestation peuvent être importants et dommageables pour la récolte.

Évaluation du risque : il est généralement faible, localement important et en relation avec l'historique de la parcelle.

• Oiseaux et Guêpes

× Vignoble régional

Des dégâts sont localement constatés dès lors que les sucres s'accumulent dans les baies.

Évaluation du risque : il peut être localement important.

ACCIDENT PHYSIOLOGIQUE

• Stress hydrique

× Vignoble régional

Les symptômes de sécheresse typiques d'une réaction à la chaleur et surtout à la sécheresse induite par ces conditions météorologiques chaudes et sèches sont :

- des défoliations en cœur de souches,
- des arrêts de croissance,
- des jaunissements des feuilles de la base des ceps.

Dans quelques parcelles, les baies ne grossiront plus et les grappes ne « fermeront » pas. Des débuts de flétrissements de grappes sont aussi visibles dans quelques parcelles.

La contrainte hydrique est de plus en plus marquée avec des défoliations en cœur de souche. Ils ont tendance à s'aggraver dans les zones de côteaux avec des sols plus superficiels.



Symptômes de sécheresse

ACCIDENTS CLIMATIQUES

- **Stress thermique ou échaudage**

- × **Vignoble régional**

Des symptômes d'échaudage sont toujours régulièrement observés sur feuilles et grappes dans plusieurs secteurs du vignoble. Ils sont stabilisés cette semaine.



*Symptômes
d'échaudage*

Annexe – Notes nationales Biodiversité – BSV (cliquer sur les images)



Produits de Biocontrôle

Des produits de biocontrôle sont autorisés pour lutter contre les bioagresseurs. Retrouvez la liste [ici](#).

Résistances aux pesticides

Des résistances aux produits phytosanitaires existent. Une note nationale décrit l'état des lieux et les recommandations à respecter en la matière. Retrouvez la note [ici](#).

Prochain BSV le 11 août 2026

REPRODUCTION DU BULLETIN AUTORISÉE SEULEMENT DANS SON INTÉGRALITÉ (REPRODUCTION PARTIELLE INTERDITE)

Ce bulletin de santé du végétal a été préparé par les animateurs filière viticulture des Chambres d'agriculture de l'Aude, du Gard, de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales avec la participation du comité de validation et élaboré sur la base des observations réalisées par les Chambres d'agriculture de l'Aude, du Gard, de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales, FREDON Occitanie, Pérès SAS, Ets Perret, Maison Sinnae.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La CRA d'Occitanie dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base des observations qu'ils auront réalisées et en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.

Avec le soutien financier de



Financé dans le cadre
de la stratégie **écophyto**

