

Abonnez-vous
gratuitement
aux BSV de la région
Occitanie



Abonnez-vous
gratuitement
aux BSV
de la région
PACA



BLE DUR


Stades : mi épiaison (Z55) à fin floraison (Z69).

Septoriose : fond de septoriose partout et quelques observations rouille brune.

BLE DUR

• Stades phénologiques et état des cultures

Carte des différentes parcelles fixes d'observations pour la campagne 2025-2026



Directeur de publication :

Denis CARRETIER
Président de la Chambre
Régionale d'Agriculture
d'Occitanie
BP 22107
31321 CASTANET
TOLOSAN Cx
Tel 05.61.75.26.00

Dépôt légal : à parution

Comité de validation :

Arvalis Institut du Végétal,
Chambres régionales
d'Agriculture d'Occitanie et
PACA, DRAAF Occitanie et
PACA, Terres Inovia,

écophyto

Réduire et améliorer l'utilisation des phytos

Action pilotée par le Ministère
chargé de l'agriculture et le
ministère chargé de l'écologie,
avec l'appui financier de
l'Agence Française pour la
Biodiversité, par les crédits
issus de la redevance pour
pollutions diffuses attribués au
financement du plan Ecophyto.

Les stades vont de l'épiaison Z55 (variétés demi précoces semées début décembre en Vallée du Rhône ou secteur précoce) à fin floraison Z69 pour les variétés demi précoces (type Anvergur, RGT Voilur) semées autour du 20 octobre en secteur précoce (Littoral, Camargue).

• Septoriose (*S. tritici*, *S. nodorum*)

Il a fait sec jusqu'à dimanche 3 mai. La pression en septoriose évolue peu.

Il y a toujours un fond de septoriose présent.

Sur les blés les plus avancés, des tâches de septoriose sont observées sur les étages foliaires du haut (F3 définitive). C'est aussi le cas sur des parcelles moins avancées dans les secteurs qui ont été les plus arrosés de la région en mars : sur les parcelles fixes suivies dans le Gard et dans l'Hérault.

Feuille avec septoriose



A noter que sur la majorité des parcelles de la région la septoriose restent pour l'instant sur les feuilles du bas. Il y a une pression particulièrement faible côté Provence (secteur le moins arrosé en mars début avril).

Toutes les variétés cultivées dans la région sont concernées : Anvergur, RGT Belalur, RGT Voilur, Rocaillou.

Description des dégâts de septoriose :

Deux types de symptômes existent :

- Tâches blanches allongées

- Tâches brunes, de formes ovales ou rectangulaires, éparses, souvent bordées d'un halo jaune. Les taches se rejoignent pour former de grandes plages irrégulières. Elles sont visibles sur les deux faces du limbe.

Période de risque : de 1-2 nœud à floraison.

Seuil indicatif de risque : à partir du stade 2 nœuds, observer la F2 du moment sur une vingtaine de plantes (en ne comptant que les feuilles déployées). A partir du stade dernière feuille pointante, observer la F3 déployée du moment.

- pour les variétés sensibles (Claudio dans la région) : si plus de 20 % des feuilles observées présentent des taches de septoriose, la maladie doit être maîtrisée avant les prochaines pluies.

- pour les variétés peu sensibles (Anvergur, RGT Voilur, RGT Belalur, Rocaillou...), le seuil est de 50 % de feuilles atteintes.

Évaluation du risque : Risque fort : la météo passe normalement à la pluie les 15 prochains jours. Il y a un risque important que l'inoculum remonte sur les étages foliaires supérieurs.

• Rouille brune (*Puccinia recondita*)

Quelques parcelles avec des pustules de rouille brune sur blé dur observées dans le secteur de Pont Saint Esprit.

Description des dégâts de rouille brune : A l'échelle de la parcelle, la répartition est homogène dans la parcelle (dissémination par le vent) A l'échelle de la plante, sur les feuilles Pustules allant du brun au brun orangé, dispersées sur la feuille, essentiellement sur la face supérieure. Les quelques pustules du début d'attaque peuvent générer des centaines de pustules, si le climat est chaud et humide.

Période de risque : de redressement à grains laitieux.

Seuil indicatif de risque : observer à partir du stade 2 nœuds sur 20 plantes. Le seuil de risque est atteint dès l'apparition des symptômes sur une des 3 feuilles supérieures.

Évaluation du risque : risque modéré mais à surveiller avec les températures élevées et l'humidité des prochains jours surtout sur variétés sensibles.

Annexe – Notes nationales Biodiversité – BSV (cliquer sur les images)



Produits de Biocontrôle



Résistances aux pesticides

REPRODUCTION DU BULLETIN AUTORISÉE SEULEMENT DANS SON INTÉGRALITÉ (REPRODUCTION PARTIELLE INTERDITE)

Le bulletin de santé du végétal a été préparé :

- pour la filière blé dur, par l'animateur filière d'ARVALIS – Institut du végétal et élaboré sur la base d'observations réalisées par Arvalis, la CAPL, Les Chambres d'agriculture de l'Aude, de l'Hérault et du Gard, le LEGTA de l'Isle sur Sorgue.

Ces bulletins sont produits à partir d'observations ponctuelles. S'ils donnent une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. Les CRA d'Occitanie et de PACA dégagent donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base des observations qu'ils auront réalisées et en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.

Avec le soutien financier de



Financé dans le cadre
de la stratégie **écophyto**

