



FRGDS
Occitanie



Des troupeaux sains pour des produits de qualité

CROPSAV


Bilan de la gestion de la BVD en Occitanie

Bilan des cheptels infectés

Incidence en Occitanie : 1,42%
(- 1,22% par rapport à 2021)




L'action sanitaire ensemble



Viropositifs

En Occitanie : 742 viropositifs
(- 369 par rapport à 2021)

Taux de nouveaux infectés en dépistage à la naissance



Nb nouveaux viro+	09	11	12	30	31	32	34	46	48	65	66	81	82	Occitanie
Dépistage naissance	22	3	120	1	0	35	0	25	52	73	10	105	7	453
Dépistage plan assainissement	19	-	6	-	60	30	-	7	14	124	13	8	-	281
Dépistage autre	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-	1	2	-	8



L'action sanitaire ensemble

Evolution du dépistage sur boucle

6,6% des veaux non dépistés entre 0 et 20j

% de veaux de moins de 12 mois sans statut BVD



L'action sanitaire ensemble



Bilan du dépistage sur boucle au 30/04/2023



L'action sanitaire ensemble

	09	11	12	30	31	32	34
Nb de veau de moins de 12 mois sans statut	1 341	1 718	7 999	404	2 218	8 577	167
Nb de veaux nés sur 12 mois	27 796	8 178	173 054	3 545	33 736	26 881	3 636
% veau de moins de 12 mois sans statut	4,8%	21,0%	4,6%	11,4%	6,6%	31,9%	4,6%
% veau de moins de 12 mois dépistés	95,2%	79,0%	95,4%	88,6%	93,4%	68,1%	95,4%
Nb bovins au 30/04/23	75 292	23 439	433 233	15 281	85 944	74 904	12 695
Nb de bovins garanties non IPI	57 370	16 932	321 190	9 184	67 279	44 680	9 507
% de bovins garanties non IPI	76,2%	72,2%	74,1%	60,1%	78,3%	59,6%	74,9%

	46	48	65	66	81	82	Occitanie
Nb de veau de moins de 12 mois sans statut	4 347	1 107	5 417	141	3 594	1 924	38 954
Nb de veaux nés sur 12 mois	42 563	60 762	35 425	6 236	52 838	17 903	492 553
% veau de moins de 12 mois sans statut	10,2%	1,8%	15,3%	2,3%	6,8%	10,7%	7,9%
% veau de moins de 12 mois dépistés	89,8%	98,2%	84,7%	97,7%	93,2%	89,3%	92,1%
Nb bovins au 30/04/23	119 290	150 810	92 711	16 338	130 184	49 945	1 280 066
Nb de bovins garanties non IPI	83 102	117 315	66 807	11 818	99 252	34 177	938 613
% de bovins garanties non IPI	69,7%	77,8%	72,1%	72,3%	76,2%	68,4%	73,3%

Perspectives

- Passage en dépistage sérologique pour les cheptels en situation favorable :
 - Allaitant : annuel sur mélange de sérums (bovins 24-48 mois, avec minimum de 10 bovins)
 - Laitier : semestriellement sur lait de mélange (espacées de 4 à 8 mois)

- Sous condition d'un contrôle à l'introduction

