





II. LES SYMPTÔMES

- Pousse moins vigoureuse des arbres, feuillage réduit et jaunissant (mycélium dans les vaisseaux du bois), fructification plus abondante.
- Apparition d'une lésion près d'une blessure (tronc, branches, racines) :
 - ⇒ très allongée, sur 50 à 80 cm de large, bleue violacée avec bordure brune.
 - ⇒ Pas de réaction cicatricielle.
 - ⇒ Longs prolongements bleuâtres au sommet du chancre, mêlés d'orangé (# tissus sains verts); toujours dans le sens du bois (parfois en pointillé) : forme et couleur de FLAMME.
 - ⇒ Au centre du chancre : dessèchement de l'écorce, grisâtre, qui se fendille sans tomber.



1° symptômes :
Lésion allongée dans le sens
du bois, de couleur bleue
violacée : FLAMME

Photo : SRAL LR



Flamme bleue violacée dans
le sens du bois

Photo : SRAL LR

Photo : SRAL LR

Chancres plus âgés :
Flamme violacée
et craquellement de
l'écorce, qui ne tombe pas.
Pas de réaction cicatricielle




Photo : SRAL LR



Craquellement de
l'écorce, qui ne tombe pas.
Pas de réaction cicatricielle